

Roshetatology

علم الروشتات الطبية

(روسنا تولوجي)



اكثر من 300 روستة طبية مشروحة
تشخيص الامراض و التحاليل باللغة العربية
المهارات الطبية باللغة العربية
الامراض الجلدية وعلاجها
اخطاء الروشتات المشهورة والتفاعلات الدوائية
الاسعافات الاولى والطوارئ باللغة العربية
اطلس ملون للأدوية

Dr/ Ahmed Abd Allah

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Roshetatology

(علم الروشتات الطبية)

روشتاتولوجى

2nd Edition

Dr / Ahmed Abd Allah

A great effort was done to complete this book in this form
to help new doctors to know the neccassry knowledges of
dealing with and treatment of patients

Thanks for Allah for helping me to finish it

Thanks for all who helped me to finish it

اهداء الى:

ابى وامى وعائلتى
كل الاطباء والصيادلة
كل المرضى

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف
اى نقل او اقتباس يعرضك للمسائلة القانونية

FB. Page : medicine and pharmacy guide book page
facebook: www.facebook.com/ahmed.elgazar.14

Mob.: 01277668706



Roshetatology

فكرة عامة عن محتويات الكتاب

بفضل الله أقدم هذا الكتاب لكل الأطباء والصيادلة الراغبين في زيادة معلوماتهم الطبية بطريقة مبسطة جدا ان شاء الله

عندما تقرأ محتويات هذا الكتاب فستجده ان شاء الله يشمل كم هائل من الروشتات الطبية مع شرحها أكثر بكثير من معظم الكتب الطبية المماثلة - هذا الكتاب يحتوي على كثير من المعلومات التي سعت جاهدا لجمعها من كثير من الكاترة بكل التخصصات وكثير من المراجع والكتب بالإضافة لبعض الخبرة الشخصية والذي أسمى من أجله لأضافة بعض المعلومات الطبية لرصيدك كطبيب أو صيدلي إذا كانت جديدة بالنسبة لك راجيا من الله الثواب على ذلك لأفادة كل المرضى

- الكتاب يحتوي على 10 اجزاء :

الجزء الاول : الروشتات الطبية

أكثر من 300 روشتة طبية في جميع التخصصات بالاسم العلمي والتجاري والجرعة وطبيعة عمل الدواء ولماذا تم كتابته في الروشتة

الجزء الثاني: جزء روشتات الاستقبال والطوارئ

يشمل كل حالات الاستقبال والحالات الحرجة وكيفية التعامل معها

الجزء الثالث : تشخيص الامراض باللغة العربية والصور

تشخيص الامراض باللغة العربية والصور

الجزء الرابع : جزء التحاليل الطبية

يشمل كل التحاليل الطبية بنسبتها الطبيعية والتغيرات التي تحدث بها مع الامراض المختلفة بطريقة مبسطة تتناسب مع الأطباء والصيادلة

الجزء الخامس : المهارات الطبية

يحتوي على اهم المهارات الطبية كقياس الضغط والسكر واعطاء الحقن وغيرها

الجزء السادس : تشخيص وعلاج الامراض الجلدية

تشخيص وعلاج الامراض الجلدية بالعربية والصور

الجزء السابع: روشتات طبية مكتوبة بخط اليد

روشتات طبية مكتوبة بخط اليد وشرحها

الجزء الثامن: الاخطاء الطبية المشهورة بالروشتات والتفاعلات الدوائية

مجموعة من الاخطاء الطبية المشهورة في الروشتات

الجزء التاسع : الاسعافات الاولى

يحتوي على اهم الاسعافات الاولى باللغة العربية


الجزء العاشر: اطلس لادوية بالالوان

اطلس ملون يحتوي على معظم الادوية المشهورة باسمها العلمي والتجاري

Dr / Ahmed Abd Allah

Mob: 01277668706

الحمد لله والصلوة والسلام



References

- ✚ Pharmacology (Lippincott's Illustrated Reviews Series)
- ✚ British National Formulary (BNF)
- ✚ Martindale: The Complete Drug Reference
- ✚ Tarascon Pocket Pharmacopoeia
- ✚ Kumar and Clark Clinical Medicine
- ✚ Davidson's Principles and Practice of Medicine
- ✚ Harrison's Principles of Internal Medicine
- ✚ Oxford Handbook of Clinical Medicine
- ✚ Bailey and Love's Short Practice of Surgery
- ✚ Oxford Handbook of Clinical Surgery
- ✚ Practical Clinical Pathology
- ✚ Emergency: This Book Will Save Your Life
- ✚ First Aid & Emergency Preparedness Quick Guide
- ✚ Medicine and pharmacy guide book
- ✚ Atlas 2
- ✚ Master drug index

شكر خاص لجميع الاطباء والصيادلة

المشاركين في اجزاء الكتاب

د خالد هدهود	باطنة عامة
د احمد عبدالكريم	جراحة عامة
د جلال بليغ	نساء وتوليد
د محمد امين	اطفال
د احمد الجزار	مسالك وعقم
د منار مصطفى	قلب واوعية دموية
د داليا الكاتب	صدر
د احمد خالد	غدد صماء
د غادة عبدالله	عصبية
د احمد حسن	انف واذن وحنجرة
د ايمن بدوي	رمد
د محمد خاطر	جلدية
د ريهام سليم	سموم
د طارق الامير	طوارئ
د محمد سامي	عناية مركزة
د سحر السواح	تحاليل
د مصطفى التهامي	اسعافات اولية
د محمد الحلواتي	صيدلي
د بلال حلمي	صيدلي
د سارة الخولي	صيدلانية
د نها اسامة	صيدلانية
د مجدي حسن	علاج طبيعي

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٢٠﴾



Index

Medical prescriptions أكثر من 300 روصة طبية مع شرحها	7
Gastrointestinal prescriptions روصات الجهاز الهضمي	11
Respiratory system prescriptions روصات الجهاز التنفسي	29
Cardiovascular prescriptions روصات القلب والأوعية	37
Endocrine prescriptions روصات الغدد الصماء	47
Central nervous system prescriptions روصات الجهاز العصبي	57
Infection prescriptions روصات العدوى	65
Analgesics prescriptions روصات المسكنات	79
Surgery prescriptions روصات الجراحة	87
Urology prescriptions روصات المسالك البولية والتناسلية	93
Gynaecology & obstetrics prescriptions روصات النساء والتوليد	97
Pediatrics prescriptions روصات الأطفال	109
Ear , nose , throat prescriptions روصات الأنف والأذن والحنجرة	121

Eye prescriptions روشتات العيون	127
Nutrition prescriptions روشتات الفيتامينات والتغذية	131
Toxicology prescriptions روشتات السموم	139
How to deal with cases of emergency in a simple way كل حالات الاستقبال والطوارئ وكيفية التعامل معها بطريقة مبسطة	143
Diseases diagnosis تشخيص الامراض باللغة العربية والصور	171
Laboratory investigations التحاليل الطبية	179
Medical skills المهارات الطبية	191
Dermatology prescriptions روشتات الجلدية	203
Written prescriptions روشتات طبية مكتوبة	289
Common mistakes of prescriptions اخطاء الروشتات المشهورة	313
Drug interaction التفاعلات الدوائية	327
First aid الاسعافات الأولية	329
Colored atlas of drugs اطلس الادوية الملون	353

تم بحمد الله



Medical prescriptions

اكثر من 300 روشتة طبية

مع شرحها

كتابة الروشنة:

كتابة الروشنة الطبية يحتاج الى مهارة وخبرة طبية في معرفة تشخيص الامراض المختلفة واستخدامات الادوية المختلفة و اسمها العلمى والتجارى ومعرفة الجرعة وشكل الدواء بالصيدلية والتفاعلات الدوائية

اي روشنة تحتوى على:

بالاضافة لاسم الدكتور و مكان العيادة ومواعيد العمل وتليفون العيادة واسم المريض وسنه والتشخيص لابد عند كتابة الدواء مراعاة الاتى:

- 1- تبدأ الروشنة بحرف R / كابيتل تم توارثه عبر الاجيال
- 2- كتابة اسم الدواء بالاسم التجارى والاسم العلمى
- 3- كتابة شكل الدواء المطلوب مثل حبوب او حقن او غيرها
- 4- كتابة تركيز الدواء المطلوب
- 5- كتابة جرعة الدواء للمريض وطريقة استخدامه
- 6- لابد من الاخذ فى الاعتبار التفاعلات بين الادوية وتجنبها عند كتابة الروشنة

ليكون شكل الروشنة كالتالى:

R/ paracetamol tablet 500 mg 1x3

قرص 3 مرات فى اليوم

Forms of drugs in the pharmacyاشكال الدواء بالصيدلية

Tablet	حبوب	capsule	كبسولات
syrup	شراب	suspension	شراب معلق
cream	كريم	Ointment	مرهم
sachet	أكياس	Effervescent	فوار
lozenge	أقراص استحلاب	gargle	غرغرة
wash	غسول	bottle	زجاجة
ampoule	امبولات	vial	قارورة
ovoules	أقراص مهبلية	drops	قطرة
gel	جيل	patch	لاصقة
spray	رش	Solution	غسول

اختصار الدواء
 tabs و tabletts
 sup و supps
 susp و suspensions
 caps و capsules
 supp و suppositories
 vag. supp و vaginal suppositories
 shampoo و shampoo كما هي بدون تغيير
 amp و ampules
 vial و vial كما هي بدون تغيير
 oint و ointment
 gel و gel كما هي بدون تغيير
 cream و cream كما هي ولكن سوف نلاحظ ان الطبيب موصفا لا يكتب الكلمة الى آخرها
 ف سوف يكتب في cream مثلا ثم شرطه طوله
 drops و drops سواء كانت ear drops أو eye drops أو nasal drops
 وهناك ايضا عدة اختصارات اخرى وهي خاصة باستخدام الدواء
 فمثلا في الحقن سوف نجد شقين الحرفين
 c و c sub cutaneous تحت الجلد
 im و im intra muscular في العضل
 iv و iv intravenous في الوريد

اما الاختصارات دي هنش مش مشهوره اوي وهي خاصة باستخدام الدواء

Abbreviation	Latin	Latin Term	Meaning
ac	ante cibum		Take medication before meals.
bid	bis in die		Take medication twice a day.
hs	hora somni		Take medication at bedtime.
od	oculus dexter		Use medication in right eye.
os	oculus sinister		Use medication in left eye.
po	per os		Take medication by mouth.
pc	post cibum		Take medication after meals.
prn	pro re nata		Take medication as needed.
q3h	quaque 3 hora		Take medication every three hours.
qd	quaque die		Take medication every day.
qid	quarter in die		Take medication four times a day.
tid	ter in die		Take medication three times a day.

Roshetatology

أشكال أخرى من الاختصارات لـ dosage forms ، هامة جداً

الأقراص : tab

الكبسولات : cap

الشراب : syp

الشراب المعلق : susp

الأمبولات : amp

الفيال (حقن بداخلها بوجرة vial) :

نقط الأذن : ear.dp

نقط العين : eye.dp

نقط الأنف : n.dp

نقط الفم : oral.dp

بخاخ للأنف : n.spray

المراهم : oint

الكريمات : cream

لوسيون : lotion

بوجرة : pd

مضخة : m.w

معجون أسنان : dental paste

بخاخ : spray

فوار : eff

أكياس : sach

لبوس : supp

لبوس مهبل : vag.supp or vag.ovule

حقنة شرجية : Enema

مرهم عين : eye.oint

دش مهبل : douch

الاختصارات المستخدمة في كتابة الروشتات لتحديد الجرعة (أمثلة للتوضيح في حالة العلاج عبارة عن أقراص مثلاً)

1X3 -

3 أقراص ثلاث مرات يومياً

2X3 -

2 أقراص ثلاث مرات يومياً

1X3X7 -

3 أقراص ثلاث مرات يومياً لمدة سبعة أيام



Gastrointestinal prescriptions

روشتات الجهاز الهضمي

Gastroenteritis: النزلة المعوية

Diagnosis: التشخيص

النزلة المعوية معناها عدوى بالجهاز الهضمي يصاحبها اسهال وترجيع وسخونية



Causes of gastroenteritis: الاسباب

ممکن تبقى عدوى بكتيرية او عدوى فيروسية او طفيليات او ممكن تبقى بسبب
تسمم زى تسمم المبيدات الحشرية والفسیخ وغيرها

Examination: الفحص

اهم حاجة نعمل فحص للبطن عشان نتأكد انها مش مشكلة جراحية
presence of guarding or rigidity or tenderness means that is
surgical abdomen

Complications: المشاكل المصاحبة

نخاف ان المريض يحصله جفاف واول حاجة نعالجها هي الجفاف مع علاج
السبب زى علاج البكتيريا والتخلص من السموم

Signs of dehydration: اعراض الجفاف

لسانه ناشف و جلده ناشف بيرجع بصعوبة لما يشده و عينه داخلة لجوه و كمية
البول قليلة

Treatment:نُعطي مضاد حيوي ومطهر معوي

-Antibiotics:

ciprofar 1x2 , antinal , flagyl 1x3

نُعطي مضاد للمغص ومضاد للترجيع

-Antispasmodic:

(buscopan) , antiemetic (primpran) 1x3

نُعطي مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب

-Analgesic for fever , malaise (Brufen) 1x3

نعوض الجفاف عن طريق المحاليل ومحلول جفاف للأطفال

-Replacement therapy→

for adults:

(drink fluids, solutions)

-For baby: للأطفال

Rehydran, lohydran, hydrosafe sachets solved in cup of water then given by spoon slowly, solutions)

يمكن استخدام مضادات الاسهال مثل الاستريبتوكين ولكن بعض الدكاترة لا يفضلهاملحوظة

كل حاجة من الادوية الموجودة زى المضادات الحيوية ومضادات الترجيع والاسهال وغيرها هتتشرح بعد كده فى الشابتير المخصص لذلك

روشتة النزلة المعوية :

R/ ciprofar cap 500 1x2 (20 LE)

مضاد حيوي قاتل للبكتريا

كبسولة مرتين فى اليوم

R/ ketofan tab 50 mg 1x3 (5 LE)

مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب

قرص 3 مرات فى اليوم بعد الاكل

R/ primpran tab (2.5 LE)


مضاد للترجيع

قرص مرتين فى اليوم

R/ streptoquin tab 1x3 (4 LE) or flagyl tab 500 1x3 (6 LE)

قاتل للاميبيا ومضاد للاسهال

قرص 3 مرات فى اليوم

نعوض الجفاف عن طريق المحاليل ومحلول جفاف للأطفال

وجع البطن: Abdominal pain

دور على السبب: Search for cause:

اشهر الاسباب

Abdominal pain	Upper side	Gastritis & gall bladder disorder
	Back pain & urine problem	Renal stone & renal infection
	Fever & vomiting	Gastroenteritis & appendicitis
	Expect menses	Menstrual pain
	Gas production & spasm	Spastic colon
	Only spasm	antispasmodic



المغص الكلوي: Renal colic

وجع في الجنب الشمال او اليمين يسمع في الظهر او الاعضاء التناسلية وفي حرقان في البول والمريض ممكن يكون اشتكى قبل كده من حصوات او املاح

مغص الزائدة: Appendicitis colic

وجع في الجنب اليمين بدا حوالي السرة معاه سخونية او ترجيع لما نضغط بايدنا على مكان الوجع يزداد ولما نشيل ايدينا يزداد اكثر ويزيد الوجع لو رفعنا رجل العيان ناحية باطنة

GIT , spastic colic: مخص الجهاز الهضمي:

وجع فى البطن معاه ترجيع او اسهال او امساك والوجع له علاقة بالاكل ممكن يزداد او يقل مع الاكل وفى انتفاخات

Tissue pain: وجع العضلات

وجع فى الجنب بيزيد اكثر مع الحركة ويقل مع الراحة وبيكون جاى من العضلات او الاربطة

gastritis , peptic ulcer : وجع حموضة المعدة :


وجع فى البطن والصدر مع حموضة شديدة تزيد مع الاكل والنوم

gall bladder pain : وجع الصفراء :

وجع فى الجانب الايمن والصدر يسمع فى الكتف والايد الشمال غالبا فى سيدة فى سن الاربعينات او الخمسينات ويمكن ان تكون تخينة

Menses pain: وجع الدورة

وجع فى البطن له علاقة بالدورة وتعب شديد
الاسباب الاخرى لوجع البطن:



طب نعمل ايه:

- ندى امبول بوسكوبان او اى بديل (فيسرالجين) وده مضاد للتقلصات
- لو الالم قل يبقى مغص كلوى ولو مش قل ممكن يبقى زايده
- نتأكد انها زايده او مغص كلوى بسبب حصوة مثلا عن طريق عمل اشعة
- تلفزيونية اللي هتقول سبب الالم ونعمل صورة دم هنلاقي كرات الدم البيضاء
- عالية مع حالة التهاب الزايده الدودية
- لو اتأكدنا انها زايده نحجزه عشان يعمل عملية
- لو اتأكدنا انها مغص كلوى نعطي مسكن ونعالج الحصوة
- لو اتأكدنا انها وجع من العضلات ندى مسكن ونقلل المجهود وندى فيتامين بى 12
- عشان يقوى الاعصاب ونقلل الالم
- لو اتأكدنا انها وجع بسبب القولون نعالج بادوية القولون
- لو اتأكدنا انها بسبب قرحة او حموضة ندى ادوية الحموضة والقرحة
- وبالتالي احنا هنعالج اى سبب هنلاقيه

روشتة المغص والترجيع:

R/ buscopan (1 LE) or visceralgine amp
حقنة وريد الان

مسكن لو اتأكدنا من السبب ومش لاقيناه زايده وحابين ندى

مسكن

R/ adolor amp (2 LE) or ketolac amp
حقنة وريد او عضل الان

لو فى حموضة وعاوزين ندى حاجة للحموضة

R/ controlc amp (45 LE) or zantac amp (3 LE)
حقنة وريد او عضل الان



peptic ulcer, GERD, acidity

حموضة وقرحة المعدة



مريض عنده وجع في صدره وبطنه وييجيله حرقان
وحموضة بتزيد بعد الاكل او عند النوم وممكن يرجع

Causes:

زيادة افراز حمض المعدة مع ادوية معينة او شرب
السجائر والكحول وغيرها

diagnosis:

وجع متكرر بيشاور عليه العيان بصباح واحد الوجع بيزيد مع الاكل في حالة
قرحة المعدة وبيرتاح مع الاكل في حالة قرحة الاثني عشر
وفي حالة ارتجاع المريء الوجع يزيد بعد الاكل والحموضة بتطلع على صدره
عند النوم

Treatment:

علاج القرحة يتم من خلال تقليل انتاج حمض المعدة واعطاء ادوية تحمي جدار
المعدة واعطاء ادوية للتخلص من البكتريا المسببة للقرحة

1) decrease HCL formation by antisecretory drugs:

هذه الادوية تقلل افراز حمض المعدة

- Pirenzipene blocks M1
- Rantidine blocks H2
- Somatostatin blocks gastrin
- Prostaglandins decrease formation of CAMP
- Proton pump inhibitors (omeprazole) → ↓HCL formation

2) Mucosal protective drugs (sucralfate, colloid bismuth)

هذه الادوية تبطن وتحمي جدار المعدة من الحمض المعدي

3) Eradication of H.pylori (bacteria cause peptic ulcer)

مضادات حيوية تساعد على قتل البكتريا المسببة لقرحة المعدة

antibiotics (amoxicillin, metronidazole, Tetracycline,
clarithromycin

روشتة لقرحة المعدة والحموضة وارتجاع المريء:

ممنوع الأكل المسبك والحراق والسمين
ممنوع التدخين والمسكنات لأنها بتزود قرحة المعدة
عدم النوم بعد الأكل مباشرة ورفع رأس المريض على السرير الأدوية
تستخدم بعض من هذه الأدوية حسب الحالة

R/ controloc or zantac amp

حقنة وريد الان عند اللزوم

تقلل إفراز حمض المعدة

R/ Rani eff. (.75 LE) Or fawar fruit eff

فوار عند اللزوم

تقلل من إفراز حمض المعدة وتعالجه

R/ zantac (30 LE) or rantidine (9.5 LE) tab 150mg

قرص صباحا ومساء لمدة شهرين

تقلل إفراز حمض المعدة

R/ omez (13.5 LE) or controloc or nexium (73 LE) tab 40 mg

قرص قبل الفطار لمدة شهرين

تقلل إفراز حمض المعدة

R/ epicogel or gaviscon suspension


معلقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل

تبطن وتحمي جدار المعدة من الحمض المعدي

R/ helicure (60 LE) OR pyloact OR trio (51 LE) tablet

قرص 3 مرات في اليوم لمدة اسبوعين

مضادات حيوية تساعد على قتل البكتريا المسببة لقرحة المعدة




Acidity: الحموضة

R/ Fawar fruit or rani effervescent عند اللزوم



الترجيع: Vomiting

مريض رجع لاي سبب وممكن الترجيع ده يكون متكرر



causes:

ممکن تبقى عدوى او تسمم او خلل فى وظائف الجسم وغيره

Physiologic:

Constipation
Gastric Stasis/Outlet Obstruction
Brain Metastases
Increased Intracranial Pressure
Bowel/Intestinal Obstruction
Hepatomegaly
Oral Thrush
Cough

Metabolic:


Uremia
Endocrine Imbalance
Electrolyte Imbalance:
- Hypercalcemia
- Hyponatremia

Treatment Related:

Chemotherapy
Radiation Therapy
(especially to brain or GI tract)
Medications:
Initial Opioid Therapy
Antibiotics
Aspirin/NSAIDS
Carbamazepine
Steroids
Expectorants

**Vomiting Center of the Brain:
Lower Medulla**

Emotional/Spiritual/Psychological
Anticipatory N&V (prior to chemotherapy)
Meaning of Illness
Loss of Personhood
Role Change
Suffering
Anxiety/Fear
Fatigue

Treatment:

نستخدم مضادات الترجيع:

للترجيع نعطى

امبول بريمبران او ميكلوبرام

- لو مش مؤثر بنعطى امبول زوفران او دانست

- لو سيدة حامل بنعطى كورتيجين بى 6 امبول او بريمبران فى الشهور الاخيرة

من الحمل او زوفران امبول (4 مم) او دانست امبول (4 مم)

- لو طفل بنعطى كورتيجين بى 6 امبول او زوفران امبول (1 مم فقط)

اوموتينورم لبوس للاطفال

- ونعالج السبب (اذا كان عدوى مثلا بالمضادات الحيوية)

- ونطى محاليل اذا كان المريض رجع جامد عشان نعوض له السوائل المفقودة:

_____ للكبار نعطى محلول رينجر

_____ وللأطفال محلول جفاف لتعويض الجسم من فقدانه للاملاح

We use:

- Metoclopramide (primperan, meclopram) amp or tab 1x3
- Domperidone (motilium, motinorm) 1x3 tab , supp.
- Ondansteron (zofran, danset) amp,tab 1x2 very Potent

During pregnancy, children:

Vit B6 amp (cortigen B6) , Zofran amp

Vit B6 + meclozine (navidoxine, vomidoxine) 1x2

In 2nd , 3rd trimester we can use metoclopramide for pregnant

روشتة للترجيع :

R/ primperan amp (1.25 LE) or zofran amp (28 LE)

حقنة ورید عند اللزوم

R/ cortigen B 6 amp (2.5 LE) or zofran amp

حقنة ورید عند اللزوم للحوامل والأطفال

R/ primpran tab (2.5 LE) or mecloperam tab

قرص مرتين فى اليوم

Spastic colon القولون العصبى

مريض عنده وجع فى بطنه ممكن يصاحبه امساك او اسهال وانتفاخات وفقدان للشهية

treatment:

نعطى ادوية تنظم حركة الامعاء و نهعالج كل مشكلة موجودة


ادوية تنظم حركة الامعاء وتنظم الهضم

R/ librax (5 LE) or colona tab (10 LE)
قرص 3 مرات فى اليوم



ادوية تزيد حركة الامعاء وتساعد على الهضم

R/ gast reg (10 LE) or primpran tab
قرص 3 مرات فى اليوم



ادوية للاسهال

R/ streptoquin or entocid tab

قرص 3 مرات فى اليوم

(من افضل الادوية للاسهال لانه يقتل الاميبا السبب الرئيسى للاسهال فى مصر بالاضافة لمكونات اخرى به تقلل الاسهال)



ادوية للامساك

R/ picolax drops (2 LE) or lacin tab
or lactulose syrup

قرص 3 مرات فى اليوم

يجعل البراز طرى ويسهل من خروجه من الشرج


ادوية للمغص

R/ buscopan or visceralgine tab or amp 1X2

قرص مرتين فى اليوم


R/ petro 1x2 tab

قرص مرتين فى اليوم



الدوية للانتفاخات:

R/ eucarbona (10.5 LE) or disflatyl tab

قرص 3 مرات في اليوم
يمتص الغازات ويقلل الانتفاخاتالدوية لفقدان الشهية

R/ digestin or spasmodigestin tab

قرص 3 مرات قبل الاكل
يساعد على الهضم ويزيد الشهيةللحموضة:

R/ omez or pantazol or controloc or nexium tab 40 mg

قرص قبل الفطار لمدة شهرين
يقلل من افراز الحمض المعدي ويقلل القرحة والمهاللزغطة وسوء الهضم والترجيع:

R/ Primpran tab 1x2

قرص مرتين في اليوم
يزيد من حركة الامعاء ويقلل الترجيع ويقلل الزغطةروشتة للقولون العصبي:لو كان المريض يعاني من اضطرابات بالامعاء ومغص وانتفاخات وسوء هضم
فسوف تفيده هذه الادوية مع امكانية تغيير الادوية حسب الاعراض كما سبق

R/ librax or duspatalin or colona tab (10 LE)

قرص 3 مرات في اليوم

R/ eucarbona or disflatyl tab (8.25 LE)

قرص 3 مرات في اليوم

R/ Primpran tab 1x2

قرص مرتين في اليوم


اتباع هذه التعليمات في نظام الاكل والسلوك

هناك بعض النصائح الغذائية والسلوكية المهمة للمصاب بالقولون العصبي
والتي يلي من أسطر على مواقع القولون العصبي يقدم الدكتور سليم طلال أهم
النصائح التي يجب على مريض القولون العصبي اتباعها

- الابتعاد عن التوتر النفسي والعصبية قدر الإمكان وتعلم كيفية التعامل مع الإجهاد النفسي والضغط.
- الإكثار من المشي والحركة والنشاط ومزاولة أي نشاط رياضي فالحركة الدائمة وقليل من الرياضة تشد العضلات وتحافظ على الوزن وتضبط إيقاع القولون.
- في حال وجود عرض الإمساك المرافق للقولون العصبي؛ يجب على المريض السيطرة عليه من خلال التركيز على الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف حيث تنشط هذه الألياف حركة الأمعاء عامة والقولون خاصة.
- التحكم والحد من الإسهال عن طريق شرب المليّنات والمسهلات كشراب الحبة وزيت الخروع والسنا مكي وذلك للمساعدة في عملية الإخراج.
- عدم تناول أي دواء كيميائي إلا بمشورة الطبيب وبعد الخضوع للفحص الكامل بغرض استبعاد أي أمراض أخرى قد تتشابه أعراضها مع أعراض القولون العصبي، والابتعاد قدر الإمكان عن الأدوية النفسية التي بالإضافة لآثارها الجانبية قد تسبب الأضرار النفسية والعضوي عليها.
- تنظيم الأوقات بقدر الاستطاعة والنوم والاستيقاظ باكراً والابتعاد عن السهر.
- عدم التعرض الطويل للمكيفات وإن كان لا بد فلا يجب الإفراط في رفع تكييف الحرارة، واستغلال الأوقات التي يكون فيها الجو معتدلاً بفتح النوافذ سواء بالسيارة أو البيت.
- الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن كمأ ونوعاً وسلوكاً، والابتعاد أو التقليل من الأطعمة التي قد تثير أعراض القولون.. للمزيد عن التغذية العلاجية لمرضى القولون العصبي
- تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، بحيث تكون هذه الوجبات منتظمة ومتوازنة وفي أوقات محددة.
- تناول كمية كبيرة من الماء ويفضل بعد الوجبات، والإكثار من السوائل بقر المستطاع.
- مضغ الطعام جيداً قبل بلعه وعدم الإسراع في الأكل وتهينة جو هادئ أثناء الأكل وعدم الضجيج وتجنب الشجار.
- الانتباه والتقليل عند تناول بعض الوجبات الدسمة والتي تكون صعبة الهضم، وعدم الإفراط في البهارات والفلفل الحار.
- التقليل من إدمان المنبهات كالقهوة والشاي، والتوقف عن التدخين حيث وجد في حالات كثيرة أن مثل هذه العادات الاجتماعية تساعد على ظهور أعراض القولون العصبي.
- تنظيف القناة الهضمية بصفة دورية له العديد من الفوائد والمنافع العلاجية والوقائية، فهو يساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي والأمعاء بما فيها القولون

Diarrhea الاسهال

Causes : اسبابه



اهم اسباب الاسهال :

الاميبا :

اسهال + رائحة براز كريهة + وجع أثناء التبرز ووجع بالبطن

النزلة المعوية :

اسهال + سخونية + وجع بالبطن + ترجيع

القولون العصبي :

اسهال او امساك + وجع بالبطن وسوء هضم وانتفاخات وتزيد الاعراض مع

الزعل او الضغط العصبي

هناك الكثير من الاسباب الاخرى مثل بعض الادوية والايذ والتسمم وغيرها

Antidiarrheal drugs

1. antibacterial agent , antiprrozoal
2. adsorbent
3. drugs inhibit GIT motility
4. Rehydrin solution

1-antibacterial , antiprotozoal agent

مضادات حيوية ومضادات للاميبيا لقتل العدوى المسببة للاسهال

Quinolones , Nifuroxazide & Sulfa drugs if fear of infection
Flagyl if fear from amoeba (اهم سبب للاسهال في مصر)

2-adsorbent

ادوية تمتص السوائل حولها فتجعل الاسهال يتماسك وتجعل محتوى البراز صلب

Acts by adsorption of bacteria, toxin & noxious materials e.g.:
EX : Kaolin & pectin "kaopectate "

3- drugs inhibit motility:

الدوية تقلل حركة الامعاء وتقلل الاسهال

EX 1 : Loperamide (Imodium)®

EX 2 : Disphenoxylate (Lomotil)®

Avoid using alone in fear of infection

4-rehydration:

تعويض الجسم بالسوائل المفقودة لتجنب الجفاف ويحدث ذلك بمحلول رنجر للكبار او محلول جفاف للاطفال

-Not affect diarrhea frequency or duration but only replace electrolyte loss preventing possible dehydration.

-It contains Na, K, Ca, Mg, citrate, carbohydrate, Cl⁻, HCO₃⁻ & Zn e.g. : (Rehydran N, Rehydran Zn)®

الروشتة

البحث عن السبب من الاسباب السابقة وعلاجه

ادوية للاسهال

R/ streptoquin or entocid tab (4 LE) or flagyl 500 tab 1X3

قرص 3 مرات في اليوم

قاتل للاميبيا ومقتل للاسهال

R/ Lomtil or kaolin tab

قرص 3 مرات في اليوم


يقلل حركة الامعاء ويقلل السوائل في البراز فيقلل الاسهال

تعويض الجفاف بالمحاليل للكبار ومحلول الجفاف للاطفال



constipation: الإمساك

causes:



اهم اسباب الإمساك :

- كبار السن نظرا لضعف القدرة على التبرز
- وجود أي مشكلة في منطقة الشرج مثل الشرج والناسور والبواسير وغيرها
- مشكلة في الأمعاء مثل توقف حركة الأمعاء بعد العمليات أو انسداد بها أو ورم
- القولون العصبي والاضطرابات والقلق النفسي
- مشكلة نفسية أو مرض معين أو في الأشهر الأخيرة في الحمل
- نظام الأكل الخاطئ وبعض الأدوية وعند ارتفاع درجة الحرارة

الروشتة

البحث عن السبب من الأسباب السابقة وعلاجه

ادوية للإمساك مثل :

R/ picolax drops or laxin tab or lactulose syrup (5 LE)


3 مرات في اليوم قرص

بعض النصائح لمريض الإمساك:

- يجب المحافظة على حركة الأمعاء الطبيعية حتى لو لم يكن هناك رغبة للإخلاء (التبرز)
- ويجب الاستجابة للرغبة في الإخلاء وعدم كبها.
- يجب أن يحتوي الغذاء على الألياف ولهذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات باستمرار.
- يجب تناول قدر كاف من السوائل.
- يوجد عدة أنواع من العقاقير التي تستخدم لعلاج الإمساك ويطلق عليها اسم الملينات أو المسهلات يجب استخدام الملينات والمسهلات بحذر فربما تؤثر على امتصاص بعض العقاقير أو يكون هناك موانع للاستعمال وهي تعمل على زيادة الانقباضات في الأمعاء بحيث تعمل على طرد البراز وزيادة استعمالها يؤدي لضعف القدرة على التبرز بدونها

oral problems

causes of oral problem;



treatment for Gingivitis : علاج التهاب اللثة

- Antiseptic mouth wash مطهر للفم من الميكروبات
Chlorohexidine, povidone, citrimide, benzdiamine
- Antibiotic or antibacterial : مضاد حيوى
Amoxicillin, metronidazole, tetracycline
- Analgesic : مسكن
Ibuprofen, ketoprofen

treatment for herpes simplex: علاج فيروس الهيربس

- Antiviral drug (acyclovir)
- Analgesic

treatment for mouth thrush: علاج فطر الكانديدا

- Oral antifungal ... Miconazole, nystatin

treatment for mouth sore: علاج قرح الفم

- Antiseptic mouth wash
- Analgesic or anesthetic
- (Jogel) * ----> "Lidocaine + Jojob as antibacterial"
- (Oracure)* ----> "Lidocaine + cetylpyridinium as Antiseptic"
- (Salvix - L)* ----> lignocaine + anthraquinone +SA

Roshetatology

Oral antiseptic(lozenge):

مستحلبات للام الزور

R/ Bradoral, zora-c 1x3


قرص 3 مرات في اليوم



Mouth wash: غرغرة الفم
- For ulcer, bad mouth odour


R/ Oxymeria, oracin, orazid , orasan
mouth wash 1x3

غرغرة بالفم 3 مرات في اليوم




Dental pain

Causes of dental pain :



Treatment is by antibiotics, analgesics , referral to dentist for medical , surgical treatment of cause




Respiratory system prescriptions

روشتات الجهاز التنفسي

=Influenza: الانفلونزا

مريض سخن وعنده رشح وكحة وتكسير في جسمه

Symptoms of Influenza



Treatment:

- راحة وسوائل دافئة

- ادوية الانفلونزا

R/ Flurest, noflu, congestal (1x3).

It contains :


- مسكن خافض للحرارة (analgesic anti pyretic) --paracetamol
- مضاد للحساسية (anti allergic H1 blocker) --chlorpheniramine
- تقلل الاحتقان (sympathomimetic) --Pseudoephedrine
- يساعد على امتصاص الدواء --caffeine
- فيتامين سي لتقوية المناعة

R/ Vit C (cevarol, ora-c)

- مضادات حيوية لتجنب العدوى البكتيرية

R/ (septazol tab 2x2)

or (flumox 1x3) for 2ry infection



روشتة الانفلوانزا :

راحة في السرير وسوائل دافئة وعصير برتقال وليمون

R/ congestal (4.5 LE) or noflu tab

قرص 3 مرات في اليوم

R/ cevarol tab (5.5 LE)


قرص مرتين في اليوم

R/ Septrin tab (7 LE)

قرص مرتين في اليوم عند الإصابة بعدوى بكتيرية

الكحة : Cough

اسبابها: Causes:



ممکن تكون الكحة بسبب عدوى او مشكلة في الرئة او مشكلة في مجرى التنفس
او مركز التنفس في المخ و ممکن تكون الكحة دي جافة او مصحوبة ببلغم

الكحة الجافة: Dry cough:

ادوية تقلل من عمل المركز المسئول عن الكحة في
المخ فتقلل الكحة

E.g. :- sinecod, tuscapine, tussapine,
cyrinol, silomat syr 1x3

- selgon tab or drops 1x3

For pregnant, child : guava syrup 1x3



روشتة الكحة الجافة :

R/ sinecod (4.5 LE) or tuscapine syrup (3.5 LE)

ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم

Natural preparations for cough:

ادوية الكحة من المستحضرات الطبيعية تستخدم مع الحوامل والاطفال

They act as cough suppressant and expectorant

Suitable for pregnant, patients with kidney, liver disorder

Examples:

Guava leaves, fennel, thyme, honey, tilia, comphor, mentol.

الكحة ببلغم: Cough with expectoration:

ادوية تذيب البلغم وتساعد على سرعة طرده

Mucolytic with expectorant

E.g: Bisolvon , ultrasolv, mucosin,
Brozedex, mucosolvan, toplexil syr. 1x3

روشتة الكحة مع بلغم :

R/ Bisolvon or ultrasolv syrup

ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم



Bronchial asthma

الازمة الصدرية

كحة شديدة وازمة صدرية والمريض مش قادر ياخذ نفسه

Clinical picture: الاعراض



مريض جاي الاستقبال مش قادر ياخذ نفسه وصدره بيزيق و نفسه قصير وسريع وعنده تاريخ مرضى ان هو عنده حساسية على صدره وبيأخذ بخاخة او اى ادوية

Mechanism of asthma:

It is due to allergy, bronchoconstiction and increase secrtion of bronchi .
سبب الازمة الصدرية هو حدوث حساسية مع زيادة عمل الجهاز الباراسيمبثاوى وافراز مواد الهستامين والليكوترينز فيضيق مجرى التنفس وتزيد افرازاته فلا يستطيع المريض اخذ نفسه بسهولة

Treatment:

1) **Corticosteroids**(antiallergic). Prevent formation of leukotrienes E.g. Solucortef amp in acute attack

Beclo, clenil, vental, pulmicort inhaler 1x2

الكورتيزونات مضادة للحساسية

2) **B2 agonist**(salbutamol, terbutaline)→

↑CAMP with bronchodilatation, decrease secretions

salbovent, ventolin, arionyl inhaler 1x2

منشطات الجهاز السيمبثاوى ومستقبلات بيتا توسع القصبة الهوائية وتقلل الافرازات وتحسن التنفس

3) **Mast cell stabilizer**(ketotifen, zaditin) →↓histamine

تمنع افراز الهستامين

4) **leukotrienes antagonist** (montelukast)singular, montekal

تمنع عمل الليكوترينز المسنولة عن الحساسية

5) **methy xanthine**(aminophylline, theophylline) amp

it increase CAMP and cause bronchodilation

توسع القصبة الهوائية



Roshetatology

6) muscarinic antagonist (atrovent) → ↓ broncho-spasm
تقلل عمل الجهاز الباراسيمبثاوى فتقلل ضيق الشعب الهوائية و تقلل الإفرازات

7) mucolytics, expectorants (ultrasolv, mucosin) 1x3
تذيب البلغم وتطرده فتحسن التنفس

8) in acute attack we use nebulizer:

1/2 cm ventolin, 1/2 cm atrovent, 2 cm saline inhalation
فى الحالات الطارئة نعطى جلسة نيبوليزر للمريض

روشتة الازمة الصدرية :

فى الاستقبال فى الحالات الطارئة

During acute attack:

R/ nebulizer: جلسة نيبوليزر الان

1/2 cm ventolin, 1/2 cm atrovent, 2 cm saline inhalation

R/ soluortef amp امبول وريد الان

فى المنزل

In home:

R/ Ventolin(22 LE) or arionyl inhaler 1x3 بخاخة 3 مرات فى اليوم

R/ beclo or clenil inhaler (31 LE) 1x2 بخاخة 3 مرات فى اليوم

R/ ketotifen or zaditin syrup 1x3 شراب 3 مرات فى اليوم

R/ ultrasolv or mucosolv syrup 1x3 شراب 3 مرات فى اليوم

Respiratory infection: روشتة عدوى الجهاز التنفسى

انا سغنت وعندى كحة ببلغم وزورى بيوجعنى

R/ hibiocap 625 1x3 كبسولة 3 مرات فى اليوم

مضاد حيوى قاتل للبكتريا

R/ ultrasolv tab 1x3 ملعقة كبيرة 3 مرات فى اليوم

للکحة والبلغم

R/ congestal tab 1x3 قرص 3 مرات فى اليوم

يقلل الالم والحرارة والرشح والحساسية

Prescription for snoring: روشتة للتشخير اثناء النوم

R/ snor enz oral spray 1X1

R/ more nasal spary 1X1

Prescriptions:

Abdominal pain: روشتة مغص البطن

بطنى بتوجعنى يا دكتور وعندى مغص

R/ buscopan or visceralgine amp then tab 1x3

يرخى عضلات الامعاء ويقلل التقلصات والمغص

Search for cause , treat it

Diarrhea: روشتة الاسهال

انا عندى اسهال يا دكتور

R/ entocid or streptoquin tab 1x3

يقتل الاميبا ويوقف الاسهال

Search for cause , treat it علاج السبب

Peptic ulcer : روشتة القرحة المعدية

عنده وجع فى صدرى وبطنى وبيجلى حرقان وحموضة بتزيد بعد الاكل او عند النوم

R/ zantac or rantidol tab 150 1x2 for 6 month

يقلل افراز حمض المعدة ويقلل القرحة

R/ gastrofait tab 1 gm x 4 one hour before meal

يزيد من التئام القرحة وعلاجها ويحمى جدار المعدة

R/ helicure tab 1x3 for 2-4 weeks

يحتوى على مضاد حيوى لقتل البكتريا المسببة للقرحة ويقلل افراز الحمض المعدى

Spastic colon: روشتة القولون العصبى

بطنى بتوجعنى يا دكتور وبيجلى امساك وساعات اسهال وعسر هضم

R/ Spasmodigestin 1x3

يساعد على الهضم ويقلل التقلصات

R/ motilium 1x3

يزيد حركة الامعاء وينظمها

R/ controloc 1x1

يقلل افراز الحمض المعدى والحموضة

R/ Duspatalin or librax or colona 1x3

ينظم حركة الامعاء

Symptomatic for fever, flatulence, constipation

علاج الاعراض كالاسهال والامساك والانتفاخات وغيرها

Roshetatology

Bad mouth odour: روشته للرائحة الكريهة للفم

R/ Betadine mouth wash 1x3

تقليل الرائحة الكريهة وقتل الميكروبات

R/ Vibramycin cap. 1x2

مضاد حيوى يقتل البكتريا

R/ Amrizole 250mg . tab 1x3

قاتل للاميبيا والميكروبات اللا هوائية

Dry cough: روشته الكحة الجافة

R/ sinecoid, tuscapine syrup 1x3

Productive cough: روشته الكحة ببلغم


R/ ultrasolv or mucosolvan syrup 1x3

للمزيد من المعلومات الرائعة عن رسم القلب والاشعة والتحليل
احرص على اقتناء الكتاب الرائع :



The best in
Clinical pathology, ECG, X Ray
Dr / Ahmed Abd Allah





Cardiovascular prescriptions

روشتات القلب والاوعية

Hypertension: ارتفاع الضغط

ضغط الدم معناه ضغط الدم على جدار الشرايين وبالتالي ينتج زيادة الضغط من ضيق الشرايين أو زيادة كمية الدم أو زيادة عمل القلب والجهاز السيمبثاوى ولعلاج الضغط يمكن ان نقلل عمل الجهاز السيمبثاوى أو نوسع الشرايين أو نقلل حركة القلب ونقلل كمية الدم

Diagnosis:

الضغط المرتفع

مريض عنده صداع مستمر
عنده زغلة بالعينين
حاسس انه داخ او مش مركز
عنده اصوات غريبة وطنين بودانه
لو قيسنا ضغطه كذا مرة تلقىه على
الضغط الطبيعى 80/120 وممكن يبقى
90/140 عادى



When we measure blood pressure 2 different times and find it more than 140/90

- Mild : diastolic pressure is 90-99
- Moderate: diastolic pressure is 100-109
- Severe: diastolic pressure is > 110

روشتة لعلاج حالات ارتفاع الضغط الطارئة :

In high hypertension:


نعطى امبول لازكس وريدى + قرص كابوتين أو قرص ابيلات تحت اللسان
R/ Furesmide(Lasix, furesemide) amp 20 or 40 mg IV
R/ Capoten or Nifedipine (epilat) tab sublingual

Severe hypertension:

نعطى ادوية توسيع الشرايين عن طريق الحقن لتقليل الضغط
R/ Na nitroprusside, furesmide, nitroglycerine, trimetaphan IVI

Treatment of a patient with hypertension:

لعلاج الضغط يمكن ان نقتل عمل الجهاز السيمبثاوى او نوسع الشرايين او نقلل حركة القلب او نقلل كمية الدم

**روشتة ارتفاع الضغط: drugs used for treatment of hypertension:**

1) diuretics : تزيد البول فتقلل الدم ويقل الضغط

R/ hydrochlorothiazide 25 mg or lasix tab قرص يوميا قبل الافطار

2) beta blockers: تقلل عمل القلب فيقل الضغط

R/ ateno or concor 10 mg قرص يوميا قبل النوم

3) calcium chanel blockers: توسع الشرايين


R/ amilo 10 mg or epilal tab قرص يوميا قبل الافطار

4) ACE Inhibitors: تقلل عمل الجهاز السيمبثاوى

R/ capoten 25 mg or analapril tab قرص قبل الافطار

5) ARBS (angiotensin receptors blockers):

R/ valsar 80 or losartan tab قرص قبل الافطار

**To treat a patient we combine:**

- ACE I, betablocker, diuretics, Ca channel blocker
- Begin with one or 2 drug then increase other types according to response

Roshetatology

الاختيار الانسب لادوية الضغط مع الامراض المختلفة

Uses of hypertension drugs with different diseases:

Disease	Drugs used	Contraindication
Pregnancy	A methyl dopa (aldomet, aldomat) Nifedipine at end of pregnancy	Others
Renal	BB, ACE I, ARBS	Others
Asthma	Diuretics, ccbs, ACE I, ARBS	BB
Diabetes	ACE I, ARBs, CCBs	BB, thiazides
Angina	ACE I, CCBs, BB not in variant angina	BB in variant angina
PVD	ACE I, ARBs, CCBs	BB
Heart failure	ACE I, ARBs, VD small dose of BB	Ccbs, large dose of BB
Hyperlipidaemia	ACE I, ARBs	BB, thiazides
Angina	BB, CCBs, VD	
Gout	ACE I, BB, CCBs	Thiazide, loop diuretics

Hypotension: علاج انخفاض الضغطالضغط المنخفض

مريض يدوخ باستمرار ولا يستطيع القيام
الضغط نجده بمجهودات كبيرة وعند قياس
منخفض اقل من 60/90
ادوية تنشط السيمباسيتك والقلب فترفع الضغط

في الحالات الطارئة:-

R/ fortacortin or solucortif amp IM, IV at once
الكورتيزون يزيد كمية الماء والدم بالجسم ويرفع الضغط
محاليل تزيد كمية الدم R/ saline 0.9 % solution IVI

في المنزل:

R/ effortil OR vascon drops, tab


10 نقط 3 مرات في اليوم

تنشط الجهاز السيمبثاوي وتضيق الشرايين فيرتفع الضغط



روشتة الذبحة الصدرية وجلطة القلب: Angina

يقل الدم المغذى للقلب عن طريق الشريان التاجي فيحس المريض بالأم شديد في صدره وكتفه الأيسر

الذبحة الصدرية وجلطةالقلب

مريض جأى الاستقبال أو الصيدلية عنده وجع فى صدره يسمع فى ظهره وفى كتفه أو ايده الشمال يزد مع المجهود لما نعمل له رسم قلب هيحدد هو عنده ايه

In emergency in patient with cardiac pain :

فى علاج الحالات الطارئة نعطى ادوية توسع الشريان التاجي وتذيب الجلطات


We give him:

R/ angised or dinitra tab sublingual to dilate coronary artery

قرص تحت اللسان لتوسيع الشريان التاجي

+ R/ 4 tab of aspirin children (aspocid) to dissolve and

منع اسبرين اطفال لمنع الجلطات prevent thrombus formation



ثم عمل رسم قلب كهربى واستدعاء طبيب القلب للعلاج

روشتة علاج النزيف Haemorrhage:

هي ادوية تقلل النزيف عن طريق تنشيط تكوين الجلطة ومنع تكسيرها

-treatment of shock if found (fluids, cause,)

نعطى محاليل لو المريض ضغطه واطى وعنده هبوط فى الدورة الدموية

R/ dicynone amp

R/ kapron amp

R/ vit K amp (amri K)

حقنة ورید كل 12 ساعة لوقف النزيف

روشتة الهبوط الحاد فى الدورة الدموية Shock treatment:

- Place the victim in shock position
- Keep the person warm and comfortable
- Turn the victim's head to one side if neck injury is not suspected



مريض ضغطه واطى ونبضه سريع وضعيف وجلده ساقع وشاحب وممكن يكون مغى عليه

السبب ممكن ان يكون نزيف او عدوى او حساسية او غيرها

العلاج

- هي ادوية تعمل على زيادة كمية الدم وضيق الشرايين فترفع الضغط ويزيد الدم الواصل لجميع اجزاء الجسم

-نعطى محاليل ونرفع رجل العيان لاعلى ونعطى امبول كورتيزون ونعالج السبب

- rest in recumbent position, raise foot by bed
- sympathomimetics (ephedrine, dopamine)
- volume replacement by blood, plasma, fluids
- corticosteroids specially those with salt retaining
- in septic shock: antibiotics IV
- in neurogenic shock: morphine sulphate to ↓ pain
- in anaphylactic shock: antihistaminic , Corticosteroids , Adrenaline if needed

روشتة علاج زيادة الكوليستيرول Hyperlipidaemia:

هى ادوية تعمل على تقليل تكوين الكوليستيرول
وزيادة افرازه فى العصارة الصفراوية لتقليل نسبته
فى الدم

R/ Crestor (56 LE) or lipitor tab
قرص واحد يوميا

**روشتة قصور الاوعية الدموية: vascular insufficiency:**


ادوية تقوى من جدار الشعيرات الدموية والاوردة فتعالج قصور الاوعية
الدوائية مثل الدوالي

**R/ Daflon (18.5 LE) or diosimax or
rutin C tab**
قرص مرتين فى اليوم

**روشتة علاج اضطرابات الاوعية: Circulatory disturbance:**


ادوية توسع الشرايين وتزيد الدم لاجزاء الجسم مثل
الاذن الداخلية والمخ

R/ stugeron (6.75 LE) or cerebral tab
قرص 3 مرات فى اليوم

**Memory enhancers:****روشتة مقويات الذاكرة**

ادوية تزيد الدم والاكسجين الواصل للمخ

R/ nootropil or stimulant or cerebro tab
قرص 3 مرات فى اليوم




علاج النقرس: Hyperuricaemia (gout):

سبب النقرس: (حمض اليوريك < 7)

هو زيادة تكون حمض اليوريك في الدم وقلة اخراجه مع البول فيترسب حمض اليوريك في المفاصل والكلى ويؤدي للآلام والحصوات

علاج النقرس:

- أثناء نوبات الألم نعطى ادوية تمنع الالتهاب وتمنع ترسيب حمض اليوريك
- بين النوبات نعطى ادوية تقلل تكوين حمض اليوريك وتزيد اخراجه مع البول




روشتة النقرس:

قرص مرتين في اليوم R/ zyloric tab
يقلل تكوين حمض اليوريك

فوار 3 مرات في اليوم R/ urosolvine eff.
يمنع ترسيب حمض اليوريك وتكوين الحصوات

قرص مرتين بعد الاكل R/ cataflam tab 50
يقلل الألم والالتهاب



Syncope, dizziness

اسباب الدوخة وفقدان الوعي:

- 1- قلة الضغط
- 2- نقص السكر
- 3- الانيميا
- 4- الارهاق الشديد
- 5- بعض امراض القلب ونقص الدم
- 6- الحمل

العلاج:

عمل الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة وعلاج السبب

علاج السمنة

وفيل ما تكلم فانها، من المثلث
التي تحتاجه تقابل الوزن
- مرضى السكر
- مرضى الضغط
- مرضى الروماتيزم
- مرضى زيادة الكوليسترول
- الأشخاص التي وزنها زاد عن
الطبيعي والتي معرضين لأي مرض
من السابق ذكرهم

① لزامي نعرف ان الشخص يحتاج
تعديل في الوزن
... عن طريق حساب كتلة
الجسم وهي عبارة عن الوزن
بمقسوما على مربع الطول، بالعرض
- لو الرقم التي طلع أقل من ٢٠
... كدة الشخص يحتاج يزيد في
الوزن

- الطبيعي من ٢٠ إلى ٢٥
- بداية سمنه من ٢٥-٢٠
- سمنه من ٢٥-٢٠
- بدله من ٢٥-٤٠

② بداية الشخص يحتاج تطبيق
السمرات الحرارية التي يتناولها
الشخص قبل البدء في العلاج
متوسط السمرات الحرارية ١٦٠٠ إلى ٢٥٠٠ للشخص العادي
للرياضيين تصل إلى ٢٨٠٠

ممكن تدخل على الانترنت لتحديد قيمة كل جرام من اكله معينه وكيفية السمرات الحرارية
التي الجسم يحتاجها

③ العلاج

- أهم شئ للشخص ممارسة الرياضة لحرق الدهون المخزنة في الـ **adipose tissue**
- نساك عن نوعية الاكلات التي ياكلها
... لو كان اكله منوع ... يبقى حله **بالشيتوكال** كبسوله قبل الاكل بربع ساعه ... لانه
يحتوى على **chitosan** يمنع امتصاص الدهون و **gemina silvester extract** يمنع امتصاص
الكربوهيدرات

... لو كان ياكل دهون أكثر ... يبقى حله **venical** لانه فيه **orlistat** يمنع امتصاص
الدهون ويؤخذ كبسوله قبل الاكله التي بتحتوى على دهون حتى لو بسكون



يمكن بأخذ **neopantia** رائع جداً ويؤخذ كبسولتين بعد الأكله اللي بتحتوى على دهون
يمكن يشعر المريض بالأسهال والانتفاخ لمدة اسبوع ثم تختفى الآثار
يحتاج المريض الى تناول فيتامينات تحتوي على Vit K,E,D,A لان العلاج يمنع امتصاصهم

... لو كان ياكل نشويات أكثر يبقى حله بال **Glucosanol** اللي يمنع امتصاص
الكربوهيدرات تؤخذ قبل الأكل ٣ مرات

... يمكن مع اى واحد من اللي فوق يتناول **Hi-Chrom** اللي فيه chromium picolinate
اللي يساعد على حرق الدهون يؤخذ بعد الأكل ٣ مرات

... لتقليل الشهية يؤخذ من ٢ الى ٣ حبات **Bran** قبل الأكل مع كمية كبيره من المياه

⑤ ينصح المريض بمتابعة الوزن اسبوعياً ومتابعة كتلة الجسم باستمرار حتى يحصل على
النتيجة المراده

⑥ اذا كانت هناك زيادات جلديه في منطقة البطن او الفخذين او الذراعين مثل قشور
البرتقال عند الضغط عليها ينصح ب كريم مضاد للسيلوليت


⑦ Cross sales


- سكر داييت
- شاى اخضر
- شاى التخسيس
- حزام او شورت التخسيس

Obesity: to decrease weight: روشنة لعلاج السمنة:

R/ meridian cap قرص قبل الافطار

R/ xenical (orlistat) cap قرص بعد كل وجبة
(cap after each meal) + multivitamin





Endocrine prescriptions

روشتات الغدد الصماء


Diabetes mellitus

ماذا يحدث في مرض السكر

ينقص الانسولين المسنول عن تكسير الجلوكوز وانتاج الطاقة في الجسم بسبب مشكلة في البنكرياس او مستقبلاته والنتيجة:

- زيادة الجلوكوز في الدم فيأخذ الماء ويذهب للبول فيزيد البول ويعطش المريض فيشرب ماء اكثر وياكل ويحس انه جوعان لعدم استخدام الجلوكوز في انتاج الطاقة
- زيادة الجلوكوز في الدم يعطى بيئة سهلة لنمو البكتريا والعدوى ومع الوقت يفسد الشرايين والاطراف العصبية فتحدث مشاكل مرض السكر ويفقد المريض احساسه بالاطراف و ممكن ان يجرح المريض نفسه ومع العدوى يمكن ان يبتتر اطرافه
- الجسم يبدأ في استخدام الدهون كبديل للجلوكوز في انتاج الطاقة وينتج من تكسيرها احماض الكيتون التي لو زادت في الجسم يمكن ان تؤدي الى غيبوبة زيادة السكر للمريض بسبب تأثير الاحماض على المخ
- ويمكن ايضا ان يدخل المريض في غيبوبة نقص السكر نتيجة اخذ جرعة زائدة من الانسولين اثناء العلاج مع عدم الاكل فيقل الجلوكوز في الدم ويدخل المريض في غيبوبة نقص السكر

Clinical picture of diabetes





مريض ببعث كثير وبیشرب كثير
وبيعمل حمام كثير وريقه بينشف
وبياكل كثير بس بيحس انه جعان
ولو قيسنا السكر بقاعه هنلقيه عالي
اكثر من 125 وهو صائم
او اكثر من 200 وهو قاطر
وممكن يجي بمشاكل جامدة زي
غيبوبة بسبب زيادة او نقص السكر
او عدوى بكتيرية شديدة بالجروح
والقدم السكري

Types:

- Insulin dependant(type I)
- Non insulin dependant(type II)
- Gestational DM

Feature	Type 1 diabetes	Type 2 diabetes
Onset	Sudden	Gradual
Age at onset	Mostly in Children	Mostly in adults
Body habitus	Thin or normal ^[3]	Often obese
Ketoacidosis	Common	Rare
Autoantibodies	Usually present	Absent
Endogenous insulin	Low or absent	Normal, decreased or increased

Types of insulin:

Insulins		
Short-acting	Intermediate-acting	Long-acting
• regular insulin • Insulin aspart • Insulin glulisine • Insulin lispro	• Isophane insulin • Biphasic insulin aspart • Biphasic insulin lispro • Biphasic isophane insulin	• Insulin detemir • Insulin glargine • Insulin zinc suspension • Protamine zinc insulin
They are available alone and in the form of combinations		

Types of oral hypoglycemic;

Oral hypoglycemic drugs				
drug	mechanism	Effect on plasma insulin	Risk of hypoglycemia	Side effects
Sulfonylureas Glibendamide ▶ (Daonil) [®] Glipizide ▶ (diamicron) [®] Glipizide ▶ (Minidiab) [®] Glimepiride ▶ (Amaryl) [®]	Stimulate the release of insulin ▶ Sulfonylureas should be avoided or a reduced dose should be used in severe hepatic impairment	↑	Yes	Hypoglycemia; weight gain; nausea; skin rash ▶ Sulfonylureas should be used with care in those with mild to moderate renal impairment
Meglitinides Repaglinide ▶ (Novonorm) [®] Nateglinide ▶ (Starlix) [®]	Stimulate the release of insulin	↑	Yes rarely	hypoglycemia; weight gain; nausea; back pain; headache
Biguanides Metformin ▶ (Cidophage) [®] Hepatic impairment = withdraw if tissue hypoxia likely	Inhibit the release of glucose from the liver; improve sensitivity to insulin	↓	No	Nausea; diarrhea; rarely (lactic acidosis); Decrease vitamin-B ₁₂
Thiazolidinediones Pioglitazone ▶ (Diabetin) [®] Hepatic impairment = avoid	Improve sensitivity to insulin; inhibit the release of glucose from the liver	↓↓	No	Heart failure; heart attack; stroke; liver disease
α-glucosidase inhibitors Acarbose ▶ (Glucobay) [®] Hepatic impairment = avoid	delay the digestion and absorption of starch and sucrose	↔	No	Stomach pain; gas; Diarrhea

The best drug used now for treatment of type II DM is:
Di Peptidyl Peptidase-4 Inhibitors (DDP 4 inhibtors)
 like (Sitagliptin, Vildagliptin) (onglyza)

Treatment of type I needs insulin but treatment of type II need oral hypoglycemic drugs

روشتة مريض السكر النوع الاول:

مريض السكر النوع الاول علاجه بالانسولين والجرعة حسب نسبة ارتفاع

السكر وياخذ الانسولين تحت الجلد

اما في حالة زيادة السكر في الطوارئ تكون الجرعة:

اقل من 200 لاشي

من 200 لـ 250 خمس وحدات انسولين عضل

وحدات من 250 لـ 300 عشر

من 300 لـ 350 خمسة عشر وحدة

من 350 لـ 400 عشرين وحدة

اكثر من 400 ياخذ 25 وحدة

مريض السكر النوع الثاني يعالج بالادوية التي تقلل السكر وهي كالآتي

روشتة مريض السكر النوع الثاني:

R/ amaryl(1,2,3,4 mg)

قرص مرة واحدة في اليوم

R/ cidophage 500

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل

R/ Onglyza tab

قرص مرة واحدة في اليوم

Amaryl 4mg Tablet

Glimepirid
Oral Antidiyabetik
30 tablet

sanofi aventis

**Cidophage
Retard 850 mg-**

هذه الادوية تعمل من خلال تحفيز الجسم على افراز الانسولين وزيادة عمله وتقليل امتصاص السكر من الامعاء بعد الاكل


المشاكل الناتجة عن مرض السكر

- hypo, hyperglycemic coma

+


chronic complication

Major diabetes complications



Treatment of hypoglycaemia: روشتة لعلاج نقص السكر بالدم

في حالة الغيبوبة مع مريض السكر تعالج اولا على انها نقص في السكر بالدم باعطاء سكر للمريض حتى يتم قياس السكر لتجنب مخاطر نقص السكر في الدم على المخ والجهاز العصبي




- give glucose, sugar oral in conscious person
- glucose , glucagons injection for unconscious patient
- decadron amp or fortacortin amp to increase glucose

Hyperglycemic coma: روضة علاج غيبوبة زيادة السكر

Insulin injection + glucose 5% to avoid hypoglycaemia

If Diabetic ketoacidosis is found:In DKA there is:

- hyperglycaemia usually $\geq 300 \text{ mg/dl}$
- arterial $\text{PH} < 7.3$
- bicarbonate $< 15 \text{ meq/l}$
- moderate ketonaemia, ketonuria
- glucosuria, hyperkalaemia,
↑ anion gap

Management:


- Correction of fluid loss with intravenous fluids
- Correction of hyperglycemia with insulin (0.1 u/kg)
- Correction of electrolyte disturbances, particularly K
- Correction of acid-base balance by sodium bicarbonate
- Treatment of concurrent infection, if present



روشتة لعلاج زيادة افراز الغدة الدرقية: Hyperthyroidism:

مريض متعصب دائما ولا يتحمل ارتفاع درجات الحرارة ووزنه قليل ويأكل كثير ولديه اسهال دائما ونبضه على بسبب زيادة هرمون الثيروكسين

HYPERTHYROIDISM



الروشتة


R/ Carbimazole (carbimazol) tab 1x2

تقلل من افراز هرمون الثيروكسين

R/ Propranolol (inderal) tab 1x1


تقلل من هرمون الثيروكسين وتأثيره على القلب

R/ radiotherapy, surgical removal of the gland



روشتة لعلاج نقص الغدة الدرقية: Hypothyroidism:

مريض متبلد دائما نائم على نفسه ولا يتحمل البرودة ووزنه زائد وياكل قليل ولديه امساك ونقصه بطيء بسبب نقص هرمون الثيروكسين



الروشتة

R/ Thyroxine (Eltroxin , T4-thyro 50, 100 u) tab 1x1

R/ Levothyroxine(Euthyrox) 1x1

يعطى هرمون الثيروكسين لتعويض نقصه في الجسم

Hirsutism:

زيادة الشعر عند الاناث

سببه زيادة الهرمونات التيستوستيرون من الغدة الفوق كلوية

R/ urbasone tab 1x1

كورتيزون يقلل من الهرمونات الذكورية من الغدة الكظرية

R/ aldactone tab 1x1 in morning يزيد الاسبرولين ويقلل القورم

R/ cidophage tab 1x1 after launch يقلل من نسبة التيمستوستيرون


يحافظ على نسبة السكر مع استخدام الكورتيزون

RoshetatologyCorticosteroids: الكورتيزونات

تستخدم كمضادة للالتهاب والحساسية و الصدمات وقلة الضغط والسكر و مقبلة للمناعة في الامراض المناعية و تستخدم في تعويض نقص الكورتيزون في الجسم

Mechanism of action:

It inhibit phospholipase A2 enzyme

Uses: استخداماته

- Replacement therapy in addisson disease, crises
- anti inflammatory , anti allergic, anti shock
- immuno-suppressor in transplantation, immune diseases
- suppress scars , keloid formation
- anti hypoglycemia, anti hypotension

Side effects: اعراضه الجانبية

- nervousness, insomnia, hypertension, Hyperglycaemia,
- hypocalcaemia, ↓K, thromboembolic, teratogenic
- osteoporosis, muscle weakness, delay wound hea ling
- edema, weight gain, moon face
- cataract, GIT bleeding, decrease immunity
- if stopped suddenly→addisson crises

الروشتة:

R/ Soluocortif or dexamethazone
or fortacortin amp

امبول وريد الان


R/ hostacortin or deltacortin tab

قرص 3 مرات في اليوم وتوقف الجرعة تدريجيا

R/ phenadone syrup

شراب 3 مرات يوميا وتوقف الجرعة تدريجيا





Central nervous system prescriptions

روشتات الجهاز العصبي

Sedatives, hyponotics: روشتة المهدئات والمنومات


الهدف تقليل من النشاط العصبي في المخ وتقليل من النقل العصبي بالأعصاب

Mechanism of action:

↑ GABA receptors action, number
lead to hyperpolarization,
decrease CNS action, impulse

Uses:

Sedation, sleep, anticonvulsant,
↑ analgesic action, anathesia,
anti-anxiety

الروشتة:

R/ Diazepam (valinil, valpam, valium, neural) tab, amp
امبول عند اللزوم او قرص مرتين في اليوم

Anxiety treatment: روشتة لعلاج القلق والاضطرابات النفسية

R/ Lustral, prozac cap 1x1

قرص مرة يوميا

R/ Promazepam (calmepam, bropan, lexotanil) tab 1x1

قرص مرة يوميا

Insomnia: روشتة لعلاج الارق

-Hot shower, constant sleeping
time, drink milk, ↓light

R/ Dormival or triacectin

قرصين قبل النوم

R/ Avil or allergex tab 1x1

قرص عند اللزوم

Tremors: روشتة لعلاج الرعشات الإرادية

R/ Inderal tab قرص مرة يوميا

Trigeminal neuralgia, sciatica, nerve pain:


روشتة لعلاج الام الاعصاب

R/ tegretol 1x2 tab or arenypathic tab

قرص مرتين في اليوم

R/ neurovit OR depovit OR neuroton amp

امبول كل يوم ويوم لمدة اسبوعين ثم امبول كل شهر

**Anticonvulsants(anti epilepsy) (antiseizures):**

روشتة لعلاج الصرع والتشنجات الارادية


ادوية تقلل من الافرازات العصبية من المخ فتقلل التشنجات الارادية (الصرع)

R/ depakine OR valpokin 1x2 tab

قرص مرتين في اليوم

R/ epanutin OR phenytoin 1x2 tab


قرص مرتين في اليوم

**Antidepressant: روشتة مضادات الاكتئاب**

هي ادوية تقلل من التخلص من النواقل العصبية

فتزيد كمية النواقل العصبية وينشط المخ ويقل

الاكتئاب لان سببه هو قلة النواقل العصبية



R/ anfranil 1x2 t قرص مرتين في اليوم

R/ citalo, cipramex, deprim 1x1 tab قرص مرة في اليوم

Stroke: روشتة لعلاج الجلطات الدماغية

هي حدوث مشكلة في الجهاز العصبي مع غيبوبة بسبب مشكلة في القلب

او الشرايين

- airway , O2, symptomatic treatment, causative treatment
- aspirin (aspocid, palvix)
- thrombolytic early as altepase
- heparin, marevan
- rantidine
- antibiotics
- nootropil


روشتة لعلاج الشلل الرعاش: Antiparkinsonism

سبب الشلل الرعاش هو زيادة كمية الاسيتيل كولين وقلة الدوبامين في المخ ولعلاجه نعطي الدوية تقلل الاسيتيل كولين وتزيد من الدوبامين في المخ

Parkinsonism is due to decrease dopamine, increase Ach
So for treating it we give:

Dopaminergic drugs: to increase dopamine

Carbidopa+levodopa
R/ lecardopa, levocar,
sinemet) 1x2 tab
قرص مرتين في اليوم



Antimuscarinics: to decrease Ach

R/ Benztropine (Cogintol) 1x2
قرص مرتين في اليوم


Diagnosis of death

تشخيص الوفاة:

- 1- حركة الجسم متوقفة تماما
- 2- حركة التنفس متوقفة تماما
- 3- ضربات القلب والنبض متوقف تماما
- 4- العين لا تستجيب لأي مؤثر ولا تضيق مع تقريب أي ضوء منها
- 5- غياب اللمعان في القرنية بالعين وتصبح معتمة
- 6- ظهور تبس في عضلات الجسم
- 7- يبدأ ظهور لون بنفسجي يتجمع في الجلد في الجزء الملامس للأرض
- 8- قلة درجة حرارة الجسم تدريجيا ويصبح الجسم بارد
- 9- لا يوجد ردة فعل عند ادخال الاصبع داخل الفم ويخرج منه سائل أبيض
- 10- رسم القلب يؤكد الوفاة بوجود الشكل المميز لتوقف القلب

Headache : الصداع


اسباب الصداع

اسباب الصداع ممكن تكون :

- 1- ارتفاع الضغط (معه زغلة في العينين وطنين في الاذن + ضغط عالي)
 - 2 - الجيوب الانفية (معه رشح مستمر والم وسخونية احيانا)
 - 3- التهاب الاذن الوسطى (وسخونية وطنين معه قلة في السمع و ممكن صديد)
 - 4 - العدوى والانفلونزا (سخونية ووجع بالجسم ورشح وكحه)
 - 5 - مشاكل النظر (معه مشكلة في الرؤية وزغلة بالعينين)
 - 6- الانيميا (معه شحوب وقلة في المجهود وزيادة في ضربات القلب)
 - 7- وجع الاسنان (معه وجع شديد بالاسنان)
 - 8- الامساك المزمن (معه امساك وتوتر)
 - 9- الاورام بالمخ والضغط على الاعصاب (مستمر يزيد صباحا ومعه ترجيع مفاجيء)
 - 10- الصداع النصفي (صداع في ناحية واحدة يسبقه احساس بالقيء وهلوسة)
- ربما يكون سبب الصداع غير معروف

العلاج:

- البحث عن السبب قبل العلاج في حالة الصداع المستمر
- علاج السبب كالضغط وعيوب الابصار وغيرها
- اعطاء المسكنات

Causes of insomnia: الارقTreatment• Antihistaminic :

as diphenhydramine & doxylamine at bedtime


• Plant extracts :

- Valerians (Dormival) *
- Kava kava extract (kava) *


الروشتة :

R/ avil tab or allergex tab قرص قبل النوم

R/ Dormival or kava tab قرص قبل النوم

Causes of low back pain: اسباب وجع الظهر


يتم علاج المسبب مع اعطاء المسكنات ومبسطات العضلات وفيتامين ب 12

Fatigue: اسباب التعب وقلة المجهودCauses:Treatment: "for fatigue & weakness(1) Caffeine stimulant:(2) multivitamins

- Supply vitamins and minerals and energizers
- Avoid those concentrate on iron or calcium
- Multivitamins are taken once daily after meal

(3) Multivitamins

- (1) royal jelly
- (2) vitamins and minerals
- (3) ginseng
- (4) wheat germ oil
- (5) antioxidant
- (6) Bee pollen



الروشتة :

R/ Royal jelly 600 mg tab كبسولة يوميا بعد الغداء

Prescriptions:

Diabetes type II: روصتة مرضى السكر النوع الثانى

قرص مرة واحدة يوميا R/ amaryl tab (1, 2, 3, 4 mg) 1x1

قرص 3 مرات يوميا R/ cidophage tab 1x3

Hypothyroidism: روصتة لنقص افراز الغدة الدرقية

قرص مرة واحدة يوميا - Eltroxin tab 1x1

Hyperthyroidism: روصتة لزيادة افراز الغدة الدرقية

قرص مرتين يوميا R/ neomercazole tab 1x2

قرص مرة واحدة يوميا R/ inderal tab 1x1

Neuralgia: روصتة لوجع الاعصاب

R/ neuroton or depovit amp 3 / week

امبول كل يوم ويوم لمدة اسبوعين ثم امبول واحد شهريا

قرص مرة واحدة يوميا R/ tegretol tab 1x1 if needed

Epilepsy: روصتة لعلاج الصرع والتشنجات الارادية

قرص مرتين يوميا - depakine tab 1x2

قرص مرتين يوميا or tegretol tab 1x2


Depression: روصتة لعلاج الاكتئاب

قرص مرتين فى اليوم Anafranil or tryptizol tab 1x2

Parkinsonism: روصتة لعلاج الشلل الرعاش

قرص مرتين يوميا - lecardopa or sinemet tab 1x2

قرص مرتين يوميا - cogintol tab 1x2



Infection prescriptions روشتات العدوى

Infection

اعراض العدوى

مريض يسخن وعنده وجع في جسمه كله وعنده اعراض حسب المكان

العدوى البكتيرية يصاحبها صديد

- عدوى الجهاز الهضمي يبقّى معها اسهال وترجيع وراحة كريهة بالفم
- عدوى الجهاز التنفسي يبقّى معها كحة بيلغم ورشح وصعوبة التنفس
- عدوى الجهاز البولي يبقّى معها صديد وحرقان وصعوبة في البول
- عدوى الجهاز التناسلي يبقّى معها افرازات من الاعضاء التناسلية ريحتها سيئة ووجع بالاعضاء التناسلية وصعوبة في الجماع
- عدوى الجلد يبقّى معها احمرار وبقع بالجلد وخراج بالجلد

عدوى الفيروسات لا يصاحبها صديد الا لو صاحبها عدوى بكتيرية


عدوى الفطريات غالبا تصيب الجلد مثل تنين القدم والرأس

عدوى الديدان يصاحبها نقص في الوزن ووجع في البطن واسهال ويمكن ان

يصاحبها انيميا

نستخدم المضادات الحيوية للتخلص من العدوى البكتيرية والحماية منها
ونستخدم ايضا المضادات الحيوية مع العدوى الفيروسية والطفيليات لتجنب
الاصابة بالبكتيريا نظرا لضعف مناعة المريض

Structure of bacteria:



Mechanism of action of antibiotics:

- cell wall synthesis inhibition
- bacterial protein synthesis inhibition
- nucleic acid (DNA) synthesis inhibition
- increase permeability of cytoplasmic membrane

Types of antibiotics (antibacterial):

Broad spectrum against +ve, -ve bacteria

Narrow spectrum against one type only

Types and uses of antibiotics:**انواع واستخدامات المضادات الحيوية**Cell wall inhibitors:1) Penicillins:يستخدم مع عدوى الجهاز التنفسي والجلد والاطفال والحوامل واي بكتريا خاصة البكتريا الموجبةالروشتة:

R/ hibiatic or augmentin 625 mg cap

قرص 3 مرات في اليوم

R/ flumox or amoxcillin 500 cap

قرص 3 مرات في اليوم

2) Cephalosporins:العمليات وعدوى الجلد والجهاز التنفسي الاطفال والحوامل واي بكتريا خاصة البكتريا السالبةالروشتة:R/ cefotax or ceftriaxone or cefazone
amp 500 mg

امبول كل 12 ساعة ورید او عضل

R/ velosef or curisafe tab 500 mg

قرص 3 مرات في اليوم




Protein inhibitors:Macroloides:

يستخدم مع عدوى الاطفال والاسنان والحساسية من البنسلين والكيفالوسبورين

الروشتة:

R/ zithromax or xithrone
suspention or tab
معلقة مرة واحدة في اليوم لمدة 3 ايام

R/ erythromycin tab 500
قرص 3 مرات في اليوم


DNA inhibitors:Quinolones:

يستخدم مع عدوى الجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي خاصة البكتريا المسالبة

الروشتة:

R/ Ciprofar or ciprofloxacin or ciprobay
500 tab قرص مرتين في اليوم

R/ tavanic or leflox or tavacin 500 tab
قرص مرة يوميا

Cheap antibiotics:Sulphamethexazole

(sulphamethazole+trimethoprim)

inhibit formation of folic acid, DNA
-Effective , used with respiratory,
urinary infection

الروشتة:

R/ septrin tab
قرص مرتين يوميا




Others:- Rifampicin:

It inhibits RNA synthesis

Used for

Tuberculosis treatment,
haemophilus influenza

E.g: rimactane, rifampin cap 1x3

الروشتة:

R/ Rimactane or rifampin tab



قرص 3 مرات في اليوم

Tuberculosis treatment:علاج الدرن

Isoniazide+ rifampicin for 9 months

+ pyrazinamide for 2 months

We add vit B6 to avoid neuritis caused
by isoniazide

Mechanism of action of antituberculosis drugs

Roshetatologyعلاج الاميبيا وعدوى الجهاز الهضمي
amoeba, gastroenteritisمضاد حيوي و مطهر معوي: Nifuroxazide:

Used in GIT infection

R/ antinal, diax 1x3

يقتل الاميبيا والبكتريا الاهوائية: Metronidazole:Used to treat protozoa esp. Amoeba ,
anaerobic bacteria

R/ flagyl, amrizole 1x3

(tindazole+norfloxacin):

R/ Conaz, norfloxacin TZ 1X2

Used with GIT infection

روشتة للاميبيا والاسهال :

R/ flagyl tab 500

قرص 3 مرات في اليوم

R/ antinal tab

قرص 3 مرات في اليوم

علاج الامراض الفيروسية: Viruses:

-Fluids, rest, symptomatic treatment,

-antibiotics to avoid 2ry infections

-we use influenza vaccine to avoid it

In herpes simplex treatment:

Acyclovir tab, cream 1x5x5

+ abs+ gentian violet 1% local

In herpes zoster treatment:


ponstan tab 1x3 , tegratol 1x3,

neurotin 1x3 , calamyl lotion 1x3

Hepatitis C:

-Interferon (alfaron , betaferon) injection

-Ribavirin (hepatovirin , panvirin) cap. , & syp



علاج الديدان**ANTHELMINTIC DRUGS**

الأمراض المصاحبة للإصابة بالديدان تختلف تبعاً لنوعها وغالباً ما تنحصر في عدة أمراض وهي:

- فقدان الشهية
- زيادة الشهية من دون أن تقابلها زيادة في الوزن
- في بعض أنواع الديدان يصاب الطفل بحالة من الحكّة في فتحة الشرج
- في الحالات الشديدة قد يصاحب ذلك ألم في البطن

يتم تحديد نوع الديدان من طريق تحليل البراز

Treatment of Trematodes & Cystodes

Worm	Drug of choice	Alternative
1 - Bilharziasis	Praziquantel 40 mg/kg single oral dose or 20 mg/kg 3 doses in one day	Miracid (commiphora) 10mg/kg x3-6 days
2 - Taenia solium	Praziquantel 10 mg/kg single oral dose	
3 - Taenia saginata	Praziquantel 10 mg/kg single oral dose	Niclosamide 2 g on empty stomach then saline purge
4 - Hymenolepis nana	Praziquantel 25 mg/kg single oral dose	Niclosamide 2 g after breakfast x7 days

Treatment of Nematodes

Worm	Albendazole	Flubendazole	Mebendazole	Levamisole
1- Ascaris	400 mg single dose	100 mg x 2 x 3	100 mg x 2 x 3	150 mg single dose
2- Ancylostoma	400 mg single dose	100 mg x 2 x 3	100 mg x 2 x 3	150 mg single dose
3- Oxyuris	400 mg single dose repeat after 2 weeks	100 mg od repeat after 2 & 4 weeks	100 mg od repeat after 2 & 4 weeks	
4- Strongyloids	400 mg x 2 x (3-7) repeat after 2 weeks	100 mg x 2 x 3	100 mg x 2 x 3	
5- Trichuris	400 mg single dose	100 mg x 2 x 3	100 mg x 2 x 3	

Albendazole → 400 mg single dose in both adults and children over two years of age
200 mg single dose in children between one and two years of age

(Alzental, Bendax & Vermizole)® → Available in the form of **Suspension (100mg/5ml)** and **Tablet (200mg)**

Flubendazole & Mebendazole → 100 mg / dose ... oral ... Twice daily ... for 3 days
The dose (100 mg) is the same for all ages

(Mebendazole → (Antiver & Vermin)® Flubendazole → (Flub & Fluver)®) → (100 mg)

Levamisole → (katrex)® ▶ Immunostimulant: Useful in chronic and recurrent infections & rheumatoid arthritis

الأطفال من 4-1 سنوات 5 مللي ومن عمر 5-15 عام 10 مللي وكبير من 16 عام 3 أقراص أو 15 مللي جرعة واحدة

Niclosamide → (Yomesan)® tablets (500mg)

يجب مضغ الأقراص قبل بلعها، لعمر أكبر من 6 سنوات 4 أقراص مضغ ثم قرصين يوميا لمدة أسبوع بطني بعد العلاج يوم
ثلاثة ملح أو زيت لطره المبدان



الديدان Worms

طفل يياكل كثير وجسمه رفيع مش بيكبر وبطنه
بتوجعه عطول و في مشاكل في البراز زي الاسهال
وساعات دم ومخاط
نعمله تحليل براز ونتأكد من وجود الدودة او بيضها

روشتة للديدان:

R/ Albendazole (antiver, vermin) 1x2x3 tab

قرص مرتين في اليوم لمدة 3 ايام

R/ Mebendazole (vermizole, antizole) tab

R/ Flubendazole (flub, fluver, fluvermal) tab

For bilharziasis, flat, tape worms :


البهارسيا والديدان المفلطحة والديدان الاسطوانية

R/ biltricide (prazequantal) tab 4x1 اربع حبوب جرعة واحدة

روشتة لعلاج عدوى الجلد المراهم والكريمات المستخدمة لعلاج الامراض الجلدية

Antibacterial for infections:

R/ Gentamycin (garamycin, gentamycin) cream, oint. 1x3
دهان موضعي 3 مرات في اليوم




R/ Fusidic acid (fusiderm), polymyxin-b (terramycin) 1x3

R/ Antibiotic + corticosteroids (anti-inflammatory) + anti fungal
(quadri-derm, poly-derm, tri-derm, kenacomb) 1x3

روشتة لعلاج الفطريات:

R/ fluconazole
(diflucan, fungican, flucazole) tab
قرص واحد يكرر بعد اسبوعين



R/ miconaz or trosyd or candistan
cream دهان موضعي 3 مرات في اليوم

Oral antiseptic (lozenge):

روشتة مستحلبات لالم الزور

R/ Bradoral, zora-c 1x3
قرص 3 مرات في اليوم



Triple therapy :

يستخدم هذا النوع من اعلاج عندما يصعب تحديد نوع البكتريا المسببة للمرض او وجود العديد من البكتريا معا في الاصابات الخطيرة مثل التهاب الغشاء البريتوني و تسهم الدم ويعطى المريض مضادات حيوية تغطي جميع انواع البكتريا معا

R/ unasyn 1g vial 1x2 تغطي البكتريا الموجبة

R/ ceftriaxone 1 gm vial يغطي البكتريا السالبة

R/ flagyl drip 500 mg 1x2 يغطي البكتريا الا هوائية


RoshetatologyMouth wash: غرغرة الفم

- For ulcer, bad mouth odour

R/ Oxymeria, oracin, orazid ,
orasan mouth wash 1x3
غسول للفم ثلاثة مرات في اليوم

روشتة المضادات الحيوية المستخدمة للأطفال

- Penicillin suspension, vial
- Erythromycin suspension
- 3rd cephalosporins vial
- sulpha (septrin , septazol) 1x2

الروشتة:

R/ hibiolic or augmentin 375 mg suspension

ملعقة 3 مرات في اليوم

R/ ceftriaxone or cefotax or cefazone amp 500 mg

امبول كل 12 ساعة وريد او عضل حسب الجرعة

روشتة المضادات الحيوية المستخدمة للحوامل

- Penicillin,
- 3rd cephalosporins vial

الروشتة:

R/ hibiolic or augmentin 625 mg or
flumox 500 mg tab

قرص 3 مرات في اليوم

R/ ceftriaxone or cefotax or cefazone
amp 1 gm

امبول كل 12 ساعة وريد او عضل حسب الجرعة



Lactation: روشتة المضادات الحيوية المستخدمة مع الرضاعة

- Penicillin,
- 3rd cephalosporins vial

الروشتة:

R/ hibirotic or augmentin 625 mg or flummox 500 mg tab

قرص 3 مرات في اليوم

R/ ceftriaxone or cefotax or cefazone amp 500 mg

امبول كل 12 ساعة وريد او عضل حسب الجرعة

Hepatic patient: روشتة المضادات الحيوية المستخدمة مع مرضى الكبد

- Penicillin, neomycin, flagyl

الروشتة:

R/ hibirotic or augmentin 625 or flummox 500 mg tab

قرص 3 مرات في اليوم

R/ flagyl tab 500

قرص 3 مرات في اليوم

Disinfectants: روشتة مطهرات الجلد

Used for wounds and prevent sepsis (betadine, setavlon)

الروشتة:

R/ betadine wash

دهان على الجرح 3 مرات في اليوم

Wounds: روشتة علاج الجروح

- Antibiotics, anti-inflammatory, antiedematous
- Scar reducing agents (scartex gel , verdex lotion, scaro)
- (solcoseryl(jelly amp), dexpanthenol cream→healing

الروشتة:

R/ hibirotic 625 or ibidroxil cap 1 x3 قرص 3 مرات في اليوم

R/ cataflam or ketoprofen 1x3 قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل

R/ alphintern or ambezim tab 1x3 قرص 3 مرات في اليوم قبل الاكل

R/ scaro or scartex gel 1x3 دهان 3 مرات في اليوم

Roshtatologyروشتة علاج الحروق-Antibiotic

(penicillin or cephalosporins)

-Anti-inflammatory

(cataflam or ketoprofen)

-Local antibiotic


(dermazine, sulphargine or argiderm -p)

-Local anti-inflammatory

(voltaren emulgel)

-B-sitosterol (Mebo cream) → يساعد على سرعة التئام الحرق

promote regeneration

-cover wound with sterile Vaseline gauzeالروشتة:Burn: الحروق

قرص 3 مرات في اليوم R/ hibiolic 625 or ibidroxil cap 1 x3

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل R/ cataflam or ketoprofen 1x3

دهان موضعي 3 مرات في اليوم R/ dermazine cream 1x3

دهان موضعي 3 مرات في اليوم R/ voltaren emulgel 1x3

دهان موضعي مرتين في اليوم R/ Mebo cream 1x2

cover wound with sterile Vaseline gauzeحب الشباب: Acneالروشتة:

R/ salycilic acid soap wash to face

R/ acne free cream (1x2, not exposed for sun)

R/ akneroxid cream (after acne free)

R/ tetracycline 500 or dalacin or clindacin tab 1x3

R/ vit A 2500 iu tab

R/ diane tab for women

R/ avoid carbohydrates, lipid, chocolate, spicy food

Prescriptions:

Respiratory infection: روشتة لعدوى الجهاز التنفسي

انا سخنت وعندي كحة ببلغم وزوري بيوجعني

R/ hibiolic cap 625 1x3

كبسولة 3 مرات في اليوم

مضاد حيوي قاتل للبكتريا

R/ bisilvon syr 1x3

ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم

لللكحة والبلغم

R/ rapiflam tab 1x3 50 mg

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل

يقلل الالم والحرارة

Gastroentritis: روشتة لعلاج النزلة المعوية

انا سخنت ورجعت وعندي اسهال شديد ورعشة

R/ ciprofloxacin cap 500 1x2

كبسولة مرتين في اليوم

مضاد حيوي قاتل للبكتريا

R/ ketofan tab 1x2

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل

يقلل الحرارة والالم والالتهاب

R/ primpran tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

للترجيع

R/ streptoquin tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

يقلل الاسهال ويقتل الاميبا

تعويض السوائل المفقودة عن طريق محاليل للكبار ومحلول جفاف للأطفال

Influenza: روشتة الانفلونزا

انا عندي انفلوانزا (سخونية ورشح ووجع بالجسم وممكن كحة ببلغم)

R/ congestal or flurest tab 1x3

قرص 3 مرات في اليوم

يقلل الالم والحرارة والرشح والحساسية

R/ septazol tab 2x2

قرصين مرتين في اليوم

مضاد حيوي قاتل للبكتريا لمنع الاصابة ببكتريا اثناء الانفلوانزا

R/ cevarol tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

يحتوي على فيتامين سي ليقوى المناعة ومعه مسن وخافض للحرارة

R/ rest, hot fluids

راحة وسوائل دافئة

روشتة الحروق: Burn:

قرص 3 مرات في اليوم R/ hibiatic 625 or ibidroxil cap 1 x3
 مضاد حيوى قاتل للبكتريا
 قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل R/ cataflam or ketoprofen 1x3
 يقلل الحرارة والالم والالتهاب
 دهان موضعي 3 مرات في اليوم R/ dermazine cream 1x3
 مضاد حيوى قاتل للبكتريا
 دهان موضعي 3 مرات في اليوم R/ voltaren emulgel 1x3
 يقلل الحرارة والالم والالتهاب
 دهان موضعي مرتين في اليوم R/ Mebo cream 1x2
 يساعد على سرعة التئام الحرق
 - cover wound with sterile Vaseline gauze

روشتة العدوى البكتيرية بالجلد: Tissue infection:

انا عندي دمامل في جسمي كله يا دكتور

قرص 3 مرات في اليوم R/ augmentin or hibiatic cap 625 1x3
 مضاد حيوى قاتل للبكتريا
 دهان موضعي 3 مرات في اليوم R/ gramycin cream 1x3
 مضاد حيوى قاتل للبكتريا
 قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل R/ brufen tab 400 1x3
 يقلل الحرارة والالم والالتهاب
 دهان موضعي 3 مرات في اليوم R/ voltaren emulgel 1x3
 يقلل الحرارة والالم والالتهاب

روشتة البلهارسيا: Bilharziasis:

اربع اقراص جرعة واحدة R/ Biltricide tab 4 tablet single dose
 يقتل البلهارسيا



Analgesics prescriptions روشتات المسكنات


Antipyretic analgesia:NSAIDS (non steroidal anti inflammatory drugs)المسكنات وخافضات الحرارة الغير مخدرةGeneral uses of analgesics: الاستخدامات

analgesics inhibit COX enzyme and decrease prostaglandins so

تستخدم المسكنات في حالات الألم والالتهابات وارتفاع درجة الحرارة لأنها تقلل البروستاجلاندين المسئول عن الألم والحرارة والالتهابات

حالات الألم مثل الصداع والم الاسنان والم الدورة والم العضلات والعظام وغيرها

معظم المسكنات المستخدمة في السوق واستخداماتها

NSAIDs classificationNon selective NSAIDs

Diclofenac
Ibuprofen
Ketoprofen
Aspirin
Naproxen
Piroxicam
Indomethacin
Mefenamic acid

Selective NSAIDs

Celecoxib
Rofecoxib
Etoricoxib
Meloxicam

الاسبرين Aspirin

مسكن و خافض للحرارة ومضاد للالتهاب
واهم استخدام انه مانع للجلطات ويستخدم مع
الندبات الجلدية لازالتها



روشتة لتقليل الألم والالتهابات والحمى

R/ aspirin or alexoprin tab 300 mg

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل لتقليل الألم

روشتة لمنع الجلطات مع مرضى القلب والضغط والسكر وغيرهم

R/ aspocid children tab 75 mg (1 LE)

قرصين بعد الغداء لمنع التجلطات

Ketrolac:

يمكن ان يعطى عن طريق الوريد او العضل
وبالتالى فهو سريع المفعول ويمكن ان يستخدم مع
المغص الكلوى وحالات الألم الشديدة



R/ adolor or ketolac amp (2 LE)

امبول وريد او عضل عند اللزوم

من الاعراض الجانبية للمسكنات احداث قرحة المعدة ولذلك تاخذ بعد الاكل

Ketoprofen:

يستخدم مع الصداع والم الاسنان والم الدورة

R/ Ketofan (5 LE) , ketolgin,

ketoprofen (50 mg) tab

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل



Diclofenac:

من اقوى المسكنات خاصة مع العمليات والعظام
ومعظم انواع الالم
و لا يستخدم مع وجود خلل في وظائف الكلى او
الكبد او الحوامل او قرحة المعدة او مرضى القلب

R/ Voltaren or cataflam amp or tab 50
قرص مرتين فى اليوم بعد الاكل

**Ibuprofen:**

يستخدم لارتفاع الحرارة والالم والصداع
خاصة الاطفال

R/ brufen tab or syrup 400 mg
قرص 3 مرات فى اليوم بعد الاكل

**Piroxicam:**

مسكن قوى ومضاد للالتهاب خاصة مع مرضى
الروماتزم

R/ feldene tab 10 mg (14.5 LE)
قرص مرتين فى اليوم بعد الاكل

**Paracetamol:**

يستخدم لارتفاع الحرارة والالم والصداع مع عدم احداث قرحة او الم بالمعدة و
هو لا يمنع الالتهابات ويمكن ان يستخدم مع الحوامل
ومرضى الكبد و مرضى الكلى و الاطفال ولذلك فهو
من امن المسكنات

R/ panadol or abimol or cetal or paramol
قرص 3 مرات فى اليوم 500 mg

R/ perphlgan or injectamol drip تنقيط وريدى

**Anticox H**

ب الام البطن

They act

not cause

E.g:

-Meloxicam

(7.5-15mg)

-Nimesulide

-Celecoxib

(100, 200)

Analgesic

لاطفال

Paracetamol

babies 1x3

Paracetamol

suppository

Diclofenac

(12.5-25 mg)

Topical analgesic

التهابات والالم

Used locally

-diclofenac

voltaren, o

-ketoprofen

fastum, pr

-piroxicam

feldene, dis

-nimesulide

sulide, me

د/ احمد عبدالله

Anticox II:

مسكنات لا تؤثر على المعدة ولا تسبب الام البطن


They act only in COX II found in tissue so not cause peptic ulcer but it is less potent

E.g:

-**Meloxicam:** mobic, melocam, mexicam (7.5-15mg) (1x2)

-**Nimesulide:** sulide, nimalox 200 mg 1x2

-**Celecoxib:** cerebrex, celoxib (100, 200 mg) (1x2)

**Analgesics used for children :**

روشتة المسكنات المستخدمة مع الاطفال

Paracetamol: tempra or cetal drops for babies 1x3

Paracetamol, brufen syrup or suppository 1X3

Diclofenac: voltaren, dolphin supp (12.5-25 mg) 1X2

**Topical analgesics:**

روشتة المسكنات الموضعية المستخدمة للجلد لتخفيف التهابات والام

Used local for skin inflammation, pain

-**diclofenac:**

voltaren, olfen gel 1x3

-**ketoprofen:**


fastum, profenid gel 1x3

-**piroxicam:**

feldene, dispercam gel 1x3

-**nimesulide:**

sulide, mesulan gel 1x3



Migraine: روضة لعلاج الصداع النصفي

هو صداع يحدث بجهة واحدة من الرأس يبدأ بانقباض بشرابين الدماغ مع احساس بالترجيع وتغير المزاج ثم يحدث بها اتساع مسببا صداع شديد

Unilateral headache due to release of serotonin (5HT)

Treatment:

During acute attack we maintain VC

by:

Sumatriptan (5HT agonist) or
ergotamine (vasoconstrictor) e.g:

nomigran, imigran, metrograine عند اللزوم

For prevention we use calcium channels
blockers like nifedipine as it inhibit VC

**Pain with muscle spasm:**

روضة لعلاج التقلصات العضلية والام العضلات والرقبة والظهر

نعطي دواء يحتوى على باسط للعضلات + مسكن

-We use

(muscle relaxant + analgesic)

R/ Flexofan (4.5 LE)

(chlorzoxazone + ketoprofen) 1x2

R/ Myofen (4 LE)

(chlorzoxazone + ibuprofen) 1x2

R/ Myolax, relax, mylogin (5 LE)

(chlorzoxazone + paracetamol) 1x2

**Osteoarthritis:** روضة لعلاج الام المفاصل والروماتزم

Analgesics + proton pump I + glucosamine or cartilgin

R/ feldene 10 1x2 tab after meal مسكن لتقليل الالم

R/ omez 20 tab 1x2 (PPI) يقلل من حدوث قرحة المعدة

R/ glucosamine tab 1x2 لتكوين المادة الجيلاتينية بين المفاصل


Pregnancy: روضة المسكنات المستخدمة مع الحوامل

R/ Paracetamol tab 1x3 (1.5 LE)

Hepatic patient:

روشتة المسكنات المستخدمة مع مرضى الكبد

R/ Paracetamol (hepamol) tab 1x3 (4 LE)

**Hypertension:** روشتة المسكنات المستخدمة مع مرضى الضغط

R/ Cataflam K or any type if tension is controlled 1x2

Peptic ulcer: روشتة المسكنات المستخدمة مع مرضى القرحة المعدية

Opoids, paracetamol, antcox II + proton pump inhibitor

Trauma: لعلاج الكدمات الناتجة عن الحوادث

- Analgesic for pain, inflammation

+ excess protein removers

+ antibiotic to avoid infection

الروشتة:

R/ Hibiotic 625 tab 1X3 for infection

مضاد حيوي قاتل للبكتريا

R/ Cataflam 1x2 after meal

مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب

R/ α chemotrypsin amp or alphintern or ambeziem tab 1x3

يقلل التورمات والالتهابات

R/ Hemoclar or reparil gel or alpha kadol cream 1x3

دهان موضعي يقلل التورمات والالتهابات والتجمعات الدموية

**Narcotic analgesia** روشتة المسكنات المخدرة

R/ morphine 10 mg or pethidine 100 mg amp

يحل الامبول على 10 سم ملح ويعطى المريض 3 سم كل 6 ساعات

يستخدم في حالات الألم الشديد مثل بعد العمليات الجراحية والم السرطانات

Prescriptions:

انا عاوز حاجة للصداع يا دكتور

R/ ketofan or brufen 400 tablet

عند الزوم بعد الاكل

سناتى بتوجعنى يا دكتور اعمل ايه

R/ cataflam or voltaren 50 tab 1x2

بعد الاكل

انا عندى الم فى العضلات يا دكتور ومش عارف اتحرك

R/ flexofan or myofen cap 1x2

بعد الاكل

عندى الم بالمفاصل يا دكتور بس بطنى بتوجعنى من المسكنات

R/ mexicam or mobic tab 1x2

بعد الاكل

R/ omez tab 1x1

يقلل من افراز السائل المعدى ويقلل حدوث القرحة بسبب المسكنات

انا عندى صداع نصفى يا دكتور

R/ nomigran OR imigran 1X3

انا حامل و عاوزة حاجة مسكنة

R/ paramol or abimol tab 1x3

عندى الم فى الجلد او حرق بسيط او

R/ olfen or fastum gel 1x3

local

ابنى الرضيع سخن

Tempra or cetaral drop or dolfin supp 1x3

د/ احمد عبدالله



Surgery prescriptions

روشتات الجراحة

روشته الدوالي: Varicose vein:

الأوردة الموجودة بالأرجل متسعة وضعيفة ومملوءة بالدم نتيجة ضعف الصمامات بها

R/ rutin-c, rutalex or daflon, dafrex tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

تقوى الاوعية الدموية الموجودة وتقتل البواسير

R/ hemoclar , reparil-n, haemocure gel 1x3

دهان موضعی 3 مرات فی الیوم

تَقْلِلُ التَّوْرَمَ وَالْإِلْتِهَابَ



They are vascular insufficiency drugs
(↑capillary function, ↓leakage) to treat
varicose veins

Haemorrhoids (piles) : روشة البواسير

الأوردة الموجودة بمنطقة الشرج متسعة وضعيفة ومملوءة بالدم نتيجة ضعفها والمريض يعاني من دم بالبراز

R/ sediprotect, proctosedyl, procto-4 , procto-lidosine
cream or supp 1x2

لبوسة موضعية او كريم مرتين فى اليوم

يحتوي على مخدر موضعي وكورتيزون مضاد للالتهاب ويحتوي على مضاد

حيوى قاتل للبكتريا

R/ laxative (minalax, lacin, bisadyl) tab 1x2

فرص مرتين في اليوم

ملين للبراز ليسهل عملية التبرز فيقلل احداث الجروح والالم

R/ rutin-c, rutalex or daflon, dafrex tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

تقوى الاوعية الدموية الموجودة وتقلل البواسير

R/ analgesics (ketofan, cataflam) tab 1x2

فرص مرتين في اليوم

مسكن لتقليل الألم و الالتهاب

روشتة شرح الشرج: Anal fissure:

شرح موجود بالشرح مع وجع شديد والم و تزييف وصعوبة في عملية البراز

R/ glycerine supp, other laxatives to soften stool 1x2

قرص مرتين في اليوم

ملين للبراز ليسهل عملية التبرز فيقلل احداث الجروح والالم

R/ sediprotect, proctosedyl, procto-4 , proccto-lidosine cream or supp 1x2

لبوسة موضعية او كريم مرتين في اليوم

يحتوى على مخدر موضعي وكورتيزون مضاد للالتهاب ويحتوى على مضاد حيوى قاتل للبكتريا

R/ vinosin cream or GTN cream

كريم مرتين في اليوم

يقوم بانبساط في عضلات فتحة الشرج فيسهل التبرز

R/ analgesics (ketofan, cataflam) tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

مسكن لتقليل الالم والالتهاب

روشتة علاج الجروح: Wounds:

-Antibiotics, anti-inflammatory, antiedematous

-Scar reducing agents (scartex gel , verdex lotion, scaro)

(solcoseryl (jelly amp), dexpanthenol cream → healing

الروشتة :

R/ hibiolic 625 or ibidroxil cap 1 x3

قرص 3 مرات في اليوم

R/ cataflam or ketoprofen 1x3

قرص 3 مرات في اليوم بعد الاكل

R/ alphintern or ambezim tab 1x3

قرص 3 مرات في اليوم قبل الاكل

R/ scaro or scartex gel 1x3

دهان 3 مرات في اليوم

التعامل مع عضه الحيوانات animal bite:

يتم تنظيف الجرح وتعقيمه - اعطاء مضاد حيوى - اعطاء امبول تيتانوس
تغطية الجرح بشاش معقم مع عدم تخيطه - اعطاء المصل في حالات محدد

Roshetatology

Abscess pain:

روشتة علاج الدمامل والخراج
Open abscess , drain pus
+ antibiotics
+ analgesics
+ antiedematous
طريقة فتح الخراج:



الطريقة

في أكثر منطقة يتجمع فيها الصديد نقطع بالمشرط 1-2 سم ونبدأ نعصر الجرح حتى نفضيه من الصديد ثم ندخل بالارترى مقفول ونفتحه (طريقة هيلتون) حتى نوسع الفتحة ونتخلص من الصديد ثم نضع ماء اكسجين وبيتادين لتطهير الجرح ونضع قطعة من الشاش داخل الجرح لازالة اى صديد جديد متكون ونغطي الجرح ونعطي مضاد حيوى ومسكن قوى

EXPLORING AN ABSCESS



الروشتة:

R/ Hibiotic 625 tab 1X3 for infection

مضاد حيوى قاتل للبكتريا

R/ Cataflam 1x2 after meal

مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب

R/ α chemotrypsin amp or alphintern or ambeziem tab 1x3

يقلل التورمات والالتهابات

R/ Hemoclar or reparil gel or alpha kadol cream 1x3


دهان موضعى يقلل التورمات والالتهابات والتجمعات الدموية

Cholecystitis

اعراضه

وجع في الجنب اليمين يسمع في الكتف اليمين او في قم المعدة او الظهر وغالبا
ست تخينه في سن الاربعينات

CHOLECYSTITIS



العلاج: Treatment:

In acute case:

ketolac amp + visceralgine amp + primperan amp + zantac amp

In home:

R/ ursofalk or urscol cap (Ursodeoxycholic Acid) 1x2

يقلل افراز الكوليستيرول ويساعد على تفتيت الحصوات

R/ Rowachol or bilichol cap 1x3

يساعد على تفتيت الحصوات

R/ visceralgine tab 1x3

بأسط للعضلات اللا ارادية يقلل المص

اعراضه:

المريض ليس لديه غازات او براز لفترة ومعه ترجيع ومعه انتفاخ شديد في البطن يمكن ان يكون بعد عملية جراحية او بسبب انسداد الامعاء مع الفحص نجد بطن المريض منتفخة ومليئة بالهواء و عند عمل اشعة عادية للمريض تظهر الغازات في الاشعة العادية

العلاج:

- لا شيء بالفم ويتم اعطاء محاليل للمريض
- تركيب انبوبة رايل مقاس 16 من الانف
- علاج السبب

Acute peritonitis: التهاب بالغشاء البريتوني

اعراضه:

انتفاخ وتيبس بالبطن مع وجع شديد وسخونية وزيادة في ضربات القلب وهبوط في الدورة الدموية تصاحبه عدوى واعياء شديد

العلاج:

- مضادات حيوية واسعة المجال (triple therapy)
- لا شيء بالفم ويتم اعطاء محاليل للمريض
- تركيب انبوبة رايل مقاس 16 من الانف
- علاج السبب

Acute pancreatitis: التهاب البنكرياس

اعراضه:

الم شديد في فم المعدة ويبس في الظهر ويقل عندما يميل المريض للامام
نفس العلاج السابق + مسكن قوى مثل البيثيديين او المورفين + جراحة

Appendicitis colic : مغص الزائدة

اعراضه:

وجع في الجنب اليمين بدا حوالين السرة معاه سخونية او ترجيع لما نضغط بايدنا على مكان الوجع الوجع يزيد ولما نشيل ايدينا يزيد اكثر ويزيد الوجع لو رفعنا رجل العيان ناحية باطنة

يتم العلاج جراحيا باستئصال الزائدة

Acute intestinal obstruction: الانسداد المعوي

اعراضه:

المريض ليس لديه غازات او براز لفترة ومعه تقيع ومعه انتفاخ شديد في البطن يمكن ان يكون بعد عملية جراحية او بسبب انسداد الامعاء مع الفحص نجد بطن المريض منتفخة وملينة بالهواء وعند عمل اشعة عادية للمريض تظهر الغازات في الاشعة العادية

العلاج:

- لا شيء بالفم ويتم اعطاء محاليل للمريض
- تركيب انبوبة رايل مقاس 16 من الانف
- علاج السبب

Acute peritonitis: التهاب البريتوني

اعراضه:

انتفاخ وتيبس بالبطن مع وجع شديد وسخونية وزيادة في ضربات القلب وهبوط في الدورة الدموية تصاحبه عدوى واعياء شديد

العلاج:

- مضادات حيوية واسعة المجال (triple therapy)
- لا شيء بالفم ويتم اعطاء محاليل للمريض
- تركيب انبوبة رايل مقاس 16 من الانف
- علاج السبب

Acute pancreatitis: التهاب البنكرياس

اعراضه:



الم شديد في فم المعدة ويسمع جامد في الظهر ويقل عندما يميل المريض للامام
نفس العلاج السابق + مسكن قوى مثل البيثيدين او المورفين + جراحة

Appendicitis colic : مغص الزائدة

اعراضه:

وجع في الجنب اليمين بدا حوالي الساعة معاه سخونية او تقيع لما نضغط بايدنا على مكان الوجع يزيد ولما نشيل ايدينا يزيد اكثر ويزيد الوجع لو رفعنا رجل العيان ناحية باطنة

يتم العلاج جراحيا باستئصال الزائدة



Urology prescriptions

روشتات المسالك البولية والتناسلية

Impotence in male: روضة علاج عدم الانتصاب عند الذكور

R/ Viagra, erec tab 1/4 hour before intercourse.

قرص او نصف قرص قبل الجماع بربع ساعة



Premature ejaculation: روضة علاج القذف السريع عند الذكور

R/ Anfranil (chloropramine) 25 mg 3h. Before intercourse tab

قرص قبل الجماع بساعة يقلل سرعة القذف

R/ joybox, paroxitene 1x1

قرص يوميا يقلل سرعة القذف

R/ Lignocaine spray 2 puff on glans penis before intercourse

رش موضعي على رأس القضيب قبل الجماع بربع ساعة

Urinary incompetence, frequency, nocturnal enuresis:

روضة عدم التحكم في البول والسلس البولي والتبول الا ارادى الليلي

- Tri-cyclic antidepressants (impramine)

R/ toframine, tofranil, anapramine at bed

قرص قبل النوم (not more than 3 monthes)

(تعمل على احتباس البول كعرض جانبي)

- anticholinergic: Oxybutinin

R/ uripan, ditropan, detronin tab 1x2

قرص مرتين يوميا

تقلل من انقباضات المثانة فيقل التبول



Prostatic congestion: روضة احتقان البروستاتا

R/ Decongestyl supp after defecation 1X2

R/ Pepon caps 1x3

R/ Prostetrol tab 1x1


روشتة تضخم البروستاتا: Benign prostatic hyperplasia:

1) We use alpha blockers to decrease prostatic size

- tamsulosin, prazosin, silodosin

R/ omnic ocas or tamsulin ,
قرص قبل النوم

يقلل من القباضات عضلة البول و يقلل حجم البروستاتا



2) finasteride

R/ proscar OR prostec OR prostat 5 mg tab قرص قبل النوم

يقلل حجم البروستاتا

روشتة عدوى الجهاز البولي: Urinary tract infection:

- Antibiotics(quinolones)

R/ ciprofloxacin or ciprofar 1x2

مضاد حيوى يقتل البكتريا

- Analgesics

R/ diclofenac, ketrolac,
ketoprofen) 1x2

مسكن ومضاد للالتهابات وخافض للحرارة

R/ coli-urinal eff 1x3

مطهر لمجرى البول



In female we add :

vaginal wash like betadin wash,

Vaginal preparations like R/ genodaktarin vag tab 1x2

وذلك لعلاج الالتهابات المهبلية وقتل البكتريا والفطريات المسببة لها

نزيف البول: Haematuria:

يقوم المريض بعمل اشعة تلفزيونية على مثانة ممتلئة وتحليل بول ويحول
لدكتور مسالك مع تعويض الجسم بالدم والمحاليل المناسبة اذا كان النزيف شديد

NB: The most common cause of haematuria in old male in
Egypt is bladder tumors . others are stones, trauma , cystitis

Urinary tract stones: روستة حصوات الجهاز البوليIf stone is less than 1 cm and found in kidney : حصوات الكلى

- Drink a lot of fluids,

↓ Ca, salts in food

R/ cystone or cystinol tab 1x3

يدوب الحصوة

R/ Voltaren amp IM or tab 1x2

يقلل الألم والالتهاب والحرارة

R/ Rowatinex or urinex cap 1x3

يدوب الحصوة

R/ urosolvin eff or urivin eff 1x3

يدوب الحصوة

R/ Buscopan amp or tab. 1x2

مضاد للتقلصات ويقلل الألم

If stone is less than 1 cm in ureter we use: حصوات الحالب

R/ tamsulin, or block alpha 1x1 at bed (one time per day)

يرخي عضلات الحالب فيساعد على طرد الحصوة وقلّة التقلصات وتقليل الألم

R/ Alphintern 1x3 (three time per day)

يقلل التورم والالتهابات حول الحصوة ويساعد على طردها

R/ Cataflam tab 1x2 (two times per day)

يقلل الألم والالتهاب والحرارة

R/ Buscopan tab 1x2 (two times per day)

مضاد للتقلصات ويقلل الألم

If stone from 1-2 cm we use:

ESWL OR endoscopy منظار تفتيت

If stone is more than 2 cm we use:

Open surgery عملية جراحية which is called pyelolithotomy

Ca oxalate stones: روستة لحصوات الكالسيوم

Avoid mango, tomato,...

+ epimag OR xenomag eff sach. 1x3



Gynaecology & obstetrics prescriptions

روشتات النساء والتوليد

Drugs used safe with pregnancy:

الأدوية المستخدمة الآمنة مع الحوامل

Drugs use with pregnancy

تقسيم استخدام الأدوية مع الحوامل

Category A استخدامات الدواء مع الإنسان والحيوان أثبتت سلامته

E.g. (paracetamol)

Category B استخدامات الدواء مع الحيوان أثبتت سلامته ولكن ليس مع الإنسان

E.g. (Amoxicillin with clavulanic acid)

Category C أثبتت أضرار مع الحيوان وليس الإنسان ويستخدم في الضرورة

E.g. (diclofenac)

Category D أثبتت أضرار مع الحيوان والإنسان و الاستخدام مع الضرورة الشديدة

E.g. (phenytoin)

Category X أثبتت أضرار شديدة جدا مع الحيوان والإنسان ولا يمكن استخدامه

E.g. (Thalidomide)

Category N الدواء لم يقسم حتى الآن

E.g. (new drugs)

Drugs used with pregnancy: الأدوية المستخدمة مع الحوامل

pain → paracetamol

antibiotics → penicillins, 3rd group cephalosporins

hypertension → α methyl dopa

constipation → laxin tab(1x1), picolax drop, glycerin supp

vomiting → cortigen B6, navidoxine, navoproxine amp.

metocloperamide at (2nd, 3rd trimester)

acidity → mucogel susp, (1x3), fawar fruit (1x3)

flatulence → disflatyl chew tab 2x3, eucarbon 1x3

diarrhea → kapect susp, semecta, pectocal sach., susp 1x3

colic → buscopan 1x2

cough → guava syrup 1x2, broncho-prosyrup 1x3

diabetes mellitus → insulin + glucose 5%

Flu → seckem flu sachets + cevamol

Safe drugs with pregnancy:Pain → روشتة الالم اثناء الحمل

paracetamol 1x3

R/ panadol or paramol tab 1x3

قرص 3 مرات في اليوم

يمكن استخدام ديكلوفناك او كيترولاك امبول مرة واحدة فقط في حالات الطوارئ مع الالم الشديد

R/ voltaren or adolor amp once and donot repeat it

امبول عضل مرة واحدة

Antibiotics → روشتة للعدوى اثناء الحملpenicillins, 3rd group cephalosporins 1X2

R/ hibiatic or augmentin 625 mg or flummox 500 mg tab


قرص 3 مرات في اليوم

R/ ceftriaxone or cefotax or cefazone amp 1 gm

امبول كل 12 ساعة وريد او عضل حسب الجرعة

Hypertension → روشتة لارتفاع الضغط اثناء الحمل α methyl dopa (aldomet) 1X1

R/ aldomet tab 1x1 قرص مرة واحدة في اليوم

constipation → روشتة للامساك اثناء الحمل

R/ laxin tab (1x1) قرص مرة واحدة في اليوم

R/ picolax drop 10 نقط عند اللزوم

R/ glycerin supp عند اللزوم

Vomiting → روشتة للترجيع اثناء الحمل

R/ cortigen B6, navidoxine , navoproxine amp

R/ Metocloperamide (primpran) at (2nd, 3rd trimester) amp

R/ ondasteron (zofran) amp

امبول عند اللزوم

روشتة للحموضة أثناء الحمل → Acidity

R/ mucogel susp. (1x3)

شراب 3 مرات في اليوم

R/ fawar fruit (1x3)

فوار 3 مرات في اليوم

روشتة للانتفاخات أثناء الحمل → Flatulence

R/ disflatyl chew tab 2x3

قرصين 3 مرات في اليوم

R/ eucarbon tab 1x3

قرص مرة واحدة في اليوم

روشتة للإسهال أثناء الحمل → Diarrhea

R/ kapect susp 1X2

شراب 3 مرات في اليوم

R/ Semecta sachet 1X2

فوار مرتين في اليوم

R/ pectocal sach , susp 1x3

شراب مرتين في اليوم

روشتة للمغص أثناء الحمل → Colic

R/ buscopan or visceralgine tab or amp 1X2

قرص مرتين في اليوم

R/ petro 1x2 tab

قرص مرتين في اليوم

روشتة للكحة أثناء الحمل → Cough

R/ guava syrup 1x2

شراب مرتين في اليوم

R/ broncho-pro syrup 1x3

شراب 3 مرات في اليوم



Diabetes mellitus → **روشتة لمرض السكر أثناء الحمل**

R/ insulin + glucose 5%

حسب نسبة السكر

Flu → **روشتة للأنفلونزا أثناء الحمل**

R/ seckem flu sachets 1x3

فوار 3 مرات في اليوم

R/ cevamol eff. 1X3

فوار 3 مرات في اليوم

**Allergy** → **روشتة للحساسية أثناء الحمل**1st, 2nd generations are safe

R/ avil or allergex or cetirizine tab 1x1

قرص مرة في اليوم

**After labor : روشتة الادوية المستخدمة بعد الولادة :****For mother:**

Antibiotic (hibiotic)+ analgesic (cataflam)

+ vaginal wash (melva, rosa clean)

+ mesotec (prostaglandins) → contraction of uterus, ↓ bleeding

For baby:

Alcohol for umbilicus 1x4

+ tobrin drops for eye 1x3

+ Baby drink if decreased milk

روشتة حبوب منع الحمل: Contraceptive pills:Progesterone + estrogen:

R/ Cycloprogynova, activelle, cliest, gynera, marvelon, microcept, triocept, yasmin, minulet tab

1x1 from 5th to 21th d

سعرها رخيص ولكن مشاكلها اكبر نظرا لوجود الاستروجين

Progesterone only:

Should be in time every day

R/ Microlut, micronor, exluton, postnor tab

1x1 .less side effects

سعرها غالى ولكن مشاكلها اقل لانها لا تحتوى على الاستروجين

حقن منع الحمل: Contraceptive injections:

R/ Depo-provera vial (1 / 3 monthes) كل 3 شهور

R/ Noricept (1/ 2 monthes) كل شهرين

R/ Mesigyn, mesocept, noricept amp (1 / month) كل شهر

روشتة لالام الدورة: Dysmenorrhea:

Analgesic + antispasmodic

R/ cataflam or voltaren 50 tab قرص مرتين فى اليوم بعد الاكل

R/ Petro or visceralgine or buscopan قرص مرتين فى اليوم

الاستلقاء على الظهر ووضع فوطة دافئة على البطن يقلل الالم

الجفاف المهبلى: Senile vaginitis , vaginal dryness:

local estrogen preparation + lubricant gel + antiseptic douch

R/ premarin vag. Cream

دهان مرة واحدة يوميا لمدة 21 يوم

R/ K-Y gel

جل قبل الجماع مباشرة لتقليل الجفاف

R/ tantum rosa sackets

تشطيف مهبلى مرة واحدة يوميا

Drugs containing gonadal hormones and its antagonist

روشتات ادوية تحتوي على الهرمونات الجنسية ومضاداتها

Antiestrogen:

يستخدم في علاج سرطان الثدي والعقم

R/ Clomiphene, tamoxifen, nolvadex tab

قرص مرتين في اليوم



Anti androgen:

يستخدم في علاج سرطان البروستاتا وزيادة الشعر عند الاناث وحبوب الشباب

Used for prostatic carcinoma, hirsutism, acne in female

R/ Androcur, Diane, Climene, Anandron tab 1x3

قرص 3 مرات في اليوم

Progesterone containing drugs:

يستخدم في منع الحمل ووجع الدورة والخوف من الاجهاض

Used in contraception, dysmenorrheal, threatened abortion

R/ Steronate, Cidolut nor, Gestanon, Provera, Urogestan tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

Estrogen containing drugs:

يستخدم في منع الحمل وفي سن الياس ومشاكل الدورة و سرطان البروستاتا

Used in contraception, postmenopausal syndrome, dysfunctional uterine bleeding, cancer prostate, hypogonadism

R/ ethinyl oestradiol, ovestin, premarin, livial tab 1x1

قرص مرة في اليوم

Progesterone+oestradiol:

يستخدم في وجع الدورة و في سن اليأس ومنع الاجهاض وسرطان البروستاتا
وهشاشة العظام

used in dysmenorrheal, postmenopause, osteoporosis, habitual
abortion, cancer prostate

R/ cycloprogynova, trisequens, activelle tab 1x1

R/ lutofolone, gynodian depot amp 1x1

قرص مرة يوميا

Testosterone containing drugs:

يستخدم في ضعف الغدد التناسلية وسرطان الثدي وهشاشة العظام

used in hypogonadism, breast cancer, senile osteoporosis

R/ Andriol, andromen, cidoviron, provimest tab 1x1

قرص مرة يوميا

R/ cidoteston, testone-E, sustanon 1/2 week

Antiestrogen, pituitary hormones:

يستخدم في علاج قصور وظيفة الخصية و عدم نزول الخصيتين في الذكر

يستخدم في علاج انقطاع الدورة و قلة التبويض وقلة الخصوبة وتكيس المبايض

used in 2nd testicular failure, undescended testis ,

1ry, 2ry amenorrhea, induction of ovulation, ttt of infertility,
polycystic ovary syndrome

R/ Pregnyl , profassi, choriomon, epifasi, menogon amp 1x1

Danazol: androgen like

يستخدم في علاج البطانة المهاجرة في الانثى وتضخم الثدي في الذكور

-Used in ttt of endometriosis, mamary dysplasia,

Gynaceomastia, inhibit pituitary, sex hormones action

R/ Danol, danazol cap 1x3


Bromocriptine:

dopamine agonist

يستخدم في علاج زيادة افراز اللبن و انقطاع
الدورة وعلاج مرض الشلل الرعاش

Used in galactorrhea, amenorrhea,
↓lactation, parkinsonism

R/ Parlodel, lactodel, dopagon,
dopergin tab 1x2

**روشتة الادوية المستخدمة لزيادة او تقليل اللبن****Activator: (lactagogue) مدرات اللبن**

R/ Herbana , lactomax, lactoflow , lacto G cap 1x2

Suppressors: مثبطات افراز اللبن

-dopamine agonist (bromocriptine)

R/ Parlodel, lactodel, dopagon, dopergin tab 1x2

For caring of breast during lactation:

R/ Hipanthen cream 1x2 for crackling of lactation

روشتة غسول مهبل للنظافة وازالة الروائح الكريهة

R/ Melva, leaders care, del rose, femicure, kelenva, rosaclean,
clenza, lady care 1x2 غسول مهبل مرتين في اليوم

روشتة التهابات المهبل

Antibiotics + antifungal + analgesic +
treatment of cause + vaginal wash

R/ levoxin tab 500 قرص مرة في اليوم

R/ gynodaktarin vaginal tab قرص مهبل مرة يوميا

R/ cataflam tab 50 قرص مرتين يوميا بعد الاكل

R/ betadine vaginal wash غسول مهبل مرتين في اليوم

روشتة لتأجيل الدورة

R/ Steronate tab 1x 2 5 days before menses

R/ cidolut nor 1x2 5 days before mense

Vaginal preparations: روشة المستحضرات المهبلية

R/ Gynozol, gynodaktarin, miconaz,
gynoconazole, gynomykotral (miconazole)

1x1x3 for fungi vaginal tab

اقراص مهبلية لقتل الفطريات

R/Gynotrosyd, gytro (triconazole) cream, tab 1x1x3 for fungi

اقراص مهبلية لقتل الفطريات

R/ Betadine douch, ovules 1x2 for infection

غسول مهبلي للتطهير وقتل البكتيريا

R/ Candestan, canestan (clotrimazole) for candida 1X2

اقراص مهبلية لقتل الفطريات

R/ Fangicure, metron, amrizole (metronidazole) (1x1x10) tab
or supp for anaerobes, protozoal infections as trichomonas

اقراص مهبلية لقتل الكائنات وحيدة الخلية مثل التريكموناس

R/ Dalacin, vagiclind (clindamycin) antibiotic for infection

اقراص مهبلية لقتل البكتيريا

Sexual stimulant for woman: روشة لزيادة الرغبة والمتعة الجنسية

نواء لزيادة الرغبة والمتعة الجنسية عند السيدات خاصة كبار السن وبعد الولادة
ومرضى السكر

R/ Tricogyn gel (20 LE)

جيل داخل المهبل قبل الجماع بنصف ساعة

Early labor: روشة لتأخير الولادة المبكرة

R/ Yutpar, ritropar 1x2

قرص مرتين في اليوم

R/ Nifedipene (epilat) 1X2

قرص مرتين في اليوم

Bleeding before labor : روشة لتنظيف قبل الولادة

rest, replacement, avoid abortion

Bleeding after labor: روشتة لتنزيف بعد الولادة

R/syntocinen, methergine amp امبول عند اللزوم

Delayed labour: روشتة لتحفيز الولادة الطبيعية

R/ Syntocinon (5-10) amp

R/ Ezaprost, prostin (pgs) amp

R/ Methergin amp

they are contraindicated if there is obstructed labour

Menopause: روشتة الادوية المستخدمة للمرأة في سن اليأس

R/ klidamydon tab 1x1 from 1st day to 25th day

R/ cidolut nor tab 1x2 for 1 week

R/ antidepressant (prozoc, ciprolex) cap 1x1 → ↓ hot flushes

R/ catapress, clonidine 1x1 /week 1 hour before breakfast


R/ premarin vaginal cream

Pregnancy tests: اختبارات الحمل

Baby check, fast check, eva check (method: see after)

Pregnancy test steps**اختبار الحمل**

نأخذ عينة من البول ونضع بها شريط كشف الحمل لمدة 5 دقائق
 إذا ظهر خط احمر واحد كما بالرسم فالاختبار صحيح ولا يوجد حمل
 إذا ظهر خطين احمر كما بالرسم فالاختبار صحيح ويوجد حمل ويتم التأكد من
 ذلك بعمل اختبار لنسبة هرمون الحمل بالدم
 إذا لم يظهر خطوط حمراء فالاختبار خاطيء ويجب اعادته بشريط اخر



Prescriptions:

Infection of a pregnant: روشتة عدوى الحوامل

- hibiatic 625 1x3 or ceftriaxone amp (1gm) 1x1
- paracetamol tab 1x3
- cortigen B6 or navidoxine or zofran amp for vomiting
- smecta 1x3 for diarrhea

Hirsutism: روشتة زيادة الشعر عند الاناث

- aldactone tab 1x1 in morning
- urbasone tab 1x1
- cidophage tab 1x1 after launch

Infertility , delayed pregnancy: روشتة تاخر الانجاب

- Clomiphene, tamoxifen tab 1x1

Vaginitis: روشتة التهابات المهبل

- Ciprofloxacin or epinor cap 1x2
- Gynotrosyd or gytro cream, tab 1x1x3 for fungi
- Flagyl tab 1 x 3
- Cataflam tab 1x3

Renal stone: روشتة حصوات الكلى

- cystone tab 1 x 3
- drink a lot of fluid, ↓ Ca , salts in food
- buscopan tab 1x3
- Rowatinex or urinex 1x3
- Urinicol or coli urinal eff 1x3
- ciprofloxacin or conaz cap 1x2 for infection

Benign prostatic hyperplasia: روشتة تضخم البروستاتا

- tamsulin tab or prostetrol tab 1x1



Pediatrics prescriptions

روشتات الاطفال

روشتة للموالود الجديد: New born:

R/ Tobrin eye drop

قطرة 4 مرات في اليوم

R/ Alcohol for umbilicus

دهان موضعي على السرة 3 مرات في اليوم

R/ Johnson baby oil

دهان على الجسم مرتين في اليوم

R/ Baby drink if needed

يعطى بالقلم للطفل عند اللزوم

لتجنب عدوى العين

للتطهير وتجنب العدوى

لحماية الجلد

للتغذية

روشتة لعلاج الصفراء بعد الولادة: Jaundice:

Phototherapy is needed

يعرض الطفل لضوء ابيض للتخلص من الصفراء بعد الولادة

روشتة للمغص والانتفاخات في الاطفال: Colic, distension:

R/ Spasmatol, baby rest, gripe water drops, simethicone drops

10 نقط مرتين في اليوم

For children :

R/ Visceralgine syrup

شراب 3 مرات في اليوم

**روشتة للترجيع في الاطفال: Vomiting:**

R/ Cortigen B6 ped. Amp or zofran amp (1 ml only)

امبول عند اللزوم

R/ motinorm syrup or supp

شراب او لبوسة 3 مرات في اليوم

روشتة للإسهال في الاطفال: Diarrhea:

R/ Kapect syrup, semecta

شراب 3 مرات في اليوم

R/ rehydran for replacement sachets

يحل محلول الجفاف على كوب ماء ويعطى للطفل بالمعلقة


Constipation: روشة للامساك في الاطفال

R/ Glycerin infant supp

لبوس عند اللزوم

R/ normalax drops

10 نقط مرتين في اليوم

**Pain, fever: روشة للآلام والسخونية في الاطفال**

R/ Cetal, tempra drops, dolfen supp 12.5 or 25 mg

مرتين في اليوم

Anti histaminic: روشة للحساسية في الاطفال

R/ Avil syrup or amp

امبول عند اللزوم

Rash: روشة لحساسية الجلد في الاطفال

R/ Calamine lotions, antihistaminics solution

دهان موضعي مرتين في اليوم

Teething : روشة للتسنين في الاطفال

R/ Pedical Ca syrup

كالسيوم لتقوية الاسنان

شراب مرة في اليوم

R/ cetal syrup

مسكن خافض للحرارة مضاد للالتهاب

شراب 3 مرات في اليوم

R/ rhinomol syr 1x3

للرشح والاحتقان

شراب 3 مرات في اليوم

Runny nose: روشة للرشح في الاطفال

R/ Otrivine ped. Nasal drops, rhinomol syr. 1x3

تضييق الشعيرات الدموية فتقلل الاحتقان والرشح 3 مرات في اليوم

روشتة لعلاج الانيميا ونقص الحديد في الاطفال: Iron

R/ Fer- in sol oral drops

10 نقط مرة يوميا

روشتة الفيتامينات في الاطفال: Multivitamins

R/ Multi sanstol syr.

مرة يوميا

روشتة للعدوى والبكتريا في الاطفال: Antibiotics

R/ Penicillins (augmentin, hibiatic, megamox) 375 susp. 1x3

R/ 3rd cephalosporins (cefotax, ceftriaxone) 500 mg amp 1x1

Erythromycin (erythromycin) 200 mg susp. 1x3

روشتة للكدمات والتورمات في الاطفال: Trauma, edema

R/ maxilase syr. شراب 3 مرات في اليوم

R/ alpha chemotripsin amp امبول كل 12 ساعة حسب وزن الطفل

روشتة للكحة الجافة في الاطفال: Dry cough

R/ Codipront syr. or guava syrup

شراب 3 مرات في اليوم

روشتة للكحة مع بلغم في الاطفال: Productive cough

R/ Toplexil syrup

شراب 3 مرات في اليوم

روشتة لفتح الشهية في الاطفال: Appetizers: ↑ appetite

R/ Multi-samstol syrup

R/ Tresorix syrup 1x2

شراب مرتين في اليوم

Cortisone : روشتة الكورتيكويدات للحساسية والالتهابات وأمراض المناعة

For allergy , immune diseases, inflammation

R/ Apidone, phenadone syrup

شراب مرتين في اليوم

Conjunctivitis: روشتة للالتهاب الجفون والملتحمة في الاطفال

R/ Isoptomaxitrol, tobrin drops

قطرة 3 مرات في اليوم

Skin infections, fungus: روشتة لعدوى الجلد والفطريات في الاطفال

R/ Kenacomb, quadriderm cream

دهان 3 مرات في اليوم

Dehydration: روشتة لعلاج الجفاف في الاطفال

R/ Rehydran, lohydran solution sachets

يحل محلول الجفاف على كوب ماء ويعطى للطفل بالمعلقة

Hypotension: روشتة لعلاج قلة الضغط في الاطفال

R/ Solucortef, fortacortin amp

امبول عند اللزوم

Diabetes: في الاطفال روشتة لعلاج مرض السكر

R/ Insulin injection sc

حقنة تحت الجلد حسب الاحتياج

Patent ductus arteriosis: روشتة لعلاج ثقب القلب في الاطفال

R/ Indocid(indomethacin): anti-prostaglandins

عند اللزوم

حساب الجرعة في الاطفال

DOSES OF ANTIBIOTICS FOR PEDIATRICS

حساب وزن الطفل	وزن الطفل بالكيلوجرام = (عمر الطفل بالشهور + 9) + 2 ◀ للأطفال من 3-12 شهر
	وزن الطفل بالكيلوجرام = (عمر الطفل بالسنة × 2) + 8 ◀ للأطفال من 1-6 سنة
	وزن الطفل بالكيلوجرام = ((عمر الطفل بالسنة × 7) - 5) + 2 ◀ للأطفال من 7-12 سنة
• الجرعة اليومية (مل) = (الوزن) × (الجرعة لكل كجم) × (كلم مل يمثل التركيز المستخدم) / (التركيز المستخدم من المضاد الحيوي) • الجرعة اليومية قد تؤخذ مرة واحدة أو تقسم إلى 2-3 جرعات حسب استخدام المضاد الحيوي • على سبيل المثال ◀ طفل 10 كجم سيتناول أموكسيسيلين 125 ملجم / 5 مل والجرعة لكل جرام هي 25 ملجم • إذا الجرعة اليومية = $(10 \times 25 \times 5) / 125 = 10$ مل وتقسّم هذه الجرعة إلى ثلاث جرعات بما يعادل 3.3 مل كل 8 ساعات	
انتبهاجات ◀ (هذه الاستنتاجات خاصة بالأشربة) :	
• إذا كانت الجرعة المستخدمة هي 25 ملجم/ كجم فيمكننا أن نحسب الجرعة عن طريق الوزن مباشرة حيث تتمثل جميع التركيزات في 5 مل • الجرعة بالنسبة لتركيز 125 ملجم/ كجم = الوزن لو وزن الطفل 10 كجم إذا الجرعة اليومية المستخدمة هي 10 مل • الجرعة بالنسبة لتركيز 250 ملجم/ كجم = الوزن / 2 لو وزن الطفل 10 كجم إذا الجرعة اليومية المستخدمة هي 5 مل = 10 / 2	

€ Ibuprofen. 20-30 mg/kg in 3 or 4 divided doses > above 1 year

€ Mefenamic a. 25 mg/kg in three or four divided doses

€ Paracetamol 10-15 mg/kg/dose. >>>> up to 4g.

€ Diclofenac > 0.5-1 mg/kg/dose
> 2-2.5 mg/kg/day

5-10 سنوات

amoxicillin

Amoxicillin
clavulanic acid

Ampicillin

Cephalexin
Chloramphenicol

Cephradin

cefadroxil

Cefaclor

Cefprozil

cefuroxime

Cefpodoxim

Cefdinir

Cefixime

Erythromycin

Azithromycin

Clarithromycin

Sulphamethoxazole+

trimethoprim

ORAL DRUGS

يمكن استخدام (125 من 5-1 سنوات 3 مرات يوميا أو 250 مرتين يوميا) و (250 2-3 مرات يوميا من 5-10 سنوات)

amoxicillin	20 – 40 mg/kg/day in divided doses every 8 hours
Amoxicillin+ clavulanic acid	25 – 50 mg/kg/day of the 4 parts amoxicillin , 1 part clavulanic acid preparations (which corresponds to a daily dosage of the equivalent of 20-40 mg/kg of amoxycillin and 5-10 mg/kg of clavulanic acid) to be taken in divided doses every 8 hours at the start of a meal
Ampicillin	50 – 100 mg/kg/day in doses divided every 6 hours
Cephalexin & Chloramphenicol	25 – 50 mg/kg/day in 3 – 4 divided doses
Cephadrine	25 – 50 mg/kg/day in divided doses every 8 hours
cefadroxil	25 – 50 mg/kg/day in asingle dose or in divided doses every 12 hours
Cefaclor	20 – 40 mg/kg/day in divided doses every 8 hours
Cefprozil	20 – 40 mg/kg/day in asingle dose or in divided doses every 12 hours
cefuroxime	20 – 40 mg/kg/day in divided doses every 12 hours
Cefpodoxim	8 mg/kg/day in divided doses every 12 hours
Cefdinir	14 mg/kg/day in asingle dose
Cefixime	8 mg/kg/day in asingle dose dose or in divided doses every 12 hours
Erythromycin	30 – 50 mg/kg/day in 3 – 4 divided doses الجرعة اليومية = الوزن × (4 / 3) لتركيـز 200 ملجم / 5 مل
Azithromycin	10 mg/kg/day in asingle dose الجرعة = الوزن / 2 لتركيـز 100 والوزن / 4 لتركيـز 200
Clarithromycin	15 mg/kg/day in divided doses every 12 h الجرعة = الوزن × (10 / 6) لتركيـز 125 و (10 / 3) لتركيـز 250
Sulphamethoxazole+ trimethoprim	0.5 – 1 ml / kg /day in divided doses every 12 hours

Parenteral

Amoxicillin	50- 100 mg/kg/day in divided doses every 8 hours
Ampicillin	100 -150 mg/kg/day in doses divided every 6 hours
Sultamicillin (Unasyn)®	150 mg/kg/day 3 - 4 divided doses
Co-Amoxiclav (Augmentin)®	3 months-12 years: → Usually 30mg/kg every 8 h. (In more serious infections, increase frequency to every 6 h) 0-3 months: in premature (less than 4kg) → 30mg/kg every 12 hrs
Cephadrine	50 - 100 mg/kg/day in 4 equally divided doses.
Cefotaxime	Children and infants 50-100 mg/kg/day in 3-4 divided doses. A maximum dose of 200 mg/kg/day in 3-4 divided doses may be given in exceptional cases. 0 - 1 week of age ▶ 50 mg/kg IV every 12 h 1 - 4 weeks of age ▶ 50 mg/kg IV every 8 h
Cefoperazone	25 -100 mg/kg every 12 hours
Ceftriaxone	Infants and young children may receive from 20-80 mg per kg body-mass daily; depending on the severity of the infection, usually 12-24 hourly. In cases of premature babies, the daily dosage should not exceed 50 mg per kg body mass on account of the immaturity of the infant's enzyme systems.
Ceftazidime	50 - 100 mg/kg/day in 2 divided doses.
Cefipime	Patients 2 months of age with body weight ≤40 kg: 50 mg/kg q12h for 10 days. For more severe infections, a dosage schedule of q8h can be used. Experience with the use of MAXIPIME in paediatric patients <2 months of age is limited. While this experience has been attained using the 50 mg/kg dose, modelling of pharmacokinetic data obtained in patients >2 months of age suggests that a dosage of 30 mg/kg q12h or q8h may be considered for patients aged 1 month up to 2 months.
Gentamicin	3- 5 mg/kg/day in divided doses every 8 hours
Amikacin	15 mg/kg/day divided into 2 or 3 equal doses. Treatment should preferably not continue for longer than 7 to 10 days, and the total dosage in adults should not exceed 15g.

Some available milk in Egypt:الالبان المتوافرة للاطفال

تعتبر البان الاطفال المجففة من اهم ما يحتاجه الطفل بعد ميلاده مباشرة وتنقسم البان الاطفال لقسمين هما الانواع العادية و الانواع الخاصة
الالبان العادية : وتنقسم لـ 3 مراحل رقم (1) للطفل من عمر يوم حتى تمام 6 اشهر ويراعى فيها ان تكون اقل فى نسبة الدهون و البروتينات حيث تتعامل معها معدة الرضيع بسهولة ...ثم المرحلة التى تليها من البان رقم (2) لفئة الاطفال العمرية من سبعة اشهر وحتى تمام عام كامل و اخيرا البان رقم (3) لمن عام واحد وحتى 3 اعوام ...وهنا فى غالب الامر لكن هناك شركات تنتج البان تحتوى على كم اكبر من الدسم ملائم للأعمار من سن 3 سنوات فما اكبر مثل شركة أبوت و حليب سيميلاك كيدز..

Milk with special Formula

فى بعض الاحيان يكون لدى بعض الاطفال مشاكل من استخدام الحليب العادى وهنا تقتضى الضرورة انتاج انواع حليب تلائم احتياجاتهم...

من هذه الانواع :

(أ) حليب لعلاج حالات الإمساك والمغص (Anti colic (AC) formula

هذه المشكلة شائعة جدا و فيها يعاني الطفل من امساك وانتفاخات كثيرة

وصممت هذه البان بتقنية ما تقلل من كمية الهواء التى يتناولها الطفل مع الحليب كذلك تحتوى على مقدار اقل من عنصر الحديد مما يقلل من حالات صعوبات الاخراج عن الرضيع

(ب) حليب خالى من اللاكتوز (Free Lactose (FL) Formula

فى حالات نادرة يكون لدى الطفل مشكلة فى هضم اللبن بسبب غياب الانزيم المسئول عن عملية ابيض سكر اللبن (اللاكتوز) وهو انزيم لاكتيز lactase enzyme وهذه المشكلة تسبب حالات اسهال تحدث عن تناول الرضيع للحليب العادى بالتالى تقوم الشركات بتحضير تركيبات منزوعة اللاكتوز لتلافى تلك المشكلة و يستمر الطفل على ذلك الحليب حتى تختفى تلك المشكلة من تلقاء نفسها كما يحدث فى بعض الحالات وفى حالات اخرى لا تختفى ويظل الطفل يعاني من الاسهال عند تناول اى منتجات البان بشكل عام.

(ج) حليب لحالات الارتجاع (Anti-regurgitation Or anti-Reflux (AR) formula

حالات الارتجاع تحدث بشكل عادى عند الاطفال الرضع حينما تكتفى معدته من تناول اللبن ولكن لدى بعض الاطفال حالة ارتجاع بشكل متكرر ودائم وهناك تقوم فكرة انتاج البان على زيادة قوام الحليب بتدعيمه بنشا الارز او نشا القمح ليظل مستقرا فى المعدة ولا يرتجع بسهولة من المعدة مرورا بالمرئ ومنه الى خارج الفم.



Hypo-Allergenic (HA) formula

أولاً: جالبس: حالات التحسس التي تزيد من مشكلة التحسس عند بعض الرضع
الألبان من المواد الغشائية التي مصدر بديل عن الحليب العادي ويكون البديل
والثاني تقتضي الضرورة البحث عن مصدر بديل عن الحليب العادي ويكون البديل
في الأغلب هو لبن الصويا Soyea bean milk وأحياناً يطلق على اسم الحليب مثل
bebelac soyea بدلاً من الاختصار HA وهذا الأمر سببه غياب عوامل التحسس
الناجمة عن المصادر الحيوانية للحليب مثل الأبقار والماعز.

Premature or Preterm Formula

أولاً: جالبس: حالات الأطفال ناقصي الوزن والمبتسرين
هو حليب مصمم خصيصاً للأطفال ناقصي الوزن والمولودين قبل ميعادهم
الطبيعي ومن لديهم مشاكل في القلب يحتوي على عناصر هامة وضرورية
لتعويض نقص وزن الطفل.

أشهر أنواع الألبان المعروفة:

526 Gold من شركة وايت الأيرلندية
similac Milk من شركة أبوت الانجليزية
biomil milk من شركة فاسكا هولندية / فرنسية
bebelac milk شركة نوتريشيا الهولندية
NAN وGuigos وكلاهما من شركة نيسفلة السويسرية
Leptomilk من شركة ليبتيكس الأمريكية
Novalac milk شركة نوفالاك الفرنسية
Fabimilk شركة بيوفورد نيوتريشن الفرنسية
Ronanlac milk من المجموعة المركزيو السعودية
Hero Milk من شركة نوتر ديفينس السويسرية
Blemil Plus milk من شركة أورديسا الفرنسية

قبل الرضع في الصيدلية

dr/Ahmed Atef

عندنا مصنوعة ألبان في الصيدلية أشهرها الألبان التي اسمها بيبلاك bebelac شركة البيلاك بتطور منتجاتها فول فول
وبقي الشركات يتطلع مثلك لها وبقاقي نو عرفنا الفرق بين أنواع البيلاك هتروح نأقني كل أنواع الألبان الأخرى بتكلم واحد
من أنواع البيلاك ، طيب تشوف كده إيه الفرق بين ألبان البيلاك!!

Bebelac 1

مناسب للطفل المولود الذي لا يتناول رضاعة طبيعية أو قد لا تكفيه كمية لبن الأم فيضاف إليها
مناسب للرضع من 0 إلى 6 شهور

Bebelac 2

مناسب للرضع من 6 أشهر إلى 12 شهر (منة)

Bebelac 3

مناسب للرضع من سن 12 شهر (ولكنه ليس ضروري)

Bebelac premature

لأطفال ناقصي الوزن عند الولادة والمبتسرين

Bebelac E.C

يستخدم للرضع الذين يعانون بصورة مستمرة من حالات غثاس مع انتفاخات وغازات زائدة (حيث أن نسبة اللاكتوز منخفضة)
أيضا يمكن استخدامه للرضع أصحاب الوزن الطبيعي عند الولادة ولكن معدل زيادة وزنه أقل من الطبيعي

Bebelac A.R

الرضع الذين يعانون من قيء كميات كبيرة من اللبن الصناعي بعد الرضاعة بصورة غير مرتبطة بمرض عضوي حيث أنه ذو
أروجة كل فهو أخف على المعدة

Bebelac E.L

الرضع الذين لا يمكنهم هضم سكر اللبن (اللاكتوز) فيسبب لهم في حالات إسهال وانتفاخات
أيضا يمكن استخدامه في الرضع الطبيعيين حينما يكونوا مصابين بحالة إسهال شديدة
(حيث أن الألبان الأخرى ومنها لبن الأم تحتوي على سكر اللاكتوز الذي يعمل كإسهال)

ملحوظة أخيرة : في حالة عدم توفر bebelac premature أو مثله من الألبان الأخرى يمكن الاستعانة ب bebelac E.C

د/ احمد عبد الله

Some available milk in Egypt:اللبان المتوافرة للأطفالFor babies younger than 6 months:

Biomil 1, aptamil 1, france lait 1, babelac 1, s 26 1, Nan1, biomil

For babies older than 6 months:

Biomil 2, aptamil 2, france lait 2, babelac 2

For babies older than one year:

Bebelac 3, nido 1 year, the 3 series, progress gold

There is also a milk free of lactose for those with lactose intolerance

Babelac FL, S 26 LF

For premature babies:

Aptamil start, bebelac premature, S 26 LBW

To determine doses in baby: لحساب الجرعات

أو ٧ : قاعدة كلارك : Clark's rule

جرعة المطلق = وزن المطلق بالأرطال مضروباً في جرعة الشخص البالغ مقسوماً على 150

$$\text{Dose} = \text{weight(lb)} * \text{adult dose} / 150$$

@@@@@

ثانياً : قاعدة يونغ : Young' rule

جرعة المطلق = عمر المطلق بالسنوات مضروباً في جرعة الشخص البالغ مقسوماً على (عمر المطلق بالسنوات + 12)

$$(\text{Child dose} = \text{age(years)} * \text{adult dose} / (\text{age} + 12)$$

@@@@@

ثالثاً : قاعدة فريد : Fried's rule

جرعة المطلق = عمر المطلق بالشهور مضروباً في جرعة الشخص البالغ مقسوماً على 150

$$\text{Child dose} = \text{age(months)} * \text{adult dose} / 150$$

وزن المطلق حسب السن: Weight of baby for age:

At birth: 3 kg

1 month : 3.75 kg

2 month : 4.5 kg

3 month: 5.25 kg

6 month: 7 kg

9 month: 8.25 kg

1 year: 9 kg

2 years: 12 kg

3 years: 14 kg

6 years: 20 kg

9 years: 27.5 kg

10 years : 30 kg

التسنين : teething

التسنين teething



- **الحقيقة**
الأم تقول لك ان الولد فيها تسنه مغشوش سفلي و مشعوف كده
- **دور السنين**
تسال عن عمر الطفل وبالمعادلة الاخره
عدد الاسنان = العمر بالشهور - 7
وتعلم ان المعادله ان الاسنان تختلف من طفل لآخر و ممكن تظهر من 6 شهور ل 1 سنة

معلومات عامة

علامات التسنين:

- 1- الريشه
 - 2- عصب اي شيء اصابه حتى اصابعه
 - 3- عدم الاكل بانتظام
 - 4- عدم النوم بانتظام
- لا بد ان تعلم ان الاسنان تبدأ في تكوينها منذ الشهر الرابع داخل الرحم . لذلك على الام الحامل الاهتمام بالتكلسيوم سواء عن طريق الاكل او الاقراص حتى الشهر التاسع

To ready teething

Calcium Vitamin D Vitamin B12

Dose

- من 6 شهور — 2 سنة :
2.5 مل * 24 ساعة
من 2 سنة — 6 سنوات :
5 مل * 24 ساعة

الاستعمال

مكسكول شراب
فيتاكل شراب

كلسي كل شراب
كلسيد ب 12 شراب
ديكال ب 12 شراب
بيديكل شراب

Calcium

Dose

- من 6 شهور — 3 سنة :
5 مل * 24 ساعة
اكثر من 3 سنوات :
5 مل * 8 ساعات

Calcium multivitamin

Dose

- من 1 سنة — 5 سنوات :
5 مل * 12 ساعة
من 5 سنوات — 12 سنة :
5 مل * 8 ساعات

الاستعمال

الفيتل
مكسلي فيتول
مكسلي سامينتول
جراند فيت بالعسل

اعطى هذه الانويه في حلقه للمضغ العام و سوء التغذية و فقدان الشهيه

الجرعة

- قل من 1 سنة :
4 نقط كل 24 ساعة

لا تخلط بين التسنين و الامراض الاخرى مثل الاسهال و ارتفاع درجة الحرارة و
لما ما يحدث ان الطفل أثناء ظهور الاسنان فان هذا يدفعه للمضغ بشيء وقد يكون هذا الشيء ملوث بميكروب مما يؤدي الى
ارتفاع درجة الحرارة او الاسهال

ديفانول اس حقن : تسلي كل اسبوعين
كل 12 حقن : حلقه كل 3 ايام (اسرع و اقوى فاعليه)



Ear , nose , throat prescriptions

روشتات الانف والاذن والحنجرة

Ear parts: تركيب الأذن



Causes of ear problems:

Ear problems

Pain accompany common cold symptoms	otitis media
Gradual decrease in hearing Feeling of ear fullness	Wax impaction
pruritus, white scaling, and swelling	otomycosis Antifungal solution
Pain on moving auricle, pain increase on chewing	otitis externa
Give local ear analgesic	

روشتة عدوى الأذن

سخونية مع وجع بالأذن وضعف بالسمع وصديد وطنين من الأذن

لعلاج عدوى الأذن:

Antibiotics+ analgesics+ antihistaminic (claritine 1x1)
+decongestant (otrivin nasal spray 1x3) +cortisone nasal spray

-Antibiotics:

R/ Ciprocort, viotic, otophenicol, otoxin, cipro 1x3

قطرة للأذن 3 مرات في اليوم

-Otomycosis:

R/ Dermatin, or canesten solution 1x3

قطرة للأذن 3 مرات في اليوم

**روشتة الحساسية والاحتقان للأنف والأذن**

عطس واحتقان مستمر ورشح مستمر واحمرار وهرش بمنطقة الأنف والأذن

R/ Afrin, oxymet, otrivin, rhinex, balkis, prisoline 1x3

قطرة للأذن 3 مرات في اليوم

R/ Beclo nasal spray بختين بالأنف مرتين يوميا

روشتة لعلاج شمع الأذن

R/ Earwax, soluwx, perroxy, remowax 1x3

قطرة للأذن 3 مرات في اليوم

or ear wash غسل الأذن مع دكتور انف واذن

روشتة وجع الأذن

R/ Audax, otosept, otal, otocalm 1x3

قطرة للأذن 3 مرات في اليوم

روشتة التهاب اللوزتين

المريض سخن مع التهابات شديدة باللوزتين و ألم في الزور وصعوبة في البلع وكحة

antibiotic + analgesic anti-inflammatory + rest, hot fluids

R/ Hibiotic 375 susp,

or 625 cap oral 1x3

قرص او ملعقة 3 مرات في اليوم

R/ Ibuprofen syrup or tablets 1x3

قرص او ملعقة 3 مرات في اليوم



روشتة لعلاج الدوار
Motion sickness, vertigo:

R/ Betahistine: betaserc, histine, histotec tab. 1x3

قرص مرتين في اليوم

R/ Diphenhydramine: dramenex, sultan 1x2

قرص مرتين في اليوم

الاجسام الغريبة وكدمات الاذن
Trauma of ear:

-Donot use drops, remove foreign body, ask ENT doctor

روشتة لعلاج مرض منيير (اضطرابات الاذن الداخلية)
Meniere's disease:

مرض في الاذن الداخلية بسبب زيادة افراز السائل الموجود بها يصاحبه ضعف السمع وطنين و فقدان للاتزان

- diuretic: مدر للبول يقلل السائل في الاذن

R/ lasix or moduretic tab 1x1

- sedative: مهدىء

R/ valinil 5 mg tab 1x2

- vestibular suppressants: يقلل افراز السائل بالاذن

R/ stugeron, Dramamine tab 1x3

- vasodilator: يحسن الدورة الدموية بالاذن

R/ (trivestral , betaserc) tab 1x3

زيادة الافرازات من الانف
Causes of rhinorrhea:**rhinorrhea**

Sneezing, family infection yellowish discharge, onset less 1 week, fever

Common cold

Chronic, itching, no fever, clear watery discharge, allergic history

allergic rhinitis

Headache, face pain around sinus area, yellowish discharge, sinus congestion

sinusitis

unknown

Sinusitis, rhinitis, otitis media, laryngitis:التهابات الأنف والاذن

Antibiotics + analgesics + antihistaminic (claritine 1x1)
+ decongestant (otrivin nasal spray 1x3)

روشتة لعلاج التهابات الأنف والجيوب الأنفية Sinusitis, rhinitis:

R/ augmentin 625 or ibidroxil 500 cap 1x3

مضاد حيوى قاتل للبكتريا قرص 3 مرات فى اليوم

R/ ketofan tab 1x3

مسكن خافض للحرارة مضاد للالتهاب قرص 3 مرات فى اليوم

R/ claritine tab 1x1


مضاد للالتهاب قرص مرة فى اليوم

R/ otrivin nasal spray 1x3

للتقليل الاحتقان بخاخة بالانف 3 مرات فى اليوم

روشتة نزيف الانف
Epistaxis:نزيف الانف

مريض ينزف بشدة من انفه
نقيس له الضغط
لو كان على ندى الدوية تقلل الضغط
لو كان قليل نعلق له محاليل
يميل المريض للامام مع اغلاق الانف
نضع ثلج ومياه بارده على الانف
نضع قطنه مضاف لها امبول الديرينالين على
الانف
لو لم يتم السيطرة على النزيف يستدعى
طبيب الانف والاذن


Causes of Epistaxisالعلاج :

- Vital signs, treatment of shock if found
- Squeeze nose forward, cold compressors
- Epinephrine amp. Put it on cotton locally on nose
- Dicynone amp IM to decrease bleeding
- Afrin nasal drops 1x3 to make VC
- Treatment of cause as in hypertension, trauma
- ENT consultation



Eye prescriptions

روشتات العيون

Causes of eye problems:**Eye problems**Infection, inflammation: روشتة التهابات وعدوى العين- Drops (antibiotics) القطرات

Oflicin or ofloxin, optiflox, ciprocin, ciprofar, levoxin, apigent, optifucin, isoptophenicol, tobramycin 1x3

- Ointment: (antibiotics) المراهم

ciprocin or terramycin, apigent, opigent, tobrex 1x1 before sleep

- Drops (antibiotics+corticosteroids):

Isptomaxitrol, cortiphen, dexapolyspectrin, dexatrol, tobradex, apigent-p, dexamytrex 1x3

- Ointment (antibiotics+corticosteroids):

Cortiphen, dexaron plus, dexatrol, terracortil, tobradex, apigent-p 1x1 before sleep

الروشتة:

R/ Isptomaxitrol eye drop 1x3

قطرة للعين 3 مرات يوميا

R/ Terramycin oint. Before bed

مرهم للعين قبل النوم

روشتة لعلاج حساسية العين Allergy:

الدوية تقلل الحساسية وتعمل على تضيق شرايين العين وتقليل احمرار العين

- Prozoline, optizoline, visine, prefrin,
- Isoptofrin, eye clear drops 1x3



R/ prefrin or visine eye drop

قطرة للعين 3 مرات يوميا

روشتة لعلاج المياه الزرقاء (ارتفاع ضغط العين) Glaucoma:

سبب المياه الزرقاء هو زيادة كمية سائل العين مع زيادة ضغط العين نتيجة زيادة افراز السائل او قلة التخلص منه والعلاج يكون بتقليل انتاج السائل وزيادة التخلص منه عن طريق مجموعة من الادوية كالآتي:

Treated by ↓ aqueous humor formation, ↑ its drainage by:

-Beta blockers: تقلل تكوين سائل العين

E.g. timolol(.25-.5), timoptol, timogel 1x2

-Alpha 2 agonist: تقلل تكوين سائل العين

E.g. brimonidine(alphagan, betagan) 1x4

-Parasympathomimetics:

تريد من التخلص من سائل العين لانها تحدث ضيق في حدقة العين وتوسع لقناة العين

E.g. Isoptocarpine, occucarpine (2%, 4%) → miosis, ↓IOP

-prostaglandins: تقلل تكوين سائل العين

latanoprost(isprost, xalatan) 1x1

-Carbonic anhydrase inhibitor: تقلل تكوين سائل العين

E.g. → truspot, xola 1x2

Cosopt, twinzol (dorzolamide+timolol)

الروشتة:

R/ Timolol eye drop 1x2

قطرة للعين مرتين في اليوم

R/ latanoprost eye drop 1x1

قطرة للعين مرة يوميا

Dryness: روضة لجفاف العين وقلة الدموع

-Liquifilm tears, tear guard, tears natural, occutear 1x3

R/ Tear guard eye drop

قطرة للعين 3 مرات يوميا

Eye trauma: الاجسام الغريبة وكدمات العين

- Wash eye with saline
- Fine cotton to remove foreign body
- If penetrating foreign body donot remove it and ask an ophthalmologist.
- No use of tears or ointment



Night blindness: روضة لعلاج العشى الليلي بسبب نقص فيتامين أ


vit A preparations as it is needed in right vision

R/ A-viton, vit-A 1x1 cap.

Mydratics: روضة موسعات العين لفحص قاع العين

R/ Atropine, tropicamide → fundus exam, iritis, corneal ulcer

Eye parts : تركيب العين



Vitamins &
Minerals



Nutrition prescriptions

روشتات الفيتامينات والتغذية

Vitamins

Vitamin generic descriptor name	Recommended dietary allowances (male, Age 19–70)	Deficiency disease
<u>Vitamin A</u> <u>Retino</u>	900 µg	<u>Night-blindness</u> , <u>Hyperkeratosis</u> , and <u>Keratomalacia</u>
<u>Vitamin B₁</u> <u>Thiamine</u>	1.2 mg	<u>Beriberi</u> , <u>Wernicke-Korsakoff syndrome</u>
<u>Vitamin B₂</u> <u>Riboflavin</u>	1.3 mg	<u>Ariboflavinosis</u>
<u>Vitamin B₃</u> <u>Niacin</u>	16.0 mg	<u>Pellagra</u>
<u>Vitamin B₅</u> <u>Pantothenic acid</u>	5.0 mg	<u>Paresthesia</u>
<u>Vitamin B₆</u> <u>Pyridoxine</u>	1.3–1.7 mg	<u>Anemia peripheral neuropathy</u> .
<u>Vitamin B₇</u> <u>Biotin</u>	30.0 µg	<u>Dermatitis</u> , <u>enteritis</u>
<u>Vitamin B₉</u> <u>Folic acid</u>	400 µg	<u>Megaloblast</u> and Deficiency during pregnancy is associated with <u>birth defects</u> , such as <u>neural tube</u> defects
<u>Vitamin B₁₂</u> <u>Cyanocobalamin</u>	2.4 µg	<u>Megaloblastic anemia</u>
<u>Vitamin C</u> <u>Ascorbic acid</u>	90.0 mg	<u>Scurvy</u>
<u>Vitamin D</u>	5.0 µg–10 µg	<u>Rickets</u> and <u>Osteomalacia</u>
<u>Vitamin E</u>	15.0 mg	Deficiency is very rare; mild <u>hemolytic anemia</u> in newborn infants.
<u>Vitamin K</u>	120 µg	<u>Bleeding diathesis</u>


Treatment of vitamins, minerals deficiency

روشتات الفيتامينات والمعادن والتغذية

Vit B preparations:

-B1, B6, B12 tab or amp (IM) 3 times/week then 1/week

R/ Neurovit, neurobion, neuroton, depovit amp IM
امبولة كل يوم ويوم لمدة اسبوعين ثم امبولة كل اسبوع



- used in pernicious anemia and neurological symptoms

ممنول عن تكوين كرات الدم الحمراء والاعصاب

Folic acid:

R/ Folic acid 500 µg tab 1x2

قرص مرتين في اليوم

ممنول عن تكوين كرات الدم

Vit. A:

R/ A-viton, vit-A cap 1x1

قرص مرة في اليوم

-For night blindness, skin diseases

ممنول عن الرؤية وتكوين الجلد

Vit. D:

Vit D

R/ One alpha, calcidol, devarol-s, Calcidol, bone one) tab, amp. (.5-1) mg 1x1
قرص مرة في اليوم

Used for vit. D deficiency as rickets, osteomalacia

ممنول عن تكوين العظام والاسنان



Ca with vit D:

R/ maxical, calciton, calcin, calcid, cal-D-B12 tab 1x1

قرص مرة في اليوم

ممنول عن تكوين العظام والاسنان

Vit A with vit D:

R/ Cod liver oil (ultra seas, happy seas, sinawet, total) tab 1x1

قرص مرة في اليوم

Vit E:

Antioxidant

R/ Vit E(400-1000), vit E forte , toco tab. 1x2

قرص مرتين في اليوم

ممنول عن حماية الجسم من الاكسدة وتكسر الخلايا والسرطانات

Vit C:

R/ Cevaryl, vitacid-C, C-vit , amovit C 500-1000 mg tab 1x1

قرص مرة في اليوم

↑ immunity, ↑ healing of wounds, prevent scurvy

ممنول عن تكوين نسيج الجسم الداخلي فيحميه من العدوى والنزف

Mg:

R/ Biomag, calmag, calcimag, sandoz mg tab 1x1

قرص مرة في اليوم

Sugar alternates: سكر دايت

R/ Diet sweet, smart sweet, sucram, canderol

KCL:

R/ Slow K600, potassium chloride, potassium M 1x1 amp, tab

قرص مرة في اليوم

Iron: الحديدمسئول عن تكوين كرات الدم الحمراءused in: لعلاج الانيميا

Anemia with ↓ Hb, iron level

Pediatrics: للرضع

R/ Fer-in-sol, hydroferrin oral drops 1x1

قرص مرة في اليوم

Children: للأطفال

R/ Ferose, ferroglobin, vitaferrol, ferromix syrup 1x1

قرص مرة في اليوم

Adult: للكبار

R/ Ferose, haemoget, sytron, ferfol, haemoton, vitaferol, haema-caps cap. 1x1

قرص مرة في اليوم

Amp: للحقن العضلي

R/ Cosmofer, fercayl, ferosac IM

امبول مرة واحدة في اليوم

Side effects:

Abscess, black skin with injection, toxicity

GIT problems, black stool with oral tablets

Treatment of iron toxicity:

R/ Desferoxamine 500 mg (desferal) amp SC or IVI 1x2

R/ Deferiprone (kefler, ferriprox) tab 1x3

Multi-vitamens: مكملات غذائية ومتعدد الفيتامينات**Baby:**

R/ multivarol, polyvit, bebe-vit, polyvital drops 10x1
10 نقط مرة واحدة يوميا

Children:

R/ fruital, polyvit, multivitam, totavit, Hi-vit syr. 1x1
قرص مرة في اليوم

Adult:

R/ vitamount, migavit, supravit, totavit, vitop tab 1x1
قرص مرة في اليوم

Pregnancy, lactation:

R/ gynamax, gynavit, mammyvit tab 1x1
قرص مرة في اليوم

Skin, hair, nail multivitamens: tab 1x1

R/ Hipotency, vitagreen-N, ultrahair tab, hairvit, beta care 1x1
قرص مرة في اليوم

Eye support multivitamins: tab 1x1

R/ Eye vit, I care, ocugaurd, ultra eye, optovac, vita bright
قرص مرة في اليوم

Ginseng, royal jelly:

R/ Full mark, triple f, panax A, bee tonic, histar, superstar, vitama, mega plus, vabido, royal max, pharovit tab 1x1
قرص مرة في اليوم

Selenium:

R/ Selenium ACE, selenium vit, antox tab 1x1
قرص مرة في اليوم

Anabol

R/ Max

Ubiqui

R/ proto

R/ Co e

في اليوم

Appetiz

R/ Mos

في اليوم

Echina

R/ Echi

في اليوم

ATP:

R/ Ade

الاسبوع

One-Alpha
0.25 mg.

د عبدالله

Anabolic, amino acids: ادوية لبناء الجسم واهماض امينية

R/ Max gain , techno protein, amino, weight gainer powder

Ubiquinone: لحماية خلايا الجسم والغضاريف

R/ protect cartilages, Energy carrier

R/ Co enzyme-Q, Co-Q cap 1x1

قرص مرة في اليوم

Appetizers: stimulate appetite: فواتح الشهية

R/ Mosegor, vita-phos, vita-plus zinc, tres-orix forte cap 1x2

قرص مرتين في اليوم

Echinacea: enhance body defense لزيادة مناعة الجسم


R/ Echinacea, fluran, immune C , immulant cap, syrup 1x3

قرص 3 مرات في اليوم

ATP:

R/ Adenosine forte, adenoplex forte, epinosin b forte 3/week

قرص 3 مرات في الاسبوع



Prescriptions:

Eye infection: عدوى العين

- عيني حمرا يا دكتور وفيها خراج
- isptomaxitrol or dextarol drop 1x4
- Terramycin or tobrex cream 1x1 before sleep

Eye allergy: حساسية العين

- عيني حمراء وبهرش فيها كثير يا دكتور
- Prozoline or optizoline drops 1x3

Ear infection: عدوى الأذن

- ودني بتوجعني وبتنزل صديد
- hibiolic or velosef cap 500 1x3
- ciprocorl or viotic drops 1x3
- audax drop 1x3
- cataflam tab 1x2 50 mg

Tonsillitis: التهاب اللوزتين

- الولد بيسخن كثير وزوره بيوجعه عا طول
Hibiolic 375 susp, or 625 cap oral 1x3
Ibuprofen syrup or tablets 1x3

Sinusitis, rhinitis: التهابات الأنف والجيوب الأنفية

- augmentin 625 or ibidroxil 500 cap 1x3
- ketofan tab 1x3
- claritine tab 1x1
- otrivin nasal spray 1x3

Numbness, nerves pain: وجع الاعصاب

- depovit or neuroton amp day after day then every week

Rickets, osteomalacia: الكساح

- maxical or calcid tab 1x1

Anemia: الانيميا

- بتعب وبدوخ كثير وبחס بر فرقة ساعات و نقص في نسبة الهيموجلوبين
Haematon or haema cap 1x1 بعد الغذاء

Anabolic, amino acids: أدوية لبناء الجسم واهماض امينية

R/ Max gain , techno protein, amino, weight gainer powder

Ubiquinone: لحماية خلايا الجسم والغضاريف

R/ protect cartilages, Energy carrier

R/ Co enzyme-Q, Co-Q cap 1x1

قرص مرة في اليوم

Appetizers: stimulate appetite: فواتح الشهية

R/ Mosegor, vita-phos, vita-plus zinc, tres-orix forte cap 1x2

قرص مرتين في اليوم

Echinacea: enhance body defense لزيادة مناعة الجسم

R/ Echinacea, fluran, immune C , immulant cap, syrup 1x3

قرص 3 مرات في اليوم

ATP:

R/ Adenosine forte, adenoplex forte, epinosin b forte 3/week

قرص 3 مرات في الاسبوع





Toxicology prescriptions روشتات السموم

For intoxication we do: روشتة علاج التسمم

- Move to fresh air , O₂, opened air way
- Gastric lavage غسل المعدة, activated charcoal الفحم النشط, emesis التقيؤ can be used (induce vomiting of patient)
- We give antidote like(naloxone for morphine) نعطى مضاد السم
- Diet : nothing per oral+ fluids+ vital signs , ECG
- symptomatic treatment for fever, arrhythmia,.... نعالج الاعراض



For corrosives: روشتة علاج تسمم المواد الحارقة مثل البوتاس

- Avoid it by precautions and make it away from children
- Wash skin with tap water , saline
- Open airway, vital signs, symptomatic treatment
- Give milk, egg white
- Avoid gastric lavage, charcoal, emesis
- Corticosteroids to decrease fibrosis
- Antibiotics , H₂ blockers
- Oesophagoscopy, barium swallow
- Dilatation by surgery

Organophosphorus poisoning: روستة علاج تسمم المبيدات الحشرية

- Airway, O₂, gastric lavage, activated charcoal,
- Suction of secretion, symptoms treatment
- Antidote (atropine) every 5 minute till
- tachycardia, mydriasis, decrease secretion
- pralidoxime(PAM) early to stop the toxicity
- Artificial respiration if needed

لمراجعة سريعة مبسطة على الفارماكولوجي
والمزيد من المعلومات عن طريقة عمل
الادوية و التشخيص والعلاج والتحليل
ورسم القلب والاشعة

احرص على الحصول على الكتاب الرائع
Medicine and pharmacy guide

Medicine and Pharmacy guide

Your guide to be a good doctor

الدليل الشامل و الافضل لكل الاطباء والصيادلة



Contents:

- Pharmacology made easy
- Clinical pathology
- Radiology
- First aid
- Diseases atlas
- Emergency medicine
- ECG
- Medical procedures
- How to diagnose a patient
- Dermatology

للمزيد من المعلومات الرائعة عن رسم القلب والاشعة والتحليل
(الكلينيكال باثولوجي) احرص على اقتناء الكتاب الرائع :
The best in clinical pathology , ECG, X-ray



Clinical Pathology

The best in
Clinical pathology, ECG, X Ray
Dr / Ahmed Abd Allah



للمزيد من المعلومات عن الامراض الجلدية وتشخيصها وعلاجها احرص على
الحصول على الكتاب الرائع

ABC in dermatology prescription



ABC in:

Dermatology
prescriptions

روشتات الجلدية

(تشخيص وعلاج الامراض الجلدية)

Dr / Ahmed Abd Allah

How to deal with cases of emergency in a simple way



كل حالات الاستقبال والطوارئ وكيفية
التعامل معها بطريقة مبسطة

Dr/ Ahmed Elgazar

دى بعض الحالات اللى بتقابلنا فى الاستقبال وكيفية التعامل معها

لاى حالة حوادث تدخل الاستقبال يتم عمل الآتى:

- بعد عمل تذكرة دخول للمريض يتم فحصه عن طريق طبيب الجراحة وعرضها على كل من هؤلاء الاطباء حسب حالة المريض:
- (دكتور العظام و دكتور القلب والصدر و دكتور المخ والاعصاب و دكتور المسالك و دكتور التخدير و دكتور الانف والاذن و دكتور الرمد حسب حالة المريض)
- عمل اشعات على الاجزاء المصابة وعرضها على الطبيب المختص
- عمل التحاليل اللازمة لكل حالة
- التحويل للعمليات لاجراء عملية عاجلة اذا لزم الامر
- بقاء المريض تحت الملاحظة وحجزه فى المستشفى اذا لزم الامر

Routine investigations before operations:

التحاليل المستخدمة قبل العمليات

- صورة دم كاملة (CBC) Complete blood count
- تحاليل سيولة الدم PT, PTT, INR
- وظائف كبد liver function tests
- وظائف كلى renal function tests
- سكر عشوائى بالدم random blood sugar
- رسم قلب كهربى ECG
- Special tests, radiology according to different operations
- تحاليل واشعات اخرى حسب العملية

Anaphylactic shock and Hypersensitivity reaction الحساسية

Clinical picture

Sudden and important fall of blood pressure ,tachycardia, frequent ceutaneous manifestation erythema, urticaria ,quincke' oedema inconstant respiratory manifestations as dyspnea or even bronchospasm

Management

- امبول فور تاكورتين fortacorten كل 12 ساعة
- وفى الحالات الحرجة امبول كينا كورت kenacort vial مرة فقط
- امبول افيل avil ويكمل ب allergex tab مرتين يوميا (Or claritine (or tavegyl
- دهان Topical corticosteroid betaderm صباحا ومساء

الآزمة الصدرية Bronchial Asthma

Presentation

- Patient said he is asthmatic
- Complain of chest allergy عنده حساسية
- Dyspnea and chest wheeze ضيق نفس وتزريق
- By examination..... Bilateral diffuse sibilant ronchi

Management

- كوكتيل محلول وده عبارة عن 250 سم محلول ملح أو جلوكوز أو رينجر بس لو الحالة عندها ضغط بلاش ملح ولو سكر بلاش جلوكوز.....
- نضيف عليهم امبول امينوفيلين NB
- وده ميتخدش في cardiac patient إدي بداله ventolin
- امبول ديكادرون وده مينفعش مع حالة السكر والضغط
- امبول بيسولفون, bisolvon امبول أفيل avil
- وممكن تدي الأربع امبولات من غير محلول بس يتاخدوا ويريدي ببطء أوى على مدار ربع ساعة.

لو الحالة متحسنتش

- * نعمل جلسة استنشاق نيبوليزر nebulizer كل 6 ساعات وهي :
- 1 سم فاركولين (salbutamol) farcolin
- 2 سم محلول ملح saline
- امبول اتروفينت anti muscrinic
- Atrovent to relive bronchial spasm in vials inhalation solutions
- * ممكن نكرر الجلسة بعد ربع ساعة

لو الحالة متحسنتش

- * ندي امبول سيلوكورتيف (dexamethasone) solucortef في الحالات الخطيرة
- * ولو متحسنتش برضوا نعمل أشعه عاديه على الصدر وعرض صدر على نائب الصدر.

المغص الكلوي Renal colic

- * وأنت واخذ history كويس إن في Stone يبقى بلاش تدي أي محاليل علشان متزودش الألم ساعتها تديله امبول بسكوبان buscopan أو فسر الجين visceralgine أو جلوكولينامين ويريدي glucolynamine
- سباز موفين spasmofen بس ده عضل وليس مسكن فقط كما يعتقد البعض.

لاحظ ان:

الآلام ماسك جنبه loin pain أو مكان المثانة أو مكان الحالب وفي تغير في البول
زي حرقان burning أو يقطع أو ألوان غريبة haematuria

Management

- 250 سم محلول ملح أو لبنات (مملوع لو فيه stone)
- امبول باسكوبان - امبول جلو كولينامين - امبول فيسر الجين
- لازم نطلب منه بعد كده يعمل تحليل بول

نتائج تحليل البول

Crystals: أولا

* لو **urates** ياخذ urosolvin eff. كيس فوار على نص كوب ماء ثلاث مرات يوميا
ولو في وجع في الكعب ياخذ

Zyloric (200-800) tab Or No-uric (100-300) mg

*لو oxalate

epimag eff كيس فوار على نص كوب ماء ثلاث مرات يوميا
ويحرم من أملاح والأملاح موجودة في المانجو والفراولة والطماطم والشاي في
الحالتين مبيطلش الفوار إلا إذا أعاد التحليل وطلعت سليمة.

*لو phosphate

ياخذ **vitacid c tab**

ثانيا: pus

* أقل من خمسة في **HPF** مش ياخذ حاجة

* لو عدد الصديد من 5 ل 30 ياخذ

Uvamine retard cap كبسول كل 12 ساعة

Macrofuran(50-100) كبسولة كل 6 ساعة

* لو الصديد من 30 ل 50 ياخذ **Quinolones** كويصة في علاج UTI

Ciprofar 250 or ciprofloxacin or bactiflox (250-500) كل 12

ساعة لمدة أسبوع

Kiroll or tarivan(ofloxacin200)

كل 12 ساعة بعد الأكل بساعتين أو قبل الأكل بساعة.

* ممكن نضيف الآتي

Coliurinal or proximol Antiseptic eff. كيس على نص كوب

ماء 3 مرات

Rowatinex cap Analgesic ك كل 8 ساعات

لو أكثر من 50 يعمل مزرعة عشان تحدد نوع المضاد الحيوي إلي العيان

هياخده أفضل

Epistaxis نزيف الأنف

*عيان جالك بينزف من انفه وطبعا منسيتش تساله على الضغط hypertension
لأنه من أهم العوامل المؤدية لنزيف الأنف ومنها أيضا :

-Nasal trauma, dryness of nasal mucosa , bleeding disorders

*bleeding come mainly from kisselbach's plexus at anterior nasal septum.

First aid

-venous pressure يكون جالس عشان يقلل

-Hand compress nostrils for 10 minutes

-Leaning forward

-May use cold compresses on nasal septum and not inside nose

-Add amp epinephrine to nasal pack for local use

فرغ محتويات امبول واحد على قطعة قطن وضعها داخل فتحة الأنف

-Afrin adult spray 0.05%

بخاخة للأنف 4 مرات لمدة يوم واحد

Management

*نوقف النزيف ب nasal pack عشان تعمل pressure على مكان النزف إلى

بيكون قريب من الحاجز الأنفي ممكن نعمله بشاشه عليها فازلين Vaseline

gauze وطبعا رأس العيان لتحت مش لفوق زى ما بيقولولنا (full flexed to avoid aspiration)

*ممكن كمان نديله دواء haemostatic زى مثلا ال haemostop امبول واحد

وريد أو نفضيه على الشاشة ونضعه على مكان النزيف Local. أو

dicynone 250 (ethmasylate) امبول.

*وممكن يمشى على أدويه زى:

Ruta-C tablets 1X3 ,heamostop tablets 1X3 or dicynone

ودي بتقوى الشعيرات وبتمنع النزف Antihaemorrhagic and capillary protective

*وممكن نطلب منه يعمل سرعه نزف وصوره دم

Pt=prothrombin time=10-15 sec

PTT=partial thromboplastin time=35-45 sec

Bleeding time=2-7 min

Platelet count =150,000 - 400,000

عوطبعا لازم يظبط الضغط لان الضغط العالي سبب يزيد النزف وليس يؤدي للنزف إلا في ضعف الشعيرات الدموية وقلنا ياخذ لها فيتامين C

Hereditary recurrent epistaxis ممكن ان تكون بسبب
hemorrhagic telangiectasia=HHT

الجروح Wounds

إزاي نغير على جرح؟

طبعا الأول اى جرح نتأكد انه مفيهوش نزيف داخلي ومش محتاج غرز وإلا نوقف النزيف ونخيط الجرح الأول

الغيار إزاي:

- نغسل الجرح كويس جوا الجرح والمنطقة اللي حوله بمحلول ملح وبعدين ماء أكسجين وبعدين بيتادين

- ممكن نضيف مرهم مضاد حيوي مثل fucidin ونضع الـ dressing وشاش وبلاستر

- حقنه تيتانوس لو سنه فوق الـ 10 سنوات (بعد عمل اختبار حساسية)

نكتب للمريض على مضاد حيوي 500 velosef كل 8 ساعات

ومسكن 400 tab brufen ثلاث مرات

هل اى مجروح يأخذ التيتانوس؟

*التيتانوس لا داعي لإعطائه لكل شخص مجروح إنما يعطى للأشخاص اللي يحتمل ان جرحهم يكون أتلوث بفضلات الحيوانات وخصوصا الخيل..... مثلا الأحواش و الجنائين

(لوجود السماد الطبيعي المصنوع من فضلات الحيوانات)

*أما الجروح في المنازل و المكاتب و الأماكن النظيفة فلا داعي للتيتانوس.... و ذلك لأن الميكروب نفسه مصدره فضلات الحيوانات مش الأشياء المغطاة بالصدا ء كما يعتقد معظم الناس.

هل اى جرح يخيط؟

* هناك ملحوظة ان الجرح لا يخيط إذا مرت 6 ساعات عليه.

*الجروح الناتجة عن عض الحيوانات لا تخيط و تغسل بالماء و الصابون
الجروح القديمة يجب التأكد من خلوها من الصديد بالضغط حوالين الجرح.

Vomiting التقيؤ

*You should at first exclude that:

-Appendicitis, Acute abdomen, Insecticides, DKA

*ماعدًا ذلك :

امبول برمبران عضلي أو وريدي بس مينفعش في الأطفال والحوامل ياخذوا

cortigen B6 amp

ويكمل في المنزل ب **Motilium or primpran tab** ق 3 مرات

Hypertension ارتفاع الضغط

More than 140/90 plus headache with or without epistaxis

*لذلك لا بد من قياس الضغط لأي مريض يشتكى من صداع

Investigations

- كولسترول ودهون ثلاثية
- سكر عشوائي بالدم وصائم و بولينا و كرياتينين
- تحليل بول كامل و بروتينات بالبول في 24 ساعة
- رسم قلب كهربى وموجات فوق صوتية على القلب و موجات فوق صوتية على البطن
- بروتينات الدم و سرعة الترسيب و الهيموجلوبين و نشاط بروثروميين
- صوديوم و بوتاسيوم

Management

*امبول لازكس lasix وريدي ثم يدخل الحمام 3 مرات ونقيس الضغط ممكن اديه كل 8 ساعات... لو لسه عالي كبسولة ايبيلات **epilat 10mg** تحت اللسان كل 12 ساعة بس خلى بالك بتنزل الضغط بسرعة وممكن تدخل في cerebral edema علشان كده... ممكن ادى قرص **capoten 25 mg** تحت اللسان اضمن كل 8 ساعات قبل الأكل

Tritac tab 5 mg once daily أو

أو الدوميت **aldomet 250** قرص مرتين يوميا

أو اتينولول **atenolol 50** قرص مرتين يوميا

أو Combination.

*ولما ضغطه ينزل يجى تانى يوم العيادة الخارجية علشان نعرف ايه سبب

الضغط والدكتور يختار له الدواء المناسب ليه :

Drug choice

Young adult First line is diuretics & b-blockers
2nd is ACE inhibitors as capoten or Ca channel blockers as
Epilat

In old age 1st line is Ca channel blocker with or without
diuretics

In Heart failure Lasix - capoten
Nefidipine & B.Blockers ممنوع الأتي

Renal failure Lasix-nefidipine(epilat)-aldomet
ممنوع → thiazide diuretics & capoten (ACE inhibitors)

*Alternatives:*Ca channel blockers

-Epilat , adalat 10 mg soft capsule (nifedipine) in HPN &
unstable angina(coronary & peripheral V.D)

-Epilat retard , adalat retard 20 mg

*ACE inhibitors

Captopril 25, 50 mg (capoten- capotril) short acting
Ramipril 1,25 -2,5-5 mg (tritace -ramipril)long acting

*B.blockers

Atenolol 50,100 mg (atenolol-ateno-atelol)

الضغط المنخفض**Hypotention less than 80/ 60**

*العيان ممكن يشتكى من صداع دوخه او إغماء ياخذ 500 سم محلول ملح
وأمبول ديكادرون
وينشربه effortil 10 نقط على نص كوب ماء ياخذها في البيت عند نزول
الضغط

Hepatic coma الغيبوبة الكبديةFluid replacement

ياخذ 500 سم جلوكوز 5 % كل 12 ساعة و رينجرز 500 كل 24 ساعة وليس ملح لان المريض عنده

2ry hyperaldosteronism with salt and water retention

diuretics ممنوعFor liver support

- Aminoleban 250 سم كل 12 ساعة وريدي
- Hepamarin or Legalon tab (silymarin) قرص 3 مرات
- حقنة عضل كل يوم ويوم Tri-B
- Essential forte tab قرص 3 مرات
- Lactulose syr (Ammoniacal antagonist) - ملعقة كبيرة 3 مرات
- Comatozed → لو المريض NG TUBE → ممكن عن طريق
- NEOMYCIN 500 فرصين كل 8 ساعات
- جلوكوز 25 % 250 سم يضاف عليه:
- hepa merz amp امبولين هيباميرز
- Nootropil amp 1000 لتنشيط خلايا الكبد وحمايتها: امبولين نوتروبيل وريدي
- او كسبيرال عضل oxybral amp لتحسين وظائف الذاكرة والمخ
- حقنه شرجية كل 6 ساعات (لتر ماء دافئ + 5 مكيل لاكتيلوز بالتبادل مع 2 مجم
- نيوميسين neomycin

measures against Hge. (If present)

in upper git bleeding : nothing is given by mouth

2 امبول KONAKION + 2 امبول DICYNONE كل 8 ساعات

2 امبول CYCLOKAPRON كل 12 ساعة

كله وريدي

* لمنع العدوى CEFOTAX 1gm كل 12 ساعة

* متنساش في حاله غيبوبة الكبد لازم تاخذ History كويس من اهل المريض و تاخذ عينه سكر عشوائي علشان نتأكد انها مش غيبوبة سكر

Def.: loss of consciousness

Causes

*intracranial as:

head trauma & intra cranial. Hge. (cerebrovascular stroke)
with increased B.P

brain abscess, encephalitis, meningitis, massive infarction,
hypertensive encephalopathy, brain tumor. All intra cranial
causes may & may not come with lateralization signs which

are :

* unequal pupil, * facial asymmetry, * unilateral hyper or
hypotonia

* unilateral Babiniski, asymmetrical deep reflexes

*extra cranial causes:

toxic as co poisoning

-(D.M) may be: 1- hypoglycemic → treated with 100 cm
glucose 25% 2- DKA

-uraemic (CRF)

-AMI

-hepatic (Encephalopathy)

resp. Failure

Diagnosis:

History + complete physical exam. + Investigations like

* ABG غازات بالدم الشرياني

* renal function tests وظائف كلى

* complete urine analysis تحليل بول كامل

* urea & creatinine بولينا و كرياتينين

* random blood sugar (R.B.S) سكر عشوائي بالدم

* glucose & acetone in urine سكر و أسيتون في البول

* liver functions tests (L.F.T) وظائف كبد

* bilirubin direct, indirect & total الصفراء مباشر وغير مباشر وكلى

* SGOT & SGPT

* Prothrombin activity نشاط البروثرومبين

* ECG

*Abdominal U/S

*Brain CT

TTT:

1- maintain adequate oxygenation

Care of patient during coma.

- في الوضع نصف جالس مع تدليك أماكن الاحتكاك بكحول وبودرة تلك كل ساعتين.

2-ttt of shock if present

*By insertion of nasogastric tube and feeding the patient with 2 liters of fluid

- تركيب أنبوبة معدة وإعطاء السوائل من خلالها حوالي 2 لتر.

*Insertion of Foley's catheter and estimation of urine in 24h

- تركيب أنبوبة فولي وحساب كمية البول في الـ 24 ساعة.

- أمبول سيفوتاكس 1 جم كل 12 ساعة

3-hospitalization & recording vital signs at regular intervals.

*أهم حاحه في حاله الـ coma اسأل على onset علشان

neurological cases and hypoglycemic coma ← Sudden onset

gradual onset ← metabolic coma زى غيبوبة الكبد

والكلى DKA & hyperglycemic coma

Intracranial Heamorrhage نزيف المخ

One of cerebrovascular stroke (C.V.S)

Patient clinically presents with History of hypertension, Right or left hemiplegia, hemiparesis, facial deviation, Coma, Slurred speech.

Investigations needed

***For hypertension**

- Na, K

- كوليستيرول ودهون ثلاثية في الدم-

-Cholesterol & TG in blood

-Urea & creatinine -Complete urine analysis

***For other causes**

-Random blood glucose -ECG -Urgent CT brain

Treatment:

*Dehydrating measures and antihypertensives

-mannitol 20 % 250 cc IV

على مدى ساعة كل 12 ساعة لمدة يومين ثم يوقف

-lasix 40 mg amp.

امبول كل 12 ساعة بحيث لا يقل الضغط عن 70/100

-fortacortine amp. IV

امبول وريدي كل 12 ساعة لمدة يومين ثم امبول كل 24 ساعة لمدة يومين آخرين ثم يوقف

*Cerebral Stimulants :

oxybral ampoule IM improve cerebral and memory condition

-Nootropil ampoule IV

2 امبول كل 8 ساعات وريدي

*Measures to prevent stress ulcer

-zantac amp.

امبول كل 12 ساعة أو قرص 150 مرتين يوميا

-motilium syp

معلقة كبيرة 3 مرات يوميا

*Intubation

-Ryle catheter ordinary fluid and cannula and give 1.5 liter

-Foley's catheter

تركيب قسطرة فولى وحساب كمية البول خلال 24 ساعة

*Care of comatozed patient

يقلب المريض كل ساعتين مع دهان أماكن الاحتكاك بكحول وبهبة تلك

*Specific measures to stop hge.

-dicynone amp IV 2 امبول كل 8 ساعات

-konakion amp 2 امبول كل 8 ساعات

-cyclokapron amp 2 امبول كل 8 ساعات

*if vomiting give primperan *abimol *flumox 500 mg

Gastritis and hyperacidity الحموضة والتهاب المعدة

*الم في فم المعدة burning pain in epigastrium و غالباً معاً حمو على الصدر heart burn ويمكن يرجع أو nausea

Management

250سم محلول عليهم
امبول زنتاك zantac(ranitidine) أو tagamet(cimetidine)
امبول بسكوبان
امبول برمبران لو بيرجع
ويمكن نكتفي بامبول زنتاك بس على حسب الحالة
ويمكن تكرار المحلول لحد ما العيان ما يستريح إلا البرمبران طبعاً
*واكتب له على علاج يأخذه في البيت
zantac 150 or 300 mg tab مرتين في اليوم قبل الأكل بنص ساعة
mucogel susp or epicogel معلقه كبيرة قبل الأكل 3 مرات
لو العيان حالته المادية كويسه اكتب له على proton pump inhibitor
losec or omez or omeprazole كبسولة مرة واحدة في اليوم
و تنبه عليه انه يبعد عن الآتى : الشاي والقهوة والأكل الحراق والأكل المسبك
وأدوية المضادة للالتهابات إلى بتأثر على المعدة anti-inflammatory drugs
as piroxicam

Alternatives:

Zantac (tab&cap), Ranitidine(tab&cap), Histac(tab&cap)
Aciloc (tab), Ranitak(tab)

Common cold البرد

بيجي الطوارئ احيانا بسبب الصداع والسخونية والرشح وعلاجه حسب
الاعراض + المضاد الحيوى

Management:

Flumox cap 500 ثلاث مرات في اليوم
abimol extra tab قرص كل 6 ساعات وده
لأعراض الصداع والسخونية بعد الأكل bradoral lozeng
أقراص استقلاب كل 3 ساعات علشان صعوبة البلع- vitacid
c tab مرة يومياً لتحسين المناعة
Flurest tab قرص 3 مرات يومياً لأعراض الرشح
والحساسية (antihistaminic & decongestant)

Fluid therapy المحاليل

Fluid assessment = مین یاخذ محاليل ومین مش محتاج

	HYPOVOLEMIA	HYPERVOLEMIA
B. Pressure	Systolic 100 or low	High
Pulse rate & volume	Tachycardia & small volume	Normal & big volume
Central venous pressure	Zero	High
Tongue	Dry	Wet
Skin elasticity	Loss of it	Normal or peripheral edema
Haematocrit	Increased	Decreased
Urine out put	Little	Normal

*Fluid replacement:*Glucose 5% given

To replace water loss not associated with electrolyte disturbance, As solvent for many IV drug

*Dextrose, Glucose (20,25,40,50%) given in

As nutrient to give calories when GIT feeding isn't accessible as in deep coma

Strong hypertonic as in case of sever hypoglycemic coma

**25,40,50% are in bottles and amp. Amp=25 ml

*Saline (Nacl 0.9%) used in

Water loss with electrolyte loss

*Sodium bicarbonate

In cases of sever metabolic acidosis

0,5&4,2 % bottles, 8,4% in amp.

Ringer solution 500 ml

Contain nacl , cacl , kcl

*Plasma expanders

To maintain normal blood volume as in shock and hemorrhage

*Crystalloids

- * As saline & ringer give transient effect
Fate: escape to interstitial space
- * Glucose 5% fate is intracellular space

*Colloids

Mannitol, dextran, gelatin, albumin
Fate: intravascular space

Cough الكحةManagement

- Coflin syr 3 مرات في اليوم لو في كحه ناشفة
mucophyline syr لو كحه ببلغم ثلاث مرات يوميا
Phenadone syr (antihistaminic –corticosteroid) مرتين يوميا
Farcolin(salbutamol) tab ثلاث مرات يوميا موسع للشعب

Alternatives

- * Coflin contain(cough suppressant ,decongestant ,anti allergic),codilar, tussilar,neo pulmolar, selgon, siloma
- * Mucophyline, neominophyline, mucosin, mucovent, farcosolvin, trisolvin, ambroxol, Koffex, Actifed, solvex
- * Phenadone, vendexine, apidone syp
- * Farcolin, ventolin, bronchovent, salbovent tab

urine retention احتباس البول

- ركب له قسطرة بس ما تفضيش المثانة مره واحده فضيها ببطء وعلى مراحل عشان ال sudden decompression of bladder wall ممكن يؤدي إلى نزيف haematuria ولو مش ركبت دكتور المسالك بيركب حاجة اسمها

suprapubic cystostomy

تحويل لمجرى البول عن طريق قسطرة من البطن

Gastroenteritis التلثة المعوية

Vomiting, diarrhea, abdominal pain with or without fever
*

Management

امبول برمبران + امبول بسكوبان + امبول افيل avil مضاد هيمتامين
امبول ادولور adolor مسكن قوى
يمكن نديهم على محلول رينجر او ملح خصوصاً لو dehydrated

Home TTT

antennal cap or diax* للإسهال كبسولة كل 8 ساعات
Spasmocin tab or no-spasm or visceralgine* قرص 3 مرات في اليوم
علشان المغص

Flagyl 500 tab or amrizole* 3 مرات في اليوم لو في تعنيه (دم ومخاط
بالبراز)

Motilium tab or domperidone or motinorm or gastromotil*
مرتين يومياً

Streptokine tab or entocid* ثلاث مرات يومياً
ومضاد حيوى خصوصاً في وجود سخونية أو حاله مزمنة chronic يأخذ
ciprofloxacin 500 tab (quinolones)
كل 12 ساعة قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين
*ولما حالته تستقر يعمل تحليل براز لمعرفة السبب ويجى عيادة الباطنه

Myositis or back pain or myalgia ألم العضلات

ألم في أى مكان في البطن أو الصدر أو الظهر

Management

- * myolgen cap or myolax or ,myofen cap. 1x3
- *cataflam 50 or or antiflam 50, adwiflam 50 1x2
- * Felden gel or olfen gel local 1x3
- *Neurovit amp or neuroton or tri B(vitamin B complex)

Appendicitis

Presentation

1- Symptoms

* يجي الألم في جنبه اليمين عادة يكون مسكن شويه fever والنهض سريع
* الألم بدأ حول المصرة periumbilical وبعد كده راح للجنب اليمين localized
in R. iliac fossa

* مفيش أى شهوة الأكل anorexia نفسى مسدودة خالص يا دكتور
* ممكن رغبة للقوى nausea أو ممكن في ترجيع vomiting

2- Signs

* مع الفحص لازم يشاور على المكان بصلع علشان اتأكد أنها في

macburny point

* يتبقى فيه tenderness and rebound tenderness وممكن يبقى في
rigidity

* cross tenderness* اضغط على الجنب الشمال جنبه اليمين يوجعه
* cough tenderness* الألم بيزيد مع الكحة لدرجة انه مبيقدرش يكمل الكحة أو
مبيقدرش تاقى

* هى واحدة اللي هتسأله بعملها وبس بالإضافة ان الألم بيزيد مع رفع الرجل ناحيه
البطن بركبة

Management

* محلول جلوكوز 25% عليه امبول فسيرلجين و امبول بسكوبان

لاحظ: ممنوع ادى اى مسكن analgesic خالص علشان not mask the
diagnosis

* لو لسه الألم موجود لازم اعمل تحليل بول علشان أنفى أنها مش مفعص كلوي
renal colic

* و اعمل تحليل عدد كرات دم البيضاء W. Blood cells وده مهم ولازم يتعمل
بتكون اكثر من 11 ألف

* ولو بنت اعمل سونار على pelvis علشان تتفى أنها مش كيس أو اى مشاكل
في المبيض زى

Mid-cyclic pain بس هنسأل في اى مشاكل في الدورة في history الـ بناخدة.

* و اعمل تحويل على نائب الجراحة لو ما اتحسنش حتى تزال الزائدة جراحيا

appendectomy

باستخدام laparoscopy or laparotomy مع استخدام المضادات الحيوية
للسيطرة على نشاط البكتريا والوقاية من الدخول في مشاكل مثل
peritonitis, septicemia and septic shock

*بعض مش كل حالات الزائدة الألم يشتكي حولين السرة (typical) الأول ممكن
يبدأ في الجنب اليمين على طول.

لاحظ ممنوع تدي analgesic في acute abdomen في حالتين ←
في الزائدة mask diagnosis
وفي gastritis علشان بيزود HCL

مرض السكر uncontrolled DM

Headache ,malaise ,blurring of vision history of DM or
patient on anti DM ttt

اطلب شريط سكر عشوائى وكود والجهاز

Pin prick the finger tip ,put a blood drop on the tape mark ,put
the tape in the device, wait and read the resulting number ,if

random blood sugar is:

200 - 250-خمس وحدات انسولين مائى تحت الجلد

250 - 300 عشر وحدات انسولين

300 - 350 خمسة عشر وحدة

350- 400 ياخذ عشرين وحدة

-اكثر من 400 ياخذ 25 وحدة

لو لسه على بعد كده

ياخذ 25 وحدة انسولين على 500 سم رينجر بمعدل 20 نقطة في الدقيقة

ومع تحليل البول يبين وجود سكر في البول ولكن لا يوجد اسيتون في البول

• ويعطى ايضا 500 س ملح وريدي

• يعاد تحليل البول والبحث عن الاسيتون كل 12 ساعة

• قرص موتيليم 3 مرات

• قرص زانتاك 150 مرتين يوميا

• امبول تراى بى كل تانى يوم لالتهابات الاعصاب neuritis

hyperglycemic coma and DKA غيبوبة السكر

Due to missing insulin dose in patient IDDM.

Presentation

Random blood glucose more than 400
acetone on urine وفي استون في البول , low potassium level
polyurea , acetotic breathing rapid deep breathing, tender
abdomen , vomiting

Management

500سم محلول ملح + امبول بوتاسيوم كلوريد kcl لتعويض البوتاسيوم
500سم رينجر + امبول بوتاسيوم كلوريد
500سم محلول ملح + امبول بوتاسيوم كلوريد
500سم رينجر + امبول بوتاسيوم كلوريد
ويتم تحديد نسبة الانسولين مثل السابق

How to begin ?

Iv fluid replacement •

1 لتر محلول ملح الان ثم 1 لتر محلول خلال ساعة ثم 1 لتر محلول خلال ساعتين
ثم 1 لتر خلال اربع ساعات ثم 1 لتر خلال 8 ساعات بتبادل محلول الملح مع
محلول رينجر

Lowering blood glucose by insulin •

25 وحدة انسولين مائي عضل الان بسرنة 100 ومتابعة الاستون والسكر كل
ساعة

لو قل السكر عن 250 في الدم ياخذ 250 سم جلوكوز 5 % (في وجود
الاستون)

اذا تحسنت الحالة نقيس السكر في الدم

اقل من 200 لاشي

من 200 لـ 250 خمس وحدات انسولين عضل

من 250 لـ 300 عشر وحدات

من 300 لـ 350 خمسة عشر وحدة

من 350 لـ 400 عشرين وحدة

اكثر من 400 ياخذ 25 وحد

Correction of potassium •

potassium chloride two ampoule on 500 cc ringer

Correction of acidosis •

المحاوّل سم 250 بيكر بونات صوديوم كل 12 ساعة مع

Prophylactic of DVT •

500 وحدة هيبارين تحت الجلد

إذا اختفى الأسيتون واستمر السكر يعطى انسولين تحت الجلد كما سبق

Blood glucose level حسب

مع باقي الأدوية motilium, zantac, tri-B, prempran

hypoglycemic coma غيبوبة نقص السكر

مرضى سكر إما واخذ جرعه الانسولين ومفطرش أو واخذ جرعه كبيرة من ادوية السكر

random blood sugar below 50mg/dl, wet

tongue, sweating drowsiness

ياخذ 500 سم جلوكوز 25 % أو 5 % ونتابع الـ random blood glucose

Intestinal obstruction انسداد الأمعاء

Abdominal distension and colic, vomiting, absolute constipation

x ray show multiple air fluid level

استدعاء نائب الجراحه ويتم حجز الحالة في قسم طوارئ الجراحه

Loss of consciousness فقدان الوعي

تأوّهى تتكلم عن واحد جاى مغمى عليه اعمله ايه ؟؟؟

رتب افكارك علشان متهش

اول حاجه اعملها ABC

A: air way اشط السيكرشنز لو موجودة

B: breathing التنفس شغال ولا لا

C: circulation شغاله فيه نبض ولا

shocked..or not.....

دلو قى قىس الضغط متلاقىه قليل

علامات اخرى تبين الشوك زي:

Hypoperfusion to brain : drowsiness /
confusion/ coma

Hypoperfusion to heart : rapid weak pulse

Hypoperfusion to kidney: oliguria/ anuria

الاعراض :

RR >> tachypnea 2 زياده النفس والنبض

Hr >> tachycardia

مش شرط قلنا 2 hypotension >> bp (بيقلو)

T >> hypothermia

حاجات اخرى العيان ممكن يكون

Oliguric / pale / cold /

بعد كده فحص النيوور

neurological examination

Pupil: unequal = brain stem lesion

Mouth :deviated to one side ... sign of
lateralization

Upper & lower limb weakness : sign of
lateralization

Urine incontinence sign of
lateralization

Babinisky sign..... sign of lateralization

مع العلامات دي ممكن نضيف حاجات تانيه حسب
السبب الموجود مثلا:

Meningitis : rigid stiff

neck/fever/photophobia/repeated vomiting

Vertebrobasilar insufficiency : nystagmus

If ABC , neuro good:

ندور على

signs of system failure

Heart failure/ respiratory failure/renal

failure/liver cell failure

endocrine causes of coma
لو كويس دور على ال

(غيبوبه سكر) بس ممكن من

الاول بيان انها غيبوبه سكر بس لو مفيش معاه حد
زى ما انا كاتب systematic (ومش باين عليه امشى

Or thyroid dysfunction comas

hysterical coma لو مفيش دور على ال

العيان بيبرش وبيحرك عينيه لما تقفلها وتفتحها

Blinking & escaping eye ball

poisoning لو مفيش ممكن يبقى تسمم

بتبقى واضح من الاول زى ال

organophosphorus وحاجات ممكن متبقاش واضح

زى الاب اللى اعطى بنته حشيش علشان كان عندها

كان صعب history اسهال باين وطبعاً ال

من العدوى الشديده وبتبقى سخونيه Septic coma
عاليه

لو ملقيناها حاجه بعد كده بنكتب

بالانجليزى

Unexplained : coma under investigations

طبيب نديلها علاج ايه:

1- محاليل علشان التغذية

2- stress ulcer زانتاك علشان نحمى المعده من ال

3- مضادات حيويه

4- تنفس صناعى شويه ونشيله شويه (بنشيله علشان

عضلات التنفس متشلش)

5- brain stimulant ممكن حاجه

oxypral /nootropil زى ال

Tense ascitis (TTT) الاستسقاء1-Rest in bed.2-Salt restriction (salt free diet)3-Diuretics:

a) Start with Spironolactone (Aldactone) 100 mg قرص بعد الغداء
And increase gradually up to 4 tablets \day Value : K sparing diuretic,
Aldosterone antagonist.

b) Lasix 40 mg daily up to 4 tablets (160 mg\day)

N.B.: Diuretics esp. Lasix stopped if there is hyopkalemia or precoma

4-Follow up pt. with fluid chart

(body wtàtarget: decrease B.wt by 1\2 kg \day.)

5-If resistant

Tapping or paracentesis should be done if tense ascitis cause
significant discomfort or resp. distress

6-Tapping:

a-Exclude encephalopathy. b-Palpation of abdomen to avoid injury to
any organ during tapping . c-Sterilization of (Macburny's point) or
mid

way bet. Costal margin & ASIS(most dependant area)

***Sterilization

is done in circular manner from in to out by betadine then alcohol.
dintroduce

canula + IV line.

- Replacement with albumin if tapping > 3L (one bottle contain 10gm)

- Stop if : hypotension , bleeding of tapping ,, disturbed conc. Level.

N.B.:-

Diagnostic purpose of tapping : if suspicion of malignant ascitis or
SBP or .

new onset ascitis.

Fluid obtained from tapping : 3 samples for : culture & sensitivity, .
chemistry, pathological exam.

Indication of Albumin in CLD Pt.: .

- Tapping > 3 L of ascitis fluid. - Infection - Surgery - SBP -
Hepatorenal \$

SBP (spontaneous bacterial peritonitis) : التهاب البريتون

Infectious complication of portal HTN related ascitis in absence of cause for peritonitis . most common org : E-coli....

C/P : Pt with CLD with [marked deterioration precipitate hepaticencephalopathy], [fever, abd.pain , tenderness] ,, [silent]

D.D : leucocytosis may be present

Diagnostic paracentesisàcell count [WBC >500\ m³\HPF with out sympt.,,PNL >250 \m³\HPF with symptoms]

TTT:

- Antipyretic.

- Antibioticà3rd generation cephalosporin E.g. : cefotaxime "claforan" 1 gm\ 8 h for 5 days unless there is renal failure ((dose adjustment)) - Anticoma measures (previously mentioned) - Albumin.

Fever الحمى

Management:

1-Cold fomentation

2-Cold saline enema (# in diarrhea)

3-NSAIDs:

- Paracetamol

(R/ Cetal or Pyral, Brufen or voltaren)

4-Aspegic: - كنت سامع من الاستقبال والحضور أن البارسييتامول مش بيشتغل إلا عند درجة حرارة 38

5- Search for the cause: sore throat, chest

infection, ear infection, UTI.....

if u don't find a cause for fever & fever is prolonged > 2 wks

>>>>>>

FUO (fever of unknown origin) الحمى مجهولة السبب

(For FUO) Investigations

1-CBC 2-ESR

3-Blood culture , urine culture , sputum analysis + ZN stain

4- Collagen markers

5-Malaria & Toxoplasmosis 6-Widal & Brucella

7- X- ray chest

-first or
-amount
-history
hyperte

-do gen
oedema
conscio

Not

Haematemesis, melena القيء والاسهال الدموي

يتم عمل دخول باطنه على تذكرة الدخول

لازم اسأل المريض بشأن احدث خطورة الحالة وهل تحتاج نقل دم أو لا

-first or recurrent attack

-amount of blood

-history of liver disease, DM, ← بشأن اعرف السبب

hypertension, analgesic abuse

بشأن اتأكد من السبب وإذا كان في مشاكل ثانية

-do general and local examination, comment on neck vein, LL oedema hepatosplenomegaly, ascitis, vital sign pulse BP temp, consciousness

Management

- لا يعطى شيء عن طريق الفم Nothing P.O. (per oral)
- يتم صرف كيس دم بشري من نفس الفصيلة بعد عمل التوافق
- 500 سم جلوكوز 5% يضاف اليه ما يلي
- امبول سيكلوكابرون cyclokapron
- (tranexamic acid antifibrinolytic)
- امبول دايسينون أو هيمو ستوب haemostop
- Antihaemorrhagic and capillary protective
- امبول زنتاك ranitidine
- امبول فيتامين ك الافضل يؤخذ عضل
- Amri-k or konakion or haemokion
- فيتامين كاف هو عامل مساعد في تكوين عوامل التجلط 10-9-7-2

Toxicology Cases حالات التسمم**organophosphate poisoning** المبيدات الحشرية**Presentation**

الثلاثي المعروف في تشخيص حالات تسمم المبيدات

Pin point pupil, bradycardia, hypotension

ومتساش العيان بيزيد عنده الـ secretion من كل حته يعنى

عنده salivation, sweating, diarrhea

المريض يشتكى أيضا من nausea, vomiting, dizziness

Management:

*for a case of acute intoxication 4 broad lines done:

1-first aid or supportive care

-which is life saving to maintain patent air way and removing secretions and insertion of oropharyngeal tube.

2-prvention of further absorption of poison

- removing contaminated clothes and washing skin Also by insertion of ryle tube 16 and stomach wash

غسيل معدة: استعمل 500 سم محلول ملح وبعد كده اغسل بميه حنفيه لحد ما الناتج يكون clear

بعد كده اطحن حبوب الفحم (10 charcoal tab) اضفهم على 300 سم ميه واحطهم في الرايل ryle

3-methods to increase elimination of poison4- Use antidote

- **Atropine** 2 ampoule in one injection every 15 min
*امبولين اتروبين كل 15 دقيقه لحد ما يبقى pupil fully dilated or pulse reaches 120

واهم نقطه علشان اعرف ان الاتروبين جاب نتيجة ان secretion قلت سوف تجد لسانه بقى ناشف كده dry tongue

-parlidoxime (protopan chloride)

*في الحالات الخطيرة عبارة عن (choline estrase reactivatore)
بندي 2 امبول مضافين الى 15 مل ماء وريدي بطيء وتكرر عند اللزوم
- ياخذ امبول زنتاك zantac

Home TTT

Spasmodigestin tab قرص قبل الاكل
gastrofate(sucralfate)mucosal protective
يطحن على ملعقة عسل نحل قبل الاكل بنص ساعة على معدة فاضيه

التسمم الغذائي food poisoning

في حالات التسمم الغذائي كفايه غسل المعدة وياخذ بعد كده امبول زنتاك وامبول بسكوبان

.....

pr
(كي)

ة

Impote

it in
, 400r
(عة)Antide
Xyl

د عبدالله

Impotence عدم الانتظام

pregnyl 5000 امبول عضل / 10 ايام

proctan cap / يوميا

Anderiol cap / كل 12 ساعة

vasotal tab 400 / كل 12 ساعة

.....الشرح.....

pregnyl 5000 I.U (Human chorionic gonadotrophin)

واحيانا يوصف البروفاسي 5000profasi وحدة دولية (نفس التركيبي)

الجرعة الموصوفة : حقنة عضل كل 10 ايام

يستخدم لعلاج الـ 2nd testicular failure

و الـ undescended testis في الاطفال بتركيز 1500 وحدة دولية

الثاني:

proctan ST cap

وهو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات و الاعشاب الطبيعية لعلاج الـ Impotence

FOR SEXUAL POWER IMPROVMENT

الجرعة الموصوفة: كبسولة يوميا

الثالث:

(Andriol cap) testosterone undecanthate 250 mg

يستخدم لعلاج الـ hypogonadism

الجرعة الموصوفة : كبسولة مرتين يوميا (كل 12 ساعة)

الرابع:

(vasotal tab 400 mg) pentoxifylline

لعلاج الـ peripheral arterial circulatory disorders

it inhibit platelet aggregation, and decrease blood viscosity

البدائل : بيكسال 400pexal ، ترينتال 400trental ، ريبكوفليكس 400riboflex ،

بينتال 400pental الجرعة الموصوفة : كبسولة مرتين يوميا (كل 12 ساعة)

Premature ejaculation القذف المبكر

Prozac disp or anfranil 25 or 75 mg cap

كبسولة يوميا قبل الجماع بساعتين على الأقل (Antidepressant delay ejaculation)

دهان موضعي قبل الجماع بنصف ساعة (Xylocaine jelly (local anesthetic)

2 رشعة على رأس العضو قبل الجماع (Or lignocaine spray)

- أسباب زيادة البوتاسيوم
- 1- تناول أغذية ومشروبات تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بكميات كبيرة مثل الموز والطماطم والبطاطس ومعظم أنواع العصائر
 - 2- إعطاء محاليل تحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية زي الرينجر والكادالكس
 - 3- أدوية تقلل من إخراج البوتاسيوم في البول أو دخوله إلى الخلايا : ACEI & Beta blockers & spironolactone
 - 4- الفشل الكلوي الحاد والمزمن
 - 5- Acidosis بأنواعها تقلل من دخول البوتاسيوم في الخلايا و في البول
 - 6- مرض السكر نتيجة نقص الأنسولين ونقص دخول البوتاسيوم إلى الخلايا

أولا البوتاسيوم الطبيعي من 3.5 إلى 5

- * زيادته خطر جدا على القلب لأنها ممكن تدخل العيان في asystole
- * أول حاجة لو لقيت البوتاسيوم عالي تعطي المريض امبول أو اثنين كالسيوم في 100 جلوكوز على 10 دقائق وده بيحمي القلب من تأثير البوتاسيوم العالي
- * مانساش ان الكالسيوم مايتاخدش direct iv إلا ببطء شديد والأفضل اعطانه في المحلول.

ولو فيه Acidosis لازم تعالجها بإعطاء بيكاربونات صوديوم محلول في الوريد حسب درجة الـ pH و HCO3 deficit

* الخطوة اللي بعد كده اعطاء المريض 100 سم جلوكوز 25% مع 5 أو 10 وحدات السولين مائي VI وده بيعمل Intracellular shift of K ion

* وممكن أيضا ندي المريض لازكس مع محلول ملح لو الكلية شغالة هيزود افراز البوتاسيوم في البول ونعيد التحليل بعد العلاج ده ونشوف هل البوتاسيوم رجع إلى حد أمن أم لا

* ولو لسه عالي ممكن ندي جلسة نيبوليزر مع beta agonist زي السالبوتامول بس ما يكونش العيان في tachycardia أو يكون cardiac

* والحل الأخير للمشكلة دي جلسة غسيل كلوي طارئة لإزالة البوتاسيوم الزيادة حيث إن كل العلاجات السابقة هدفها هو نقل البوتاسيوم الزيادة إلى داخل الخلايا ولا يتم التخلص منه إلا بالغسيل الكلوي لو المريض ده عنده فشل كلوي.

Best wishes

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم




Diseases diagnosis

تشخيص الامراض باللغة العربية والصور

تشخيص بعض الامراض الشائعة

العدوى البكتيرية والفيروسية



مريض جاي بسخونية ووجع فى جسمه مع بعض الاعراض الاخرى زى كحة او اسهال او صديد فى البول

ممكن يكون معاها مشاكل وحساسية والتهاب بالجلد

يبقى دى عدوى بكتيرية او فيروسية وعلى حسب مكانها تكون الاعراض



الانفلونزا

مريض جاي برشح وسخونية ووجع بالجسم وممكن يبقى فى كحة



المغص الكلوى

وجع بالجانب بيسمع ورا او فى الاعضاء التناسلية وفى حرقان فى البول وممكن المريض يكون سخن او بيرجع و ممكن يكون بيتعالج من املاح قبل كده او حصوة



التهاب الزائدة

وجع بالجهة اليمنى يزيد مع الضغط عليه ومعه سخونية وبدا حول السرة وممكن ان يكون معه ترجيع



حموضة وقرحة المعدة

مريض عذبه وجع في صدره وبطنه ويحبه
حرقان وحموضة بتريد بعد الاكل او عند النوم
ويمكن يرجع



الضغط المرتفع

مريض عذبه صداع مستمر
عذبه زغلة بالعينين
حاسس انه داخ او مش مركز
عذبه اصوات غريبة وطين بودانه
لو قيسنا ضغطه كذا مرة تلقية على
الضغط الطبيعي 80/120 ويمكن يبقى
90/140 على



الضغط المنخفض

مريض بدوخ باستمرار ولا يستطيع القيام
الضغط نجده بمجهودات كبيرة وعند قياس
منخفض اقل من 60/90



مريض السكر

مريض يبعث كثير ويشرب كثير ويعمل حمام كثير
وريقه يينشف ويباكل كثير بس بيحس انه جعان
ولو قيسنا السكر بتاعه هنلقية على
اكثر من 125 وهو صايم
او اكثر من 200 وهو فاطر
ويمكن يجي بمشاكل جامدة زي غيبوبة بسبب زيادة او
نقص السكر او عدوى بكتيرية شديدة بالجروح والقدم
المكرو

نزيف الانف



مريض ينزف بشدة من أنفه
نقيس له الضغط
لو كان على ندى ادوية تقلل الضغط
لو كان قليل نعلق له محاليل
يميل المريض للامام مع اغلاق الانف
نضع ثلج ومياه بارده على الانف
نضع قطنه مضاف لها امبول ادرينالين على
الانف
لو لم يتم السيطرة على النزيف يستدعي
طبيب الانف والاذن



الذبحة الصدرية وجلطة القلب

مريض جاي الاستقبال او الصيدلية عنده وجع
في صدره بيسمع في ظهره وفي كتفه او ايده
الشمال يزيد مع المجهود
لما نعمل له رسم قلب هيحدد هو عنده ايه



الازمة الصدرية

مريض جاي الاستقبال مش قادر ياخذ
نفسه وصدره يزيزق و نفسه قصير
وسريع وعنده تاريخ مرضى ان هو عنده
حساسية على صدره ويباخذ بخاخة او اى
ادوية

Roshetatology



مريض الكلى

عنده مشاكل فى البول ممكن يكون قليل جدا
عنده تغيرات فى لون الجلد
ممكن يكون بيرجع وعنده انيميا
ممكن يكون عنده مياه وتورم حول عينه

مريض الكبد

هتلاقى بطنه كبيرة
(عنده استسقاء) ماء فى البطن
ممكن يجى بيرجع دم او عنده دم فى البراز
ممكن يكون فى غيبوبة او مش فى وعية الكامل
ممكن يكون عنده صفرا



مريض القلب

مريض كبير فى السن
يتعب مع اقل مجهود
وفى تورم ومياه فى رجله
ويجيله كرشة نفس و كحة خصوصا وهو نائم
وفى مشاكل فى رسم القلب



Roshetatologyالديدان

طفل ياكل كثير وجسمه رفيع مش بيكبر وبطنه بتوجعه
عطول و في مشاكل في البراز زي الاسهال وساعات دم
ومخاط

نعمله تحليل براز ونتأكد

الاميبا

مريض عنده مغص ببطنه ساعات بيجيله اسهال كثير
ممکن يكون معاه مخاط او دم وبعد كده ساعات تقلب
بامساك وبعدين اسهال
ممکن تبقى اميبا وساعات بتلخبطنا مع حاجات تانية
زي القولون العصبي

الحساسية وحساسية الدواء

واحد فجأة وقع من طوله و جلده ظهر فيه حساسية
حمراء وممكن يكون مش قادر ياخذ نفسه وعنده
ضيق تنفس شديد
لو كانت هذه الاعراض بعد اخذ دواء فالمريض ده
عنده حساسية للدواء

الصرع والتشنجات

مريض بييجي بتشنجات لا ارادية غالبا في الراس
وممكن يكون عنده تاريخ مرضي انها جت قبل كده




د/ احمد عبدالله



التسمم

مريض جاي بيرجع و عنده اسهال او جاي مقسى عليه او بيهلوس او داخل في غيبوبة نتيجة تسممه باى مادة زى اكل معين او شرب مادة سامة



الكسور

مريض مخطوط في احد اطرافه عمل حادثة او وقع عليها بتوجعه جدا مش عارف بحركتها ومش عارف يدوس عليها وهو محتاج بعمل اشعه عادية لتأكيد الكسر



وجع العضلات

مريض جاي عضلاته بتوجعه سواء رقبتة او كتفه ومش عارف بحركتها نتيجة انه شال حلة ثقيلة او اتحرك حركة غلط عملته وجع جامد بالعضلات



النزيف

مريض جاي بينزف من اى حنة في جسمه ويمكن يكون بينزف داخليا وده معرض انه يدخل في هبوط حاد في الدورة الدموية عشان كده لازم نعوض له الدم اللي فقده بالمحاليل والدم ونعالج سبب النزف فلو كان جرح نخيطة و نقفل اى سبب للنزيف



الغيبوبة

مريض جاي غايب عن الوعي وقلبه غير متوقف ممكن يحتاج جهاز تنفس صناعي او لا و يكون عنده سبب دخله في غيبوبة زي غيبوبة السكر و الكبد والجلطات و الحوادث وغيرها

- Place the victim in shock position
- Keep the person warm and comfortable
- Turn the victim's head to one side if neck injury is not suspected



الهبوط الحاد في الدورة الدموية

مريض ضغطه واطى ونبضه سريع وضعيف وجلده ساقع وشاحب وممكن يكون مغشى عليه السبب ممكن يكون نزيف او عدوى او حساسية او غيرها

توقف القلب

المريض قلبه متوقف لا نحس نبض ولا نسمع و التنفس متوقف نبدا في عمل انعاش للقلب
CPR





Investigations

التحاليل الطبية

التحاليل

التحاليل بتدينا فكرة عن بعض الامراض وبتحدد لينا طريق العلاج
التحاليل بتحدد اذا كان المريض ينفع نعمله عملية ولا لا
التحاليل بتتابع بيها علاج المريض هل المريض العلاج بيخليه يتحسن ولا لا

في حاجة اسمها صورة دم كاملة

CBC

بيكون فيها نسبة الهيموجلبين وبتحدد هل المريض عنده انيميا ولا لا
(لو اقل من 12 يبقى عنده انيميا) (طبيعى من 12-17)

بيكون فيها نسبة كرات الدم البيضاء و الطبيعى من (4-11 الف)
ودى بتزيد لو المريض عنده عدوى بكتيرية زيادة بسيطة وبتزيد جامد اكثر من
20000 لو المريض عنده سرطانات الدم .

بيكون فيها نسبة الصفائح ودى بتحدد اذا كان تجلط الدم كويس ولا لا
الطبيعى (150-400)الف
ولو قلت المريض مش ينفع يعمل عملية لانه هينزف

TEST NAME	PATIENT RESULT
HEMATOLOGY	
CBC	
SPECIMEN LAV COLLECTED 05/07/09 15:22	
WBC	4.4
RBC	4.58
Hemoglobin	14.0
Hematocrit	41.0
MCV	89.5
MCH	30.6
MCHC	34.1
RDW	13.4
Platelet Count	292
MPV	9.1

المريض ده عنده صورة الدم كويسة ولا يوجد بها مشاكل

في حاجة اسمها
تحليل سيولة الدم
coagulation profile
PT, PTT, INR

ودي حاجات بتحدد برده سيولة الدم قبل العمليات
لو زاد اى واحدة فيهم عن الطبيعي ده معناه سيولة في الدم
اهم واحد INR الطبيعي بتاعه 1
لو زاد عن 1.2 يبقى المريض ممكن ينزف وعنده سيولة في الدم
في كمان PT وده الطبيعي بتاعه من 12 الى 15
ولو زاد عن كده يبقى المريض عنده سيولة

Test	Result (reference range)
PT	18.3 sec (11.7-15.3)
INR	1.5 (0.8-1.2)
PTT	69 sec (22.7-35.6)

المريض ده عنده عوامل التجلط فيها مشكلة وعنده قابلية للنزف ولا يجوز ان
يدخل عمليات بدون تنظيم عوامل التجلط

في حاجة اسمها وظائف كلى

اهم حاجة فيها حاجة اسمها الكرياتينين واليوريا
لو زادتوا ده معناه ان كلية المريض فيها مشكلة والمريض ممكن يحتاج يفصل
كلى او يحتاج بعلاج المشكلة . والطبيعي بتاعهم هو
الكرياتينين من 1 الى 1.5
اليوريا (40)

Investigation	Result
Urea	68
Creatinine	2.4
Glucose/R	166

المريض ده عنده وظائف الكلى عالية عن الطبيعي

في حاجة اسمها وظائف كبد

ودى بتحدد هل الكبد سليم ولا لا
اهم حاجة فيها نسبة الالبومين الطبيعي بتاعه 3.5 لو قل عن 3 معناه ان
الكبد مش بيقوم بوظيفته كويس
وفي كمان انزيمات الكبد دى لو زادت عن الطبيعي (40) ده معناه ان الكبد فيه
مشكلة احتمال كبير يكون التهاب او فيروس الكبد
وفي كمان نسبة الصفرا ودى لو زادت عن (1) معناها ان المريض عنده
الصفرا بسبب مشكلة ما متعلقة بالكبد

Liver function tests:	
Total bilirubin	1.4
Total protein	9.0
Albumin	2.3
AST	59
ALP	116
ALT	25
AST=aspartate aminotransferase	
ALP=alkaline phosphatase	
ALT=alanine aminotransferase	

المريض يعاني من زيادة في نسبة الصفراء ونقص في كمية الالبومين و
زيادة في انزيمات الكبد نتيجة مرض يؤثر على وظائف الكبد

في تحليل السكر

لو المريض صايم يعنى مش اكل من 8 ساعات
السكر الطبيعي مش يزيد عن 125
لو المريض فاطر السكر الطبيعي مش يزيد عن 200
لو زاد عن كده يبقى عنده السكر وياخد علاج زى الحبوب والانسولين



المريض لديه نسبة السكر في الدم مضبوطة

Normal urine analysis, Urinary tract infection

تحليل البول

- **Volume (0.8-1.5 L/D)** -- ↓ in renal failure , obstruction
- **aspect (yellow clear)** — may change as red (blood) or brown (urobilinogen) or white urine (lymph)
- **Specific gravity (1015-1025)**
- **PH (5-7)** may become acidic or alkaline
- **protein < 150mg/dl** -- ↑ with proteinuria
- **RBCs (0-5/hpf)** — increase with bleeding
- **WBCs (0-10/hpf)** — if it ↑ it means urinary tract infection
- **Few hyaline casts, oxalate crystals. No sugar , no ova**

اهم حاجة بنشوفها هي نسبة الصديد (wbc or pus cells)

Normal it is < 10

if > 10 mean urinary tract infection

if > 100 it need culture , sensitivity (مزرعة بول)

- نشوف كمان نسبة كرات الدم ولو زادت عن 5 ده معناه ان في دم في البول
- نشوف كمان نسبة اليورات في البول ولو لقيناها زائدة ده معناه املاح بالبول بس في معظم تحاليل البول بتطلع موجبة فبنأكد من تشخيصنا بالاشعة التلفزيونية
- ممكن نلاقى سكر في البول وده بيحصل مع مريض السكر
- ممكن نلاقى بروتينات زائدة في البول وده معناه مشكلة في الكلية يصاحبها خروج البروتينات في البول

Urinalysis

Specimen	Current Cystocentesis
Color	Yellow
Appearance	Cloudy
Specific gravity	1.027
pH	6.0
Protein	4+
Glucose	Negative
Ketones	Negative
Bilirubin	2+
Blood	2+
Urobilinogen	0.2
WBCs/hpf	3-4
RBCs/hpf	2-3
Bacteria	Trace
Epithelial cells/hpf	0-2
Granular casts	Many
Waxy casts	0-2
Fat globules	Moderate

المريض لديه تحليل بول طبيعي

النقرس: gout

- ↑ uric acid > 7 mg/dl (n = 3-7 mg/dl) in blood

Albumin	3.2 - 5 g/dl
Alkaline phosphatase	(Adults: 25-60): 33 - 131 IU/L Adults > 61 y: 51 - 153 IU/L
Adults > 61 yo:	51 - 153 IU/L
Ammonia	20 - 70 mcg/dl
Bilirubin, direct	0 - 0.3 mg/dl
Bilirubin, total	0.1 - 1.2 mg/dl

Complete blood count (CBC) Adults

	Male	Female
Hemoglobin (g/dl)	13.5 - 16.5	12.0 - 15.0
Hematocrit (%)	41 - 50	36 - 44
RBC's (x 10 ⁶ /ml)	4.5 - 5.5	4.0 - 4.9
RDW (RBC distribution width)	< 14.5	
MCV	80 - 100	
MCH	26 - 34	
MCHC %	31 - 37	
Platelet count	100,000 to 450,000	

Blood Gases

	Arterial
Ph	7.35 - 7.45
Pco ₂	35 - 45
Po ₂	70 - 100
HCO ₃	19 - 25
O ₂ Sat %	4
BUN	7 - 20 mg/dl
Calcium, ionized	2.24 - 2.46 meq/L
Chloride	95 - 107 meq/L
Magnesium	1.6 - 2.4 meq/L
Phosphate	2.5 - 4.5 mg/dl
Potassium	3.5 - 5.2 meq/L
Sodium	135 - 147 meq/L

Ferritin (ng/ml)	13 - 300
Folate (ng/dl)	3.6 - 20
Glucose, fasting (mg/dl)	60 - 110
Glucose (2 hours postprandial) (mg/dl)	Up to 140
Hemoglobin a _{1c}	6 - 8

Iron (mcg/dl)	65 - 150
Lactic acid (meq/L)	0.7 - 2.1
LDH (lactic dehydrogenase)	56 - 194 IU/L

Lipoproteins and triglycerides

Cholesterol, total	< 200 mg/dl
HDL cholesterol	30 - 70 mg/dl
LDL cholesterol	65 - 180 mg/dl
Triglycerides	45 - 155 mg/dl (< 160)

Osmolality	289 - 308 mosm/kg
SGOT (AST)	< 35 IU/L (20-48)
SGPT (ALT)	< 35 IU/L

Thyroid Function tests

Free T3	2.3-4.2 pg/ml
Serum T3	70-200 ng/dl
Free T4	0.5-2.1 ng/dl
Serum T4	4.0-12.0 mcg/dl
TSH	0.25-4.30 microunits/ml
Total iron binding capacity (TIBC)	250 - 420 mcg/dl
Transferrin	> 200 mg/dl
Uric acid (male)	2.0 - 8.0 mg/dl
(female)	2.0 - 7.5 mg/dl

WBC + differential	
WBC (cells/ml)	4,500 - 10,000
Segmented neutrophils	54 - 62%
Band forms	3 - 5% (above 8% indicates left shift)
Basophils	0 - 1 (0 - 0.75%)
Eosinophils	0 - 3 (1 - 3%)
Lymphocytes	24 - 44 (25 - 33%)
Monocytes	3 - 6 (3 - 7%)

المزرعة Culture

مزرعة الدم :

أخذ عينة من الدم والبحث فيها عن البكتيريا وإى من المضادات الحيوية يمكن أن يقتلها

مزرعة البول أو الصديد أو البلغم:

هو أخذ عينة من البول أو الصديد أو البلغم ومعرفة البكتيريا الموجودة بها وإى من المضادات الحيوية يمكن أن يقضى عليها وإى منها يكون البكتيريا مقاوم لها ولا يتأثر بها

Urine culture

Organism is :

Sensitive to : ciprofloxacin , tinam

Resistant to : penicilin , ceftriaxone,

فى هذه المزرعة البكتيريا تستجيب لنوعين من المضادات الحيوية

ciprofloxacin , tinam

وبالتالى يمكن استخدامهم فى علاج هذا المريض

normal stool report

تحليل البراز

Test

Normal

Physical examination

Color	Brown
Odour	Offensive
Reaction	Variable
Consistency	Formed
Mucus	Absent
Appearance Pus	Absent
Blood Gross	Absent
Parasite (naked eye)	Absent

Microscopic examination

Pus cells	0 - 5 / HPF
Rbcs	0 - 3 / HPF
Epithelial cells	Absent
State of digestion	
Starch granules	+
Fat globules	+
Vegetable cells	+
Muscle fibers	+

Parasites

Protozoa: Vegetative	Absent
Cysts	Absent
Helminthes : Larvae	Absent
: Ova	Absent

اهم حاجة نشوفها فى تحليل البراز هي:

- وجود بيض لاي دودة او السيست والتروفوزويت لاي بروتوزوا زي :

protozoa like : entamoeba histolytica, gardia

worms like: oxyrius (entrobius), ascaris

- لو نسبة الصديد زائدة عن الطبيعى ده معناه عدوى

- لو نسبة كرات الدم زائدة عن الطبيعى ده معناه ان فى مصدر للنزيف

- لو نسبة الدهون زائدة ده معناه ان فى سوء فى الامتصاص

في تحليل غازات بالدم الشرياني
(arterial blood gases) ABG

كيف نقرأ

Normal ABG report

$\text{HCO}_3^- = 22-26$	$\text{Na}^+ = 135-145$	$\text{CO}_2 = 22$
$\text{Paco}_2 = 40$	$\text{Cl}^- = 100$	$\text{Per} = 1.0$
$\text{PaO}_2 = 95$	$\text{BUN} = 20$	$\text{Ca} = 9-11$
$\text{Ph} = 7.35-7.45$	$\text{Glucose} = 150$	$\text{Mg}^{2+} = 2.0$
	$\text{K}^+ = 3.5-5$	

- If PH is less than 7.3 → acidosis. Dialysis is needed
- If $\text{O}_2 \downarrow$ or $\text{CO}_2 \uparrow$ → ventilation problem , may be –
Respiratory failure
- If $\text{HCO}_3 \downarrow$ with acidosis → metabolic acidosis
- If $\text{K} \downarrow$ than 3 → hypokalemia
- If $\text{K} \uparrow$ than 5 → hyperkalemia
- If $\text{Na} \downarrow$ than 130 → hyponatremia
- If $\text{Na} \uparrow$ than 145 → hypernatremia
- If $\text{Ca} \downarrow$ than 9 → hypocalcemia(tetany)
- If $\text{Ca} \uparrow$ than 11 → hypercalcaemia

Routine investigations before operations:

التحاليل المستخدمة قبل العمليات

- Complete blood count (CBC) صورة دم كاملة
- PT, PTT, INR تحاليل سيولة الدم
- liver function tests وظائف كبد
- renal function tests وظائف كلي
- random blood sugar سكر عشوائي بالدم
- urine analysis تحليل بول
- ECG رسم قلب كهربى
- ABG غازات بالدم الشرياني
- virus markers دلالات فيروسية
- Special tests, radiology according to operations تحاليل واشعات اخرى حسب العملي

Specimen characters:

take it after 3-5 days abstinence (no intercourse),
better by masturbation or coitus interruptus

Items	Normal values
Volume	2-6 ml
PH	7-7.8 (alkaline). May become acidic with infections
Odour	Characteristic (similar to chestnut blossom)
Color	Grey- white- colour may change with infections
Consistency	Viscous
Cells	Pus cells: 0-5 / HPF, ↑ with infections rbcs normally absent, ↑ with haemorrhage
Count	≥ 15 million / ml ↓ number may lead to infertility
Motility	1 st hour 80 %, 2 nd 70%, 3 rd 60% Very active: 50%, moderately active: 20%, non motile: 30% ↓ motility or activity lead to infertility
Morphology	Normal morphology > 60 % ↑ abnormal shape leads to infertility
Fructose	More than 1200 mc ↓ fructose leads to infertility (sterility)
Abnormality	<u>Azo-spermia</u> : absence of sperms in ejaculate <u>A-spermia</u> : absence of ejaculate due to retrograde ejaculation <u>Necro-spermia</u> : normal sperm count but all are dead



Medical skills

المهارات الطبية


ازای نقیس الضغط

- يتم ربط الحزام على اليد (فوق المرفق) بشكل جيد ثم يتم الحزام على اليد مانعا مرور الدم في تعينته بالهواء فيضغط الشريان على الشريان للجزء المنبقي من اليد و هنا سطح الحزام بمقدار الضغط المتولد فيه من جراء دفع القلب للدم وبذلك يمكن قياس التغير في ضغط الهواء داخل الكيس الشريان حسب تغير الضغط داخل

- بعد ربط الحزام يتم وضع السماعة على سطح اليد فوق الشريان و يتم نفخ الحزام يتوقف الدم من الجريان و هنا لا يسمع للدم اي صوت في السماعة

تفريغ الحزام من الهواء بالتدريج و بمجرد بدا الدم في - يتم صوته في السماعة في حينها يتم الجريان سيتمكن سماع قرائه قراءه الضغط على جهاز القياس و يكون هذا اعلى للضغط او الضغط العالي او ما يسمى ضغط الانقباض في تفريغ الحزام تدريجا و سينخفض صوت - يتم الاستمرار الوصول الى مرحلة جريان الدم كذلك في السماعة حتى يتم يختفي فيها صوت جريان الدم في السماعة حينها يتم قراءه الضغط في جهاز القياس و سيكون هذا الضغط المنخفض او ما يسمى الضغط الانبساطي

الضغط الطبيعي يكون 80/120 الى 90/140



ازای تقييس السكر بالدم



بواسطة قطرة صغيرة من الدم، والتي
تم الحصول عليها عن طريق وخز الجلد
مع مضرب يتم وضعها على الشريط
الفاعل للاختبار، ويقرأ عداد الجهاز
مستوى السكر في الدم

السكر الطبيعي لا يزيد عن 200
والمرضى قاطر

السكر الطبيعي لا يزيد عن 125
والمرضى صائم

ازای تركيب قسطرة

- توصيل القسطرة بكيس جمع البول ويكون الكيس مغلق ومعقم
- يوضع جل معقم حوالي 3 مم لتسهيل عملية تركيب القسطرة.
- ادخل القسطرة البولية برفق بالأسلوب الطبي المتعارف عليه مع

- مراعاة استخدام أسلوب عدم اللمس بحيث لا يتم لمس
القسطرة بيد الأخرى المستخدمة في إظهار مكان الدخول ولا
يتم لمس أي شيء غير معقم باليد المستخدمة في إدخال
القسطرة.

- ملء بالون القسطرة بكمية من الماء المعقم الموصى به من
الشركة المصنعة للقسطرة او بمحلول ملح.


- يتم تثبيت القسطرة بفخذ المريض بلاصق طبي مع كتابة التاريخ
على القسطرة

- تثبيت كيس جمع البول تحت مستوى السرير لمنع ارتجاع البول




ازای ترکیب انبوبة معدية

- اطلی الانبوبة بالجل ونفیس طول الانبوبة من الالف للمعدة
- ثم تبدأ بادخال الانبوبة عن طريق الالف الى المعدة بحرص ونطلب من المريض ان يقوم بعملية البلع لكي يسهل ادخال الانبوبة الى المعدة
- ثم نتأكد من وجود الانبوبة في المعدة بادخال هواء من الانبوبة ب-سرنجة 50 سم وسماع صوت الهواء بواسطة السماعة على المعدة



ازای تعمل اختبار حمل

- نأخذ عينة من البول ونضع بها شريط كشف الحمل لمدة 5 دقائق
- إذا ظهر خط احمر واحد كما بالرسم فالاختبار صحيح ولا يوجد حمل
- إذا ظهر خطين احمر كما بالرسم فالاختبار صحيح ويوجد حمل ويتم التأكد من ذلك بعمل اختبار لنسبة هرمون الحمل بالدم
- إذا لم يظهر خطوط حمراء فالاختبار خاطيء ويجب اعادته بشريط آخر




طرق الحقن المختلفة

INTRAMUSCULAR INJECTIONS (IM)

الحقن العضلي

Instructions


احقن في الربع الاعلى الخارجى من العضلة عموديا وادخل السرنجة حتى نهايتها حتى تتأكد أنك دخلت العضلة واحقن واخرج عموديا



الحقن يكون في:

الجليوتيمس ماسل او الدلتويد ماسل

Gluteus or deltoid muscle



Subcutaneous injection(SC)

الحقن تحت الجلد

ارفع قطعة من الجلد واحقن الدواء بطرف السرنجة تحت الجلد دون تعمي



Intravenous injection (IV)

الحقن الوريدي


اغلق يد المريض بحزام رابط او بقبضة اليد ليتجمع
الدم في الاوردة واجعله يفتح ويغلق قبضته ثم ابحث
عن الوريد ويتم ذلك بالنظر واحساس الوريد تحت
الاصبع في الاماكن المعروفة للحقن . اعتمد على
احساس الوريد افضل من رؤيته وان لم تجد في اليد
الذراع الايمن ابحث في الذراع الايسر وعندما تدخل
المبرجة اسحب دم للتأكد انك داخل الوريد ثم فك
الرابط واحقن الدواء



ازای تفتح دمل او خراج

في اكثر منطقة يتجمع فيها الصديد نقطع بالمشرط 1-2 سم
ونبدأ نعصر الجرح حتى نفضيه من الصديد ثم ندخل بالارتری
مقفول ونفتحه (طريقة هيلتون) حتى نوسع الفتحة ونخلص
من الصديد ثم نضع ماء اكسجين وبيتادين لتطهير الجرح ونضع
قطعة من الشاش داخل الجرح لازالة اي صديد حديد متكون
ونغطي الجرح ونعطى مضاد حيوى ومسكن قوى

EXPLORING AN ABSCESS



Sampling for arterial blood gas analysis of ABG sample

قياس الغازات بالدم الشرياني

عمر أخذ عينة دم من الشريان وفحصها بجهاز خاص لمعرفة نسبة الأكسجين وبعض
الأملاح بالدم وذلك يفيد في تشخيص بعض الأمراض

Radial artery puncture:

ابحث عن نبض الشريان في الهة الخارجية من مفصل اليد
وحسه ثم ادخل بالسرنجة بزاوية 45 درجة و اسحب
السرنجة للخارج مع سحب الدم وغير اتجاه السن بالداخل
حتى تجد الشريان وتسحب الدم من الشريان ثم اخرج
بالسرنجة بعد سحب عينة كافية (2 سم على الأقل) وامسح
الدم من الجرح بقطنة معقمة




Brachial artery puncture:

ابحث عن نبض الشريان في الجهة الداخلية من تيندون
عضلة البيسبس كما موضح بالرسم ثم تدخل عموديا و
اسحب السرنجة للخارج مع سحب الدم وغير اتجاه السن
بالداخل حتى تجد الشريان وتسحب الدم من الشريان ثم
اخرج بالسرنجة بعد سحب عينة كافية (2 سم على الأقل)
وامسح الدم من الجرح بقطنة معقمة



Femoral artery puncture:

ابحث عن نبض الشريان 2 سم اسفل الانجوينال ليجامينت كما موضح
بالرسم ثم تدخل بزاوية 45 درجة و اسحب السرنجة للخارج مع سحب
الدم وغير اتجاه السن بالداخل حتى تجد الشريان وتسحب الدم من الشريان
ثم اخرج بالسرنجة بعد سحب عينة كافية (2 سم على الأقل) وامسح الدم من
الجرح بقطنة معقمة



ازای تعمل اختبار الحساسية قبل إعطاء الحقن:

نحضر المكان المراد الحقن فيه.

نضع علامة حول منطقة الجلد المراد عمل الاختبار فيها.
نقوم بسحب 0.05 مل من المادة المراد الاختبار فيها.
حقن الأبره في منطقة الجلد بزاوية من 10-15 درجة مائلة
للأعلى مع شد الجلد بأحكام وإدخال كامل سن الأبره في
طبقات الجلد مع ملاحظة بروز فقاعه في الجلد بحجم 2مل
أثناء الحقن.

تجفيف منطقة الاختبار بمنديل

التنبیه على المريض بالانتظار لمدة 15 دقيقه
متابعة المريض لملاحظة ظهور أي علامة من علامات
الحساسية مثل: الحكة، الاحمرار
بعد 15 دقيقه يقاس مدى الانتفاخ
فإذا كان لديه حساسيه لدواء لا ياخذ الدواء
إذا لم يكن لديه أي حساسيه يتم إعطاءه الدواء

اختبار الحساسية بالجلد

نتيجة سلبية



نتيجة إيجابية



حساسة
Sensitivity



الخيوط الجراحية



وظيفة الخيطان هي تقريب الأنسجة من بعضها البعض ريثما تبدأ عملية الالتئام الطبيعية للجرح، وتختلف الخيوط الجراحية اختلافا واسعا جدا من حيث الخصائص المختلفة، فكل نوع يمكن تقسيمه الى طبيعي Natural وصنعي synthetic، ممتصة يعني تزول مع مرور الوقت dissolving وabsorbable غير ممتصة nonabsorbable تبقى

دائمة، premanent، وحيدة monofilaments أو عديدة الغزلة muttifilaments، وكل الخيوط تعد دون استثناء أجسام أجنبية.

- ان قياس الخيطان size يشار له بالأرقام صفر zero وكلما زاد عدد الأصفر كلما كان القياس أصغر حيث ان القياس 5-0 مثلا أصغر من القياس 3-0، وطبعاً مع زيادة القياس تزداد قوة الخيط.

ان متانة الخيط tensile strength يجب الا تكون أقوى من النسيج الذي يخاط بها، وأن أصغر قياس للخيط يحقق تقارب الأنسجة من بعضها البعض يجب ان يستخدم لأنه يقلل من الارتكاس النسيجي ويؤدي لاندمال أفضل للجرح.

ان الأنسجة المكونة بشكل أساسي من الكولاجين مثل الجلد والسفاق والأوتار هي الأنسجة الأقوى ولكنها تستعيد متانتها وقوتها ببطء لذلك من الأفضل استخدام قطب دائمة أو بطيئة الامتصاص عند خياطتها، من جهة أخرى الخيطان الممتصة يمكن استخدامها مثلا في أنسجة كالمعدة والأمعاء والمثانة بحيث أنها أنسجة تتدمل بسرعة.

- أما مثلا عند تثبيت مواد صناعية كالدسائم القلبية الصناعية والطعوم الوعائية والرقع الصناعية يجب استخدام خيوط غير ممتصة التي تحافظ على متانتها طول حياة المريض.

الكات جت :cavgut

منتج طبيعي من أمعاء الخراف والأبقار ، يمتص ، متلفته تستمر ل 4-5 أيام وتزول تماماً بعد 2 أسبوع ، إلا أن النوع كروميك منع يبقى متيناً ل 2-3 أسابيع له شكلان paain, chronic تسبب ارتكاس متوسط لعالى ، التعامل معها جيد نوعاً ما . تستخدم لربط الأوعية الصغيرة السطحية ولاغلاق الأنسجة البشروية التي يصعب فك القطب فيها مثل اغلاق مخاطية الفم و اللسان . تستخدم منذ زمن طويل جداً إلا أن استخدامها الآن قل جداً لضعف متانتها والارتكاس النسجي الزائد الذي تسببه .

الديكسون : :Dexon

خيوط ممتص وأول الأنواع الصناعية وجوداً ، يمتص بشكل تام بعد 90-120 يوم والارتكاس النسجي له قليل وهو خيط قوي ومتين والتعامل معه سهل لمتوسط .

الفيكريل : :Vicryl

ثاني الأنواع الصناعية وجوداً وهو مغلف بمادة مزلفة والتعامل معه سهل والربط به أهون ، امتصاصه التام يحدث بعد 60-90 يوم وبالرغم من متلفته الجيدة إلا أن مرونته قليلة ، مفيد جداً بالخيطة تحت الأدمة .

بولي ديوكسانون : :PDS

أمتن من النوعين السابقين ، الامتصاص التام له بعد 180 يوم لذلك هو مفيد بالحالات التي تحتاج الى دعم الجرح لفترات طويلة . التعامل معه أصعب بسبب صلابته وذاكرته الطويلة وغلام .

الماكسون : :Maxon

من الخيوط التركيبية الصناعية الجديدة ، يدعم الجرح لفترات طويلة ، متين وقوي والتعامل معه سهل وهو الخيار الأول بالنسبة للخيوط الممتصة .

المونوكريل : :Monocryl

له صفات عالية من المرونة والتعامل السهل معه وهو خامل ضمن الأنسجة ويمتص بشكل كامل بعد 90-120 يوم . خيار جيد للاغلاق تحت الجلد .

الخيوط غير الممتصة:**الحرير : : silk**

يتم الحصول عليه من فتائل بروتينية طبيعية ناجمة عن دودة الحرير , silkworm larva هو أسهل الخيوط من حيث التعامل معه ولكنه الأضعف من حيث متانة الشد ويسبب ارتكاس نسجي أكثر من غيره باستثناء الكات جت.
يجب تجنب استخدامه بالطرق الصفراوية والبولية لأنه قد يكون بؤرة مرضية لتشكل الحصيات.

النايلون : : nylon

شائع بسبب خواصه المتينة والارتكاس النسجي القليل له ولكن ذاكرته جيدة.

البولي بروبيلين : : poly propylene

أكثر الخيوط خمولا ضمن الأنسجة فلا يحدث ارتكاس نسجي وناعم.

البوليستر المجدول : : braided polyesters

تصنع بطريقة البلمرة وهي الأمتن وسهل التعامل معه.

البولي بتستر (النوفافيل) : : novafil

الأحدث وأقوى و أصلب من ما سبقه ومرن بشكل عجيب وسعره مماثل للبرولين.

الخرزات : Staples

شائعة الاستخدام لاغلاق الجلد وهي أسرع تطبيقا مما يؤدي لتقصير زمن العمل الجراحي وتسبب رض نسجي أقل والتعامل سهل معها ومفيدة بمناطق كفروة الرأس ولكن تكلفتها أكبر

رأس الابرة قد يكون قاطع أو مدور


الابر ذات الرأس المدور tapered point needles تستخدم في الأنسجة سهلة الاختراق مثل الأمعاء والبيروتوان و الأحشاء البطنية والعضلات و النسيج تحت الجلد وهي تنقب و تبعد بدلا من أن تقطع الأنسجة.

الابر ذات الرأس القاطع cutting edge needles تستخدم بالأنسجة الأكثر قساوة مثل الجلد والصلبة و سمحاق العظم و سمحاق الغضروف ، وأكثرها استخداما النوع القاطع العكسي ويبدو مقطع هذه الابرة بشكل مثلث مقلوب.

الابر القاطعة العكسية reverse cutting edge needles هي الأفضل لخياطة تحت الجلد.

الابر الكليية blunt point تستخدم لخياطة الكبد والأنسجة الرخوة الهشة كالطحال والكليية.


أنواع الغرز المستخدمة في جراحة




(1) الغرز المتقطعة العادية : plain interrupted
وتكون كل غرز لها عقدة خاصة بمفردها وتكون جميع العقد في ناحية واحدة.




(2) غرز المراتبة المتقطعة : Matress interrupted
هي غرز متقطعة وكل غرز لها عقدة خاصة بمفردها وجميع العقد في ناحية واحدة إلا أن منتصف الغرز معلقة تحت الجلد أسفل الجرح وليس فوق سطحه وبطريقة عرضية.




(3) الغرز المتصلة العادية : plain continuous
وتكون جميع الغرز متصلة مع بعضها البعض ولها جميعاً عقدتين فقط الأولى في بداية الجرح علوية والثانية في نهاية الجرح سفلية.




(4) غرز المراتبة المتصلة : Matress continuous
هي غرز متصلة تشبه طريقة غرز المراتبة المتقطعة إلا أنها مثبتة بعقدتين فقط علوية وسفلية.



(5) غرز البطانية المتصلة : Blanket continuous
هي غرز متصلة ولها عقدتين فقط الأولى في بداية الجرح والثانية في نهاية متجهتين إلى إحدى نواحي الجرح إلا أن كل عقدة ملفوفة على ماقبلها مكونة تشكيلة تشبه طرف البطانية وذلك لتثبيتها بشكل.



(6) غرزة التجميل : Subcuticular
غرزة بها عقدة في أول الغرزة ثم يتم التخطيط في الطبقة الجلدية كما بالشكل وفي آخر الغرزة يوجد عقدة أخرى والهدف منها التجميل وعدم اظهار مكان الغرز.



(7) الغرزة الثمانية : figure of eight suture
غرزة تدخل من الجرح من جهة وتخرج من الجهة الأخرى ثم تدخل من الجهة الأولى مرة ثانية وتخرج من الجهة الأخرى وتعقدها على شكل 8 وهدفها أنها قوية وتمنع تسرب الماء.



Dermatology prescriptions

روشتات الجلدية

(تشخيص وعلاج الامراض الجلدية)

Dr / Ahmed Abd Allah

(Introduction)

مقدمة

هذه هي التسمية بتسمية تعريفات بسيطة وأشكال الحاجات التي تشوغلها في الجلد عندها تبقى فاضحة

يتميز بقية الحاجات التي يتجلى في الجلد لنوعين نوع من سببها يعني لو شغفه اعرف ان في مشكله رافعي هي اية ففدش احدد نوع المرض الا بتربيههم ومشكلهم لحد ما

وفقا

دا عبارة عن لطفه زي مايقولوا مجرد تغير في لون الجلد وتبقى مشهوره اقل من 5
للي قطر وكمان محدده الاطراف

Macule *

وتغير اللون بقه والتغير زاد غمق يعني او فتح او حتى غميش لون فالجلد خالص زي
البهاق كده

Circumscribed *

لطفه كبيره هي عبارة عن كذا هاتكول جنب يعني بتعدي الخمسة هلي
قطر ومشكلها بيبقى فلان بقه ليها بوز مدوره فيها سره كده يعني

Patch *

هنا بقه بتعدي المشاكل اللي بتبقى مرتفعه عن الجلد هي مجرد تغير لون بتبقى
كمان اكر من خمسة هلي وترتفع عن سطح الجلد شويه ومرضه محدده الاطراف
وهي بتفرقها اوي عن ال

Popule *

الفارق من ضخم وفي ناس بتعتبرهم واحد

Nodule *

هو تكون بابول وودبولز مع يعني ويعدي ال2 سم

Plaque *

دي بقه بتبقى مرتفعه عن الجلد زي اختوانها بس جواها سائل بيبقى blood or
serous fluid

Vesicles *

زي اختها الفيزيل بس بيبقى هليانه صديد

Postule *

Pus *

النوع الثاني بقه حاجات سببها لما تشوغلها نقول اه دا مرض كذا علي طول

Comedone * ودا خاصه بمرض acne vulgaris حب الشباب يعني وبيسببها في

الاعلانات الزواروس السوداء مشكله نوراك هانا لقيها الحلي في كريب بس هي من راس
سواء لانها توهين

black head (open comedone) *

white head (closed comedone) *

ولما في كل مرض هوريككم هو الحاجات دي كلها

wheel * ودي خاصه بمرض الارثريكانا urticarial هي شبه الدوايه حمرها بياض فالجلد وتختلي

الانسان قاور بمرض الورثري

➤ **burrow or tunnel**: وهي خاصة بفرض scabies ومعروف الناس التي خدت بارا انني الاسكابس بتفقد تحفر وحاجه جميله خالص ونبان مرتفعه عن الجلد و itchy تخليك عاقر تهersh

➤ **scaulum or sulphur cup**: دي خاصه بفرض farvus وهي بتبقى عباره عن yellowish crusts يعني حاجات بتشف على الشعر احم احم مش عاقر اقول زي ايه المهم انها حاجه جميله اوي

➤ **iris pattern or target lesion**: اليرس دا جزء من العين وه واللى بيدى العين اللون المميز اخضر عسلى فخلقى برنجاري الالوان المشهوره دي وهو شبه التارجيت بتاغ النشان الدوائر اللي جوه بعضها ودا مميز لفرض erythema multiform الازتيها اللي هي الاحمرار اللي بيبقى ضخام اوي احمرار بس بس بياخد توزيعات مختلفه في الشكل فسميهاه فلتى فورم

➤ **herald patch**: ودا خاصه بفرض pityriasis rosea ويسمونها ساعات mother patch المرض بيتطلق تيرازر روزيا البى سابلات وروزيا عشان بيتقى في بقع pink روز يعني بهي شمس كير لكن بتشخص ان في بقعه فيهم هي الكبيره المشخصه يعني

في طبعا حاجات سكيناري لها الليجين الاولاني يحصل عليه عدي تانيه شقولهم في وقتهم



Histology of skin



Macule



Papule



nodule



plaque



vesicle



pustule



wheal



bulla



burrow



scales



crust



ulcer



fissure



scar




Lichenification



impetigo contagiosa

علاج الامراض الجلدية

Viral skin infections



أولاً ال herpes simplex

وده يبقى على شكل شوية vesicles حوالين الفم أو على اللسان ... بس لو جه العيان متأخر هيبقى شكلها متغير عشان 2ry bacterial infection فينعرف من المكان وينسأل دايماً على آخر حاجة طلعتاه

ثانياً ال herpes zoster

أول attack يعمل chicken pox و ثاني attack يعمل H. zoster

Chicken pox:

اللى هو يتشخص ازاى؟؟

✓ بالسن ... غالباً child

✓ بال general manifestation ويبقى معاه mild sore throat

✓ بأنه pleomorphic and centripetal

2nd attack..... Herpes zoster

سموه حزام لأنه واخد توزيع nerve وغالباً بيكون unilateral ويكون طبعا على شكل vesicles سموه نارى لأن يبقى فيه severe pain وده بسبب ال edema حوالين ال nerve وينحاول على قد ما نقدر منخليهاش fibrosis حوالين ال nerve



لازم نهتم جدا بعلاج ال herpes لأنه لا قدر الله ممكن يقلب ويعمل :

Encephalitis, keratoconjunctivitis, pneumonia, genital & neonatal in genital type

الروشتات

Herpes simplex & chicken pox

R/ K Permanganate 1/8000

2 معلقة على 1/2 كوب ماء وعمل كمادات 2 الى 3 مرات يوميا المرة 10 دقائق

R/ fucidin cream

مرتين يوميا بعد الكمادات ب 10 دقائق

R/ hibiatic suspension 600 N

معلقة كل 8 ساعات ولو كبير يبقى hibiatic 500 صباحه كل 8 ساعات

R/ fenestil syrup

معلقة صباحا ومساء لو فيه لهرش

- لو فيه oral lesion نزود oracure gel 5 مرات يوميا لمدة 3 ايام
- لو ال vesicles بتكرر على طول ندي oral antiviral زي zivorax syp
- حالات ال chicken pox ممنوع التعرض للحوامل و الأطفال لحد ما ال crust تقع لأنه بيتقل بالنفس واللحس

Herpes zoster

R/ K Permanganate 1/8000

2 معلقة على 1/2 كوب ماء وعمل كمادات 2 الى 3 مرات يوميا المرة 10 دقائق

R/ acyclovir 400

قرص 5 مرات يوميا لمدة 10 ايام

R/ acyclovir cream

مرتين يوميا مع الجزء المصاب بقرص

R/ hibiatic 500 tab

كل 12 ساعة لمدة 7 ايام

R/ Brufen tab

قرص 3 مرات يوميا

R/ gapaten

قرص مساء


R/ depovit ampule

3 حقن عضل حقه يوم بعد يوم

علاج حمى لاد vesicles

- ◆ Vesicle ... drying agent
- ◆ Crust ... manual removal
- ◆ Itching ... antihistaminic and soothing agent
- ◆ Dry bacterial infection ... local and systemic antibiotic

Verruca



أولاً ال Vulgaris

Raised roughened surface... most common on hands

ودي علاجها الكي

ثانياً ال Plantaris

Hard, painful, with multiple black dots in the center, most common in pressure points on the sole

وهي كمان يتم عملها cautery بس لو كبيره شويه بنحاول نصفر حجمها عشان الجزء اللي هيتشال ميقاش كبير عشان العيان ميتعيش اودي لما اشيله ويقدر يعيش

R/ lactic acid & salicylic acid patch

توضع على عين الممكفلمدة يومين ويتم تغييرها وتكرر لمدة شهر وبعد كده حتى اعمله cauterization

ثالثاً ال verruca plana

Smooth, flat, can occur in large number most common in face, hand & wrist
كي السطح بحذر لانه في الوش غالباً وبعد الكي

R/ immulcan syrp

ملعقة كبيره يومياً

R/ Baclopan cream

مضاد حيوي مرتين يومياً

ملصوقة:

..في دكاترة رأيهم إنه ممكن ندي retin A يعمل peeling بدل ال cautery في الوش
وفي دكاترة بتقول منديش أك حاجة خالص وكده كده مبروح لو حده بس المشكلة الأم متعلق لأن هيريد
..المرض بيتقل باللمس .. عشان كدة لازم نلبس جواتي عند الشخص ولتبه على المريض ممنوع يلمس
السلط عشان مينقلوش من مكان ل مكان.

Molluscum contagiosum

بيتشخص بحاجة مميزه أوي:

✓ إنه umbilicated center

✓ إنه pearly white

✓ لو ضغطت عليه هيطلع infectious cheesy material

العلاج:

Expression & application of phenol

لازم نبص على أول lesion طع لأن ده ال primary lesion
لأنه بيكون لسه شكله متغيرش بسبب الهرش وال 2ry bact infection
وال topical medication خاصة الكورتيزونات بتغير شكل ال lesion

معلومة ع السريع

Herps Simplex

(الحيوب اللي بتظهر حوالين الشفايف بعد دور البرد)

- ❖ دي viral infection وهتروح لوحدها ...
- ❖ الخوف من يحصل عليها 2ry bacterial infection
- ❖ طب إزاي أفرق بينه وبين الـ Impetigo ؟؟؟؟
- من خلال الـ History وشكل الحيوب ...

Impetigo	Herpes
- حبابية وهرش فيها قشرت	- بتظهر بعد دور برد
- بيتقي فيها pus & crusts	- مجموعة vesicles صغيرة فيها clear fluid
- بيتقى بعد شوية أو في أي مكان	- بيتقى ع الـ muco-cutaneous junction



❖ والعلاج ؟؟؟

• قبل ما vesicles تظهر ...

- Acyclovir 5% Cream (4 LE)

- بدهن ٥ مرات في اليوم (كل ما بتوضي)

- وهو العيان هليعرف إزاي قبل ما الـ vesicles تظهر ؟؟


- العيدين اللي متعودين تظهر لهم الـ vesicles دي بعد دور البرد بيحسو بحرقة في مكانها قبل ما تظهر

• بعد ما vesicles تظهر ...

- Lidocaine gel (3 LE) (Topical Anesthetic)

- Systemic & Topical Antibiotic

(عشان مش تحصل 2ry bacterial infection)



Chicken Pox الجديري المائي

(Vesicles on Erythematous Base)

polymorphic .. يعني شوية vesicles على شوية bullae يبقى

ويمكن يبقى فيه pustules كمان

يبدأ ف الـ face, neck, trunk (Central Distribution) ... وبمعنى منتشر للأطراف

(عكس الـ papular urticaria التي تبدأ ف الأطراف)

العدوى تبقى عن طريق التنفس (عشان كده طفل واحد ممكن يعدي المصابة كلها)

(مرض جلدي تنتقل العدوى فيه عن طريق التنفس)

صعب يحي ف الكبار (المناعة بتكون عالية) لكن ممكن ينمو لو المناعة قلت

عدوى فيروسية ضعيفة ... لو سببها أسبوع من غير ما آجي نلعبها هاتروح لوحدها

(Self Limited Viral Infection)

المسألة بتبقى لو اتعدت بيه واحدة حامل — Abortion

لو مرض ف الـ vesicles هنحصل permanent scar

طوب بتعالج إزاي ???

• خالف من الـ 2ry bacterial infection — إدي Topical Antibiotic

• مش عايزه يهرش (عشان الـ scar & infection) —

إدي Antihistaminic + Soothing Agent

• شتعمل الدهانات لحد ما الحبوب تقتر لوحدها ... ماتحاولش تشيل القشر نهائيا

• مظهرش فيها إطلاقا وإلا هاتحصل permanent scar

• مابنحماش بأي صابون أوليفة خشنة يستعمل بعمية وبس

• مابنحماش الحضانة أو المدرسة ، ومايختلطش بالأطفال أو المواصل



Herps Zoster الحزام الناري


- ❖ Vesicles on erythematous base
- ❖ Severe pain
- ❖ Varicella zoster virus become latent in the nerve cell bodies of dorsal root, cranial nerve or autonomic ganglion.
- ❖ Years or decades after a chickenpox infection, the virus may break out of nerve cell bodies and travel down nerve axons to cause viral infection of the skin in the region of the nerve.



❖ العلاج يبقى على جدار الكور من بداية ظهوره ...
 فيستحسن توتري العزل لمنع انتقال عدوى وجره ع للموافقة ع العلاج
 ❖ طب فيه هو العلاج ؟؟؟


- Topical & systemic antibiotic
- Topical Antiseptic
- Analgesic
- Systemic Antiviral:

Acyclovir 800 (100 LE)




- قرص 5 مرات يوميا مدة 7 أيام
 - لو عدا 3 أيام من غير ما يكتفد يبقى مقلوب لزمة غير في كبار السن
 - لازم يلقاه ولا هليحصل post herpetic neuralgia

- Anti neuralgic:
 Gaptin 300 (20 LE)



قرص يوميا مدة شهرين
 عدل ما يحصل post herpetic neuralgia

Bacterial skin infection



Staph

1-Folliculitis

حبوب ما بعد الحلاقة

R/ fucicort cream

وهان 3 مرات يوميا

R/ Dettol soap

صباحا ومساء بماء دافئ وتترك الرغوة لمدة 5 دقائق

2-Frunculosis

حباية كبيرة من منبت الشعر

ندور على سبب لنقص المناعة ونعمل تحليل سكر صائم وفاطر
علاجها نفس علاج ال folliculitis بإضافة systemic antibiotic

R/ hibiolic tab 460mg

قرص كل 12 ساعة

3-Carbuncle

كذا حباية فاتحين على بعض وغالبا في الظهر

بندور برضه على سبب لنقص المناعة و غالبا يبقى عيان سكر
والعلاج نفس ال local بتاع ال folliculitis بإضافة :

R/ Cefotax 500 mg vial

حقنة كل 12 ساعة لمدة 3 أيام

R/ Vitplus cap

كبسولة واحدة يوميا بعد الغدا

Strept

Erysiples & Cellulitis

التهاب خلوي red, hot, tender

غالباً في عيان سكر في رجليه الاتيين و حرارته بتزيد

R/ hibiolic tab 460mg

قرص كل 12 ساعة

R/ Abimol tab

كل 8 ساعات ثم عند اللزوم

طريقة الفيار:

غسيل بمحلول ملح و تشييف ثم استخدام أميكاسين أو بيفيتراسين سبراى ثم استخدام كريم فيوسى ويكرر يومياً.

ملحوظة هامة:

لو في رجل واحدة ممكن تبقى DVT لازم نطلب دوبلر على ال venous system وننظمن على النبض

Strept &/or staph

غالباً في الأطفال Face

R/ K Permanganate 1/8000

2 معلقة على 1/2 كوب ماء وعمل كمادات 2 الى 3 مرات يومياً المره 10 دقائق

R/ fucicort cream

وهان 3 مرات يومياً

R/ hibiolic susp 600mg

60mg لكل كيلو يومياً ونقسم على 3 مرات

Scalp غالباً مع ال pediculosis

R/ Betadine shampoo

غسل للفرع مرتين يومياً

R/ fucicort cream


وهان 3 مرات يومياً

R/ hibiolic susp 600mg

60mg لكل كيلو يومياً ونقسم على 3 مرات

Fungal skin infection

Fungal skin infections divided mainly to 3 groups



Diagnosis and distribution:

- **Tenia capitis** ومخالها فروه الرأس وهما نوعين: ميغروكوتري في اطفال عن بعض جزء في فروه الرأس كأنه مغطى بوسم والشعر ملتصق
 ● **Black dot** يطون عليها قشرة لونها أبيض مائل خفيف مثل منقطة اسود
 ● **Grey patch** التهابات بين أصابع اليد والقدم وممكن ينقر لونها أبيض
 ● **Tenia pedis & manum**
 ● **Tenia corporis (tenia circinata)**
 ممكن في أي مكان بالجسم وهي عبارة عن:
 rounded lesion normal skin in the centre and active periphery
 هل عدد lesions ينقر 3 أسابيع
 أكثر من three lesions لازم نستخدم systemic antifungal drug
 ونعرف ملين ال active periphery
 بلون حدودها لونها احمر و ممكن ينقر عليها vesicles وده ممكن ينشيطا مع other peridate lesions

Most important circinate lesions:

1-Heard patch of Pityriasis rosea

long jacket short sleeves وده ينقر فيها بمخالها

ملحوظة: في نوع اسمه inverted type لا ينقر م

antifungal therapeutic test وده ينقر ف ب

2-Circinate psoriasis

diagnosed by +ve Auspitz's test

(pin-point bleeding after the physical removal of a psoriasis scale)

- **Onychomycosis** : الظافر ينقر لونه أبيض ويتخن ويتشوه

• pityriasis versal colour TVC :

Distribution & Diagnosis:

hypo or hyperpigmented macules or patch with short jacket long sleeves distribution
 أشهر الأماكن : الرقبة والظهر (لو العيان جلده فاتح .. هتان غامقة والمكس مسطح)

• candidiasis-moniliasis:

Distribution & Diagnosis:

white dots surrounded by inflammation, usually in the site of napkins

Oral candidiasis:

Difficult suckling & white coating of tongue after prolonged use of antibiotics

العلاج و مده

Antidermatophyte only:

Terbinafine (250 mg/day for 2 weeks and in onychomycosis used for 4 weeks)
 واسمه فى السوق lamifine ويتاخذ وسط الأكل

N.B. : Griseofulvin (10-20 mg/kg/day for 6-8 weeks)

كوبس جدا فى ال tinea capitis بس ميستكتش عشان لمراضه الجاتية كثيرة أهمها الصداق

Broad spectrum antifungal:

ketoconazole 200mg/day

اسمه فى السوق ketazole

مدة العلاج على حسب المرض

5 days in candidiasis

10 days in TVC

15 days in tinea

Itraconazole 100mg/day

واسمه فى السوق Itracan

مدة العلاج على حسب المرض

كبسولة يوميا لمدة اسبوعين فى Tinea

كبسولتين لمدة اسبوع فى TVC

Fluconazole 150mg/WEEK

واسمه فى السوق flucazole

مدة العلاج على حسب المرض

ك مرة واحدة فى candida

ك2 مرة واحدة فى TVC

N.B

ال ketoconazole وال Fluconazole ممنوعين فى الأطفال و الحوامل وأثناء الرضاعة ومرضى الكبد
 ال Itraconazole ممنوع فى نفس الأمراض + مرضى ال COPD وال cardiac وال hearing loss

candida " napkin dermatitis"

R/ Dactacort cream or mycotral h

وهان موضعى مرتين يوميا بعد التنشيف جيدا مع المحافظة على مكان الالتهابات وايضا ناشف

R/ Calamine lotion

ثلاثة مرات يوميا

N.B candida in old age search for systemic cause eg: DM, HIV
& needs systemic anti fungal

TVC

R/ Nizapex shampoo or fungicure soap

يستخدم للاستحمام مرتين في الأسبوع

R/ Miconaze cream or Apexazole cream

وهان مرتين في اليوم

R/ flucazole 150 mg

كبسولتين مرة واحدة

أو كبسولة السبت وه والسبت اللى بعده وميستعماش الأحد
وفى دكاترة بتخليها أربع أسابيع

Tinea circinata

R/ fungicure soap

تستخدم للاستحمام مرتين في الأسبوع

R/ tinea cure cream or Batrifen cream

وهان مرتين في اليوم

لو أكثر من 3 lesions في الجسم نزود :
R/ flucazole 150 mg

كبسولة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع

Onchomycosis

systemic antifungal must be given for at least 3-6 ms in manum
and 3-9 ms in pedis

R/ itracan 100mg cap

كبسولتين في اليوم لمدة أسبوع ونوقف 3 أسابيع ويكرر لمدة 6 شهور

or

R/ flucazole 150 mg

كبسولة مرة في الأسبوع لمدة 6 شهور

تشخيص ال lichen planus

papule with plane surface ,pruritic, purple may be ploymorphic

لو لقيت حالة Lichen وعندها oral lesion اطلب HCV ab
لأنه سيكون غالبا معها

معلومة ع السريع

Tinea

1) Tinea Circinata

التينيا الحلقية



❖ organism الذي يهيب الجلد يتغذى ع الكـ keratin
لما يخلص ينتشر بنفس السرعة في كل الجوانب فيدينا vesicles,
papules ف الأطراف ارتفعت عن سطح الجلد

❖ طب واية الفرق بينها وبين الـ pityriasis rosea
Tinea Circinata **Pityriasis Rosea**

- حلقات حمراء with central
area of healing
- الحرف عبارة عن vesicles
يتبقى elevated عن الجلد
- مافيهاش scales
- دي يتبقى common

- بقعة oval صغيرة

- الحرف لونه أحمر يس مش
- elevated عن الجلد
- فيها scales
- دي not common



II) Tinea Cruris

تينيا الفخذ



❖ برضه بنفرقها عن التسلخات بالك border بتاعها
❖ يتبقى عبارة عن عنوى فطرية تصيب الفخذ ف الـ
❖ adult على شكل طلع جلدي ذو أطراف محمرة
❖ الفرق بينها وبين التسلخات إن دي الـ periphery
بتاعها بيتبقى elevated

(الفطر موجود ف الأطراف أما مركز الـ lesion بدأ
يتعافى)

❖ لا تصيب الـ penis, labia majora or around
the anus

❖ تسبب حكة شديدة

III) Tinea Pedis



❖ بين أصابع القدم وفي باطن الرجل

❖ عموماً ما ينجي على ظهر القدم

التي ينجي على ظهر القدم إما Contact Dermatitis

أو Tinea Circinata

(و يبقَى ساعِتها associated with Tinea Pedis)

❖ عبارة عن جلد رطب مقشر بين الأصابع، غالباً بين الرابع والخامس

❖ يصاحبها تكون مجموعة من الحويصلات الفقاعية أو البثور على جانبي القدم أو قوس القدم

IV) Tinea Barbae



❖ ينجي ف الناس التي in close contact with animals

(م الآخر كده عايشين مع الحيوانات زي المزارعين)

❖ نادراً ما تنتقل من شخص لآخر

❖ المشكلة إنه يتلخبط مع الـ Impetigo وينفرد بينهم بالـ history

❖ الـ Tinea Barbae عبارة عن:

• التهاب وإحمرار في منطقة الذقن

• يصاحبها تساقط للشعر

• لا تسبب هرش شديد وغير مؤلمة



Treatment of Tinea

Systemic Antifungal
Topical Antifungal
Antifungal Soap

I) Systemic Antifungal: (أمنوع عا)

✓ Griseofulvin, e.g.:

Fulvin 125 mg tab. (3.5 LE)

• قرصين يومياً مع وجبة من 23 و 24 م تكون وجبة واحدة أو حسب الإحتياج
• قرصين يومياً مع كوب من
• قرصين يومياً مع (شاي - قراغ - زباد - سمنه)
• قرصين يومياً مع كوب من
• في الأولاد: مثلاً 10 كجم
• في الكبار: قرصين 10 كجم

• يستعمل

أعلى وزن في 10 كجم في 10 كجم ... بعض ...
في 10 كجم في 10 كجم ...
في 10 كجم في 10 كجم ...
في 10 كجم في 10 كجم ...

في 10 كجم في 10 كجم ...

• Systemic Antifungal ممنوع في

(pregnancy-lactation- hepatic)

... ..

• في الإحتياج ومن 10 كجم في 10 كجم ...

Lamisil 125 mg (27 LE)

• من 10 كجم في 10 كجم ...

Lamisil 250 mg (47 LE)

• في 10 كجم في 10 كجم ...

• من 10 كجم في 10 كجم ...

• من 10 كجم في 10 كجم ...

II) Topical Antifungal: (أمنوع عا)

- ✓ Closol spray (6.50 LE)
- ✓ Batrafen cream (5 LE)
- ✓ Dermatin cream (1.5 LE)

يستخدم في Spray في 10 كجم ...
Infection في 10 كجم ...



III) Antifungal Soap:

- ✓ Fungicare Soap
- ✓ Ramo soap

شوية نصاب في 10 كجم ...

- ✓ فونجيكار سبون
- ✓ رامو سبون
- ✓ فونجيكار سبون
- ✓ رامو سبون

في 10 كجم في 10 كجم ...

V) Tinea Capitis

(Black Dot - Grey Patch)



- ❖ أهم حاجة تفرق بينه وبين Alopecia
- ❖ دي بتبقى فيها scales, black dots (remnants of falling hair)
- ❖ لكن الـ Alopecia بتبقى حدة بتسببها خالص من غير أي شعر
- ❖ طب و علاجها ٢٢٢
- ❖ بتبقى نفس علاج الـ tinea الحادي بس بامتداع مدة العلاج
- ❖ يعني ... ٤ أسابيع للـ systemic antifungal
- ❖ ٨ أسابيع للـ topical antifungal

VI) Kerion

(Tinea Capitis + Bacterial Infection)



- ❖ أهم حاجة إني لازم تفرق بينه وبين الـ Abscess
- ❖ في الـ kerion الشعر بيوقع .. لكن الـ abscess
- ❖ الـ kerion لو اتفتح هاتمسك
- ❖ permanent cicatricial alopecia
- ❖ نفس علاج الـ tinea بس بزود عليه
- ❖ systemic & topical antibiotic
- ❖ مدة العلاج بتبقى زي tinea الرأس

Dandruf



Nizoral Shampoo (17 LE)



Nizapex Shampo (23 LE)



يرغى ويترك لمدة ١٠ دقائق ٣ مرات أسبوعيا
لو القشرة زيادة أوى ممكن أزود الـ Flucoral cap.


Onychomycosis



❖ أفضل تتحول لأخصائي جلدية لأن علاجها غالي ويأخذ وقت
❖ ينبغي من كثر تعرض الأصافر للماء أثناء الغسيل ...
❖ عن كده منات الببوت لازم ينشفو ايديهم كويس
❖ ويفضل بليو جواني عند غسل المراعين
❖ شامة جدا ف اللي ينشفو في عصارات القصب
❖ والعلاج إيه ؟؟؟؟

- Trotyd nail solution 28% (8 LE)
- Batrafen nail solution (5 LE)
- Systemic Antifungal
✓ Itrapex 100 cap. (60 LE) (Itraconazole)


(٤) كبولات يوميا لمدة أسبوع ثم راحة ٣ أسابيع وبعدين ٤ كبولات لمدة
أسبوع ثم راحة ٣ أسابيع بحيث يأخذ
(٤ أسابيع)



لـ solution أفضل من الـ cream هنا لأن الـ penetration يتأخره يبقى أفضل حوالين الضووف

- ✓ Treflucan 150 cap. (8 LE)

كبولة مرة واحدة أسبوعا مدة ٦ أسابيع في أنظف اليد
١٢ أسبوع في أنظف القدم



❖ أهم حاجة لفرق بين الـ onychomycosis والـ paronychia
❖ الـ paronychia يتبقى ف الحكة اللي قبل الضافر
❖ عبارة عن fungal infection وحصلت عليه
❖ لو شاكك ومش متأكد هل هي الـ onychomycosis والـ paronychia
❖ الـ systemic antibiotic + topical antifungal

Parasitic skin infections

The most common parasitic infections are:
scabies and pediculosis

Scabies

Distribution:

in delicate skin eg: between fingers, around umbilicus, cubital fossa and wrist.

في الميادين في الأماكن التي يطلع فيها حب الشباب غالباً خاصة بعد سن البلوغ
عشان ال sebum is scabicideal ولكن الأطفال الجلد رقيق يجي في أي مكان

Diagnosis (3p):

pruritis with scratch markings
positive family history
polymorphic lesions (2ry bacterial infection on top)

Treatment:

➤ 1-Instructions

كل العيلة تاخذ دوش
كل الجسم إلا الوجه
ونضف لبسنا والفرش
وهيتبقى شوية هيرش



(الامور هيتبقى على الوجه ولا الرقبه - فسيك الملابس والملايات بالغلي والكي)
(نوع مضاد للحساسية ونظمه إنه خف بع الحارش هيتبقى لفته)
ونسأل لو هري حيوانات لاه في نوع ينتقل من الحيوانات يبقى لازم بعالج الحيوانات كمان
عشان منكرش المشكلة

➤ 2-Local

نبدأ بالاستعانة العلمية وبعد كده هتأخذ رويشتات جاهزة

Please Go Call My Sister Basma Immediately

Please → Permethrin 5% (safe)
Go → Gamabenzene (not safe)
Call → Crotamiton (Mainly antipruritic)
My → Malathion (ToXIC)
Sister → Sulpha (very irritant)
Basma → Benzyl benzoate (irritant)
Immediately → Ivermectin



IVERMECTIN



ممنوع أقل من 15 كيلو

ممنوع أثناء الحمل والرضاعة

يمكن يعمل convulsion & neurotoxicity

يمكن يعمل Breathing problems & nausea vomiting

وبرغم كل ده بيتكتب لأنه Very effective

➤ 3-systemic

Antibiotic eg, Unictam 250 mg suspension

الوزن 3/ كل 8 ساعات لمدة 7 أيام

Or Duricef 250 mg suspension

الوزن 2/ كل 12 ساعة لمدة 7 أيام

Antihistaminic eg, Fenestil syrp

معلقة صباحا ومساء

الروشتات

R/ Ectomethrin 5% lotion

للجسم كله هذا الوجه والرقبة مرة يوميا لمدة ثلاثة أيام بعد الاستحمام بماء والىء
بصابون كبريت أو Scabill soap بجزء من ليفة مقسمة الى أجزاء ويرمى الجزء
بعد الاستحمام

يمكن تكتب بدالة ال Euran lotion بنفس التعليمات و مادته الفعالة crotamiton

R/ Unictam 250 mg suspension

الوزن 3/ كل ثلاثة ايام لمدة 7 ايام

R/ Fenestil syrup

معلقه صباحا ومساء

R/ Duactin 6 tab

قرص اليوم و 3 قرص بعد اسبوع وطبعا بيتكب لوزن اكثر من 15 كيلو
وبعد استبعاد الصم والرضاعة

Pediculosis

Distribution:

فروة الرأس غالبا ممكن فى axilla او ممكن فى ال groin وممكن فى ال eye lashes
ممكن اشوف الحشرة نفسها فى الشعر وممكن الاقى ال nits

وايه يقولى انها nits مش قشرة شعر ؟؟

أحاول أطلعها الاقيها لازقه cemented nits

Treatment:

➤ 1-Instructions

(أحلق - أحرق - الحق)   

أحلق..حلاقة الشعر خاصة لو ولد أو بنوته صغيره أهلها مش هيرفضوا ولو منفعش
يبقى الأم هتفلى البنت بفلاية ضيقة بعد ما تحطها فى خل عشان dissolve cemented nits

أحرق..غلي الملابس والملايات مع الكوى عشان متحولش إلى النوع اللى بيبقى فى الجسم
مش فى الرأس بس.....(Corporis instead of capitis pediculosis)

الحق..ال sexual partner تأخذ معاه من العلاج

➤ 2-Local

Malathion + Permethrin (Licid lotion)

المعالجة بـ مالتيون أبدأ أو في أد التهابات في فروة الرأس أو في أد التهابات
في أعضاء جوف و antiseptic لمدة أسبوع لحد ما التهابات تختف.

➤ 3-systemic

Antibiotic eg: Duricef 250 mg suspension

الوزن/2 كل 12 ساعة لمدة 7 أيام

Antihistaminic eg: Fenestil syrp

معلقة صباحا ومساء

الروشتان :

R/ Duricef 250 mg suspension

الوزن/2 كل 12 ساعة لمدة 7 أيام

R/ Beladine shampoo

غسل للشعر مرتين يوميا

R/ Licid lotion

بترق لمدة 12 ساعة على فروة الرأس ناشفة (قبل ما ننام)

والمعالجة مدته 5 أيام ويكرر بعد 10 أيام

ملحوظة : الأحسن من لايسيد وديكتره خليز بقية (Prioderm lotion)

والأم هيلفرد (جاجان تستخدم 1/2 الإزالة مثلا يوم السبت و 1/2 الإزالة الثانية يوم الثلاثاء والإزالة الثانية
أعسا السبت ونصها الثلاثاء التي بعده و تسحب القوشن كل مرة 12 ساعة على فروة رأس ناشفة
بهر لعدة قبل النوم مباشرة تالي يوم الصبح الام هيلفسل رأس البلت بخل (طبعا نغسل بالنا من العين)
وبعد هذه تستخدم فلاحا بخل

عند استخدام دة الالفة اعبراي وامنه في المباشري Para spray أو غاصي امسا Ham shampoo

Scabies

- ❖ يبقى فيه هرش جامد وبيزيد جدا بالليل لدرجة تمنع العيان م النوم (Insomnia)
- ❖ يبقى ف ال delicate non hairy areas لأن ال sebum of hair is anti scabitic
- (Acne = No Scabies)
- ❖ ال scratch mark يبقى واضحة في ال wrist, border of hand & fingers, finger web, elbow & axilla, around the umbilicus, around the nipple
- ❖ Not in chest or shoulder
- ❖ غالبا مايقتش فرد وحده مصاب إنما العيلة كلها
- ❖ ال Incubation Period يبقى ٤ أسابيع
- (عشان وانت بتكتشف على العيان مايمنش من هنا وتعد انت نهرش ونقول أنا اتحدث)



❖ وده يتعالج إزاي؟؟؟؟

• Antihistaminic

• Topical Anti scabitic: Ectomethrin Lotion/Cream

- ✓ مدة العلاج ٥ أيام
- ✓ العيان يستحمي بالليل بمية دافية وليفة خشنة عشان تفتح ال tunnels
- ✓ يجيب ليفة كبيرة ويقسمها ٥ قطع قطعة لكل يوم عشان اللي استحمي بيها مرة
- ✓ مايستحمش بيها ثاني
- ✓ ينشف ويدهن الجسم كله ماعدا الوش والرقبة
- ✓ الهدوم اللي لبسها إما يستحمي مايلبسهاش ثاني
- ✓ الفرش بتغير كل يوم ويتغلي كويس
- ✓ الحاجات اللي متس هاتنفع تتغلي تتشمس كويس وتعزل ٣ أيام
- ✓ (organism cannot live away from host more than 3 days)
- ✓ الضوافر تنقص ويبعد عن الحيوانات



• Systemic Anti scabitic: Iversine tab.

- ✓ قرص لكل ٣٠ كجم جرعة واحدة على معدة فاضية بكرر بعد ١٠ أيام
- ✓ Rarely used, not very safe

لو واحدة حامل وعندها Scabies ← Sulfur 5% in vaselinized base

Pediculosis



◆ أشهر مكان فروة الرأس من وراء
 ◆ وده علاجه إيه ؟؟؟
 ◆ (الحق - الحرق - الحق)

- Cutting hair
- Boiling clothes
- Treat sexual partner
- Topical Antihistaminic
- Topical Anti pediculosis, e.g.:
 - ✓ Ectomethrine lotion (8.25 LE)
 - ✓ Lcid Lotion (5 LE)
 - ✓ Prioderm Lotion (6 LE)



- يوضع نصف العلبة مرة واحدة ليلاً على الشعر المبلل
 - ثم يربط بإيثارب ضيق محكم
 - وفي الصباح يغسل الشعر بالماء والخل ويمسح بمسح ضيق صغير موجود بالعلبة
 - ثم يغسل بأي شامبو مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين



- يمكن استخدام حبة الـ R1 Item Shampoo
- لو من كثر الهرش عورت نفسها ممكن نستخدم البيتاين شامبو
- الإستحمام بماء دافئ وعدم استخدام الملابس والأمتاط مرة أخرى
- ◆ الـ Body Lice
 - بيهرش ف جسمه كله
 - ييلزق ف الهدوم
 - بنعرفه م الـ excreta بتاعة الـ lice ع الهدوم

Acne

Diagnosis and distribution:

● Initial lesion:

1-comedon → white head or black head according exposure to air
so opened comedon will be black while closed comedon will be white head.

2-papule , nodule and scarring with no vesicles

● Age : Peak at age of 12-18.

لو السن صغير هخاف من ايه ؟

Neonate.....مخافش دول شويه هرمونات جباله من مامته من المشيمة.....

Infant.....ممكن يبقى suprarenal tumor or testicular tumor

● Site : face shoulder Interscapular

Treatment:

First If there is inflammation (redness) no topical treatment before
treatment of inflammation by systemic antibiotic for 2 weeks - 1 month

➤ 1-Instructions

ابعد عن (S)

Stress

Sweating

Spicy foods

Steroids and testosterone

لازم تكون صبور واطمن العيان واقله إن ده دليل إن مستوي الهرمونات كويس وإن استجابتك ليها كويسة
ممنوع اللعب في الحبوب نهالي
ممنوع المكياج لان في نوع اسمه cosmetic acne
الدوا الموضعي ممكن يعمل شوية احمرار في بداية العلاج وممنوع التعرض للشمس مع أدوية التقشير

➤ 2-Local

المواد الموضعية :

Benzoyl Peroxide 5%.....bacteriostatic irritant
Retinoic acid 0.5%.....chemical peeling but irritant
Adaplene 0.1%.....less irritant than retinoic acid
Topical antibiotic.....Erythromycin and clindamycin
Azelaic acid.....bleaching agent ,antimicrobial antiinflammatory

➤ 3-Systemic

Systemic antibiotic.....tetracycline,doxycycline
Isotretinoin اسمه في السوق NETLOOK



ISOTRETINOIN



Teratogenic

وصفه أثناء الحمل جريمة

Elevate liver enzymes and lipid profile

لزم أشرف اطمئن على انزيمات الكبد والدهون بالدم قبل ما توصفه

Causes dryness in skin and mucous membrane

لو حصل بشكل العينان يقدر يستحمه اطمئه ويمكن يستعمل كريم مرطب او زبدة كاكاو

وبرغم كل ده بيتكتب لأنه Very effective

الأفضل فلي حالات اللي فيها (acne conglobata) nodule cysts severe acne

لا تهمم

الكورتيزون ممكن يعمل حاجة اسمها acniform like eruption

والعلاج الأساسي في هذه الحالة إيقاف الدواء بعد استشارة الطبيب اللي وصفه ويمكن نستعمل نفس أدوية ال peeling

الروشتات

R/ Natty soap

يجعل بها ماسك لمدة 5 دقائق ثم يغسل بماء فاتح مرتين يوميا
يمكن تكتي بدائلها smooth face أو moon face

R/ Retin A cream

مرة واحدة مساء لمدة أسبوعين ومنع التعرض للشمس
قد لا يتقبل المريض أو بعد علاجها بال systemic antibiotic

R/ Vibramycin 100 mg

or

2 كبسولة يوميا لمدة أسبوعين

R/ Dory 100 mg

كبسولة واحدة يوميا لمدة شهر... تؤخذ بكمية وفيرة من الماء
ويمكن تؤخذ وسط الأكل هناك نقصان ال gastric upset

R/ Acnebiotic sol

من الوجه يوميا لمدة أسبوعين

يمكن تكتي بدائله acnesol أو clindasol

Post-eruptive hyperpigmentation علاج

(اروشة الإحادة)

R/ foldax cream

دقائق مرة واحدة مساء لمدة 6 شهور

R/ Eralic cream (antibacterial & anticolouration & anti inflammatory)

دقائق مرة واحدة مساء لمدة 6 شهور

"يمكن جعل احمرار والقرح في بداية العلاج ظلمن المياني انه قليل مع العلاج"


Acne

sebaceous gland لا الشديد إلا في الجلد
 عارة من الجلد الجلد المصاب بالحبوب
 ماصح في منطقة فيها شعر طويل لأن غسلة الشعر تكون قوية ... ماعدا حافة اسمها
 (فرد obstruction الشعر من برة)
 Obstructive Acne لا عيب الناس (رأيت رأيت طول الوقت)
 عارة في المكان (صباح رأيت بالكمين طول الوقت)
 ودي يكون في ... (بوت من أربوت طول الوقت)
 ودي يكون في ... (بوت من أربوت طول الوقت)

➤ Treatment of papular acne:

✓ Topical Tretinon, e.g.:

- Acne free cream (5 LE)
- Retin A (19.5 LE)



دفعان ليلة مع الحبوب مع عدم التعرض للضوء ثم يشطف صباحا
 يعمل photosensitivity إذا تعرض للضوء ويسبب التهاب الجلد
 إذا المريض مش استعمله أو الجلد التهاب ... يستعمل معاء الـ Perderm
 أو يدعه نص ساعة بين ويغسله
 ممكن يستعمل Topical Adapalene يبقى less Irritant بين برضه less effective
 يستعمل لمدة شهرين

✓ Acne Soap, e.g.:

- Tri Tec Acne soap
- Synobar Soap




- يغسل بيها مرتين يوميا صباحا ومساء
 - برغي دقيقة ويعدين يشطف

➤ Treatment of pustular acne:

✓ Topical Antibiotic

- Erythromycin + Zinc, e.g.:
 - Zincomycin Lotion (6.5 LE)
 - Acnebiotic Lotion (7 LE)
- Clindamycin, e.g.:
 - Dalcin-T Solution (24 LE)
 - Clinda Solution (6 LE)



✓ Systemic Antibiotic (Tetracycline)

- Doxymycin 100 cap. (4 LE)
- Vibramycin 100 cap. (18 LE)



✓ Acne Soap

For females with severe acne Anti Androgen - Estrogen

Post Acne

i) Depressions:


Laser or derma roller



ii) Hyper pigmentation:

Whitening Agent, e.g.

- ✓ Lucocida R cream (4.5 LE)
- ✓ Quinol cream (8 LE)
- ✓ Triolospot cream (8 LE)
- ✓ Pearlta (34.5 LE)
- ✓ Ultrafair cream (2.5 LE)



Scar

After burn or wound

- ◆ Contractubex gel (11 LE)
- ◆ Scartex gel (8.5 LE)
- ◆ Scaro cream (34 LE)



Pseudofolliculitis



- ◆ حبوب يظهر بعد الحلاقة الذقن
- ◆ وهي عبارة عن ٢٢٢
- ✓ Topical steroid + Antibiotic
- ✓ توقف الحلاقة مدة ٢ أسابيع
- ✓ استعمال جل الحلاقة بدلاً من الكريم
- ✓ الحلاقة في اتجاه واحد
- ✓ عدم الشد على الجلد أثناء الحلاقة
- ✓ استخدام جل مرطب بعد الحلاقة

Stria in Pregnancy

- ◆ Dermasure SM (30 LE)

Dermatitis (Eczema)

30 % of dermatological complaints
(Dermatitis until proved otherwise)

Types:

Contact Dermatitis
Atopic Dermatitis
Napkin Dermatitis
Stasis Dermatitis
Asteatotic Dermatitis
Dyshydrotic Dermatitis

1) Contact Dermatitis

An exmatous dermatitis caused by exposure to substances in the environment .. & cause

Acute

Sub acute

Chronic

Examatous Dermatitis

(التهاب جث ع الجلد ... ما استعملها ... فحصل dermatitis)

Irritant Exposure:

❖ May be

- Acute
- Chronic

❖ Examples:

- > Nickel Allergy
- > Rubber Cement of Sandals
- > Household Cleanser
- > Repeated Licking
- > Rubber Band of the underwear
- > Deodorant / Perfume
- > Topical Lotions

Nickel Allergy:

• أشهر حالة
• من المعادن الرخيصة - توكة الحزام - ساعة اليد
• يشفى فيه:


- ✓ Edema, notable erythema
- ✓ Well demarcated with erosions & crusts
- ✓ Sometimes, vesicles & bullae (like burn)




لاحظ إنه :

من لازم يحصل الـ Dermatitis من أول لبسة ...
(البيان هيقول ما أنا كنت لابسها إمبراج وماحصلت حاجة)
بالعكس

ده غالبا بيحصل on 2nd exposure



Rubber Cement Of Sandal:



- حساسية لمادة الغراء المستخدمة في الأحذية
- يبقى فيه Artificial Pattern (بمعنى ... الجزء من الجلد اللي بيتمس الحذاء هو بس اللي يبقى فيه dermatitis)
- في الصورة ... لاحظ إنه:
- الصوابع free لأنها مش ملامسة للصندل
- نفس الكلام ينطبق على أي حاجة بتتلمس والجلد حساس ليها ... زي الشراب والجوانتي
- لاحظ إنه ...

ف الشراب أو الجوانتي بين الصوابع هيبقى free لأنه مش ملامس لمادة الشراب أو الجوانتي

Household Cleanser:

- In elderly ♀
- Superficial desquamation & lichenification



Chronic Dermatitis

ریاستی

أي حد الأتي *lesion* ف رجله أو إيدته ...
لازم أسنله عن شغلته .. وإذا كان يتعرض لأي مواد بصفة مستمرة

Rubber Band of Underwear (Waistband Dermatitis):

• امتك الملابس الداخلية وبالأذاك لو ضيق ممكن يعمل Contact Dermatitis

هـ هَلَاكِي الْحَيَانِ بِقَوْلِكَ ...
لَأُبْلِكُكَورَ ... أَنَا بِالْبَيْسَةِ يَقَالِي زَمَائِلًا إِنْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ يَعْمَلُ كَذِبَهُ
فَالْغَالِبُ دُهُ سَاعَتُهَا هِيَ كَوْنُ الْتَغْسُلِ بِمَنْخَلْفٍ جَدِيدٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ
يَتَغَسَّلُ بِهِ قَبْلَ كَذِبِهِ ..

-وهذا الصابون من المنظف مئى من الأسنك

• ويبقى فيه edema, vesiculation

• وبنفي well demarcated (بالظبط مكان الأستاذ)

Deodorants & Perfumes:

- Deodorants → Axilla

- Perfumes → في الرقبة من تحت الودان ... أو أي مكان يبتشر عليه اليرقان مباشرة



Diffuse Pattern with [•]بقی فیہ scales

easily misdiagnosed ^{ويعتقد}

Repeated Licking:




• تكرار فم الأطفال ... وتكرار اللسان التي غريبة تلمس شفاهها كثير لترطيبها
• إذا كان هذا في عمر 3 أشهر وعندها يمكن أن نعمل
• Contact Dermatitis
• Skin في حالة فم الحلاقة دي
• Dermatitis
• في فم ...

- Drying cycling of lips
- Excoriation
- Erythema

Topical Lotions:

• e.g.: Topical lotions containing paraben
(a class of chemicals widely used as preservatives by cosmetic and pharmaceutical industries)

• عسلان كده ...
المفر ومن قبل مستعمل أي كريم جديد أو أي مستحضر هاتحط ع الجلد
وخصوصا الوش ... لازم نجرمه الأول على جزء مش بيبان من الجسم
عسلان لو حصل أي Allergic Reaction مبيقتش بيبان ويشوه المنظر



• كل اللي قلت ده كان الأشكال والصور المختلفة لـ
Contact Dermatitis وأسبابه

• طب هو إيه اللي بيحصل ف الـ Skin؟؟

- > Erythema (due to : VD of blood vessels)
- > Vesicles, bullae
- > Itching (due to histamine release)
- > Increase skin thickness
 - Prominent fissures
 - Increase skin creases

• Prominent skin fissures & increased Skin
Creases في تعتبر Pathognomonic لـ Dermatitis

بمعنى

إذا شفتها ... أحلف إن ده Dermatitis



11) Atopic Dermatitis

- ❖ Atopy : A heritable clinical state associated with (Dermatitis – Asthma – Allergic Rhinitis)
- ❖ Atopic Dermatitis :
 - Usually chronic pruritic inflammation of epidermis & dermis
 - often occur in association with a personal or family history of (hay fever – asthma – allergic rhinitis)

من الآخر يعني Systemic Allergy بس ظهرت ع الجلد

In Infants & Young Children:

مثل بثور ...
 لو من لوقت
 بنى قاضي حاجة من التين :

Atopic Dermatitis

غالبًا عنده حساسية صدر أو آفة
 أو في family history لأي حساسية
 يبقى في آفة (scalp, face(chin & cheek)
 (الأطفال أقل من سنتين خدها أحمر)

Scabies

عذ الأم على جنب (عشان ماتحرجهاش قدام
 عذ وترضى تقولك) ... هتلاقها بنهرش هي
 كل



أهم حاجة هتسبك عنها الأم :

- طب هي دي هتفضل عنده على طول ؟؟
- لا ... متقلقش ...
- غالبًا هتختلي لما يحي يروح المدرسة
 (عند عمر 6 سنوات)

In Older Children & Adults:



- In elbow, knee (flexor surface)

• واحدة حاجة بنهرش جامد ف آفة cubital fossa و آفة knee
 من وراء ومن قدام

(غالبًا بتيجي تشككي قبل الجواز على طول)
 (Common in middle aged female)

• أسهلها ... - بتزيد مع أكل معين ؟؟؟

- آفة (تسهر حاجة ف مصر الموائد)

(بتزيد مع أي حاجة م الحاصلات اللي بتزود الحساسية ... زي :

الموز - الفواكه - الفول - التكرلات - الموالح - البيض - السمك)




- Itching → Severe
- Chronic & recurring symptoms of:
- Erythema, Excoriation of flexures

↓
 Edema, super infection with staph

- Confluent papules forming plaques in the antecubital regions


Treatment of Dermatitis



- ❖ لازم أوقف الـ circle دي عشان أقدر أعالج الـ Dermatitis
- ❖ الـ Dermatitis ده عبارة عن تجمع خلايا مناعية بيقتل العلاج Corticosteroids
- ❖ الجبان بيهرش ويعور نفسه فيحصل Infection — يبقا محتاج Antibiotic
- ❖ الجبان بيهرش جامد — يبقا محتاج Soothing Agent
- ❖ تكونت قشور كثيرة من الالتهاب والهرش — محتاج Keratolytic

Topical Steroids:

- ❖ Betaderm cream & ointment (2.5 LE) أشهر حاجة (Betamethasone)
- ❖ Betnovate cream (5 LE)



ممنوع بتخط على جلد متعور
خط الـ Antibiotic الأول

أهم حاجة إنه يستعمل مدة أقصاها أسبوع
عشان ما يحصلش ...

✓ Systemic Absorption

✓ Cortisone Skin Atrophy (يبقى شكل جلد الناس العواجز)

ممنوع الـ cortisone العادي يتخطى ع الـ :

✓ Face يبطل الجلد بعجز بدري

✓ Folds (Axilla – Inguinal Region)

فيه أوعية دموية كتير فسهل يحصل systemic absorption

✓ Infant جلده رقيق ... وبالتالي سهل يحصل :

- Systemic Absorption

- Skin Atrophy


❖ Perderm (4 LE)

❖ Dermatop (8 LE)

❖ Elecon (18 LE)

أعمال أستعمل إيه ع الـ



face – folds – infants



(Non Flurinated Steroids)

Topical Antibiotics:

- ❖ Scratching → 2ry bacterial infection (staph – strept)
- ❖ Fusidic Acid → Anti staph – Anti strept
 - Fusiderm (6 LE)
 - Fucidin (10 LE)



❖ امتي نستخدم cream .. وامتني نستخدم ointment ???

• cream الـ
 ← مربع الإمتصاص — يستعمل ف الحالات الـ Acute
 ← فيه نسبة مية أعلى — يتحط ع الجلد الرطب (vesicles – bullae)
 (المية بتتشف مش بترطب)

• ointment الـ
 ← يستعمل ف الحالات الـ chronic
 ← يتحط ع الجلد الناف


❖ لاحظ انه :

أي دهان موضعي على الجسم (cream – ointment – lotion – spray) بيتحط مرتين ف اليوم

❖ بدل ما نكتب cortisone & antibiotic كل واحد لواحد والروشتة تبقى طويلة ...

في combinations يبقى فيها الاثنين مع بعض

- Defucin – H cream (10 LE) (fusidic acid + hydrocortisone)
- Fucicort (11 LE)
- Fucizone (6.5 LE)



❖ الـ combination اللي بنفع لـ face – folds – infants هو اللي فيه hydrocortisone

❖ عشان نوقف الـ inflammatory cycle لازم أدبي & systemic antihistaminic

soothing agent

Antihistaminic:


- ❖ Fenistil (4.9 LE)
 - safe from the 1st day of life
 - one drop/Kg before sleep
- ❖ Alerid (4.5 LE)
- ❖ Cetrak (6 LE)
- ❖ Claritine (11.9 LE)
- ❖ Mosedin مشهور
 - syrup (6.5 LE)
 - tablet (8 LE)

❖ الـ Fenistil الوحيد اللي
يتعطى قبل سنتين
❖ أي حاجة ثانية مش تتعطى
قبل سنتين



❖ قبل متعطى أي Systemic Antihistaminic لسه هل هو Hepatic or Renal
❖ طب إذا كان الـ patient عنده renal or hepatic disease ومحتاج أكتب له Systemic Antihistaminic أكتب له إيه ???

- ✓ Delarex tablets (8 LE)
- ✓ Telfast tablets (22 LE)



❖ هو مفيد Topical Antihistaminic ???

استجبت كلها تقريباً في دراسات بتقول إنها بتعمل Contac Dermatitis
❖ لو هلستعمل اثنين كريم ... أستعملهم إزاي ???
لو قلت للعيان ادهن واحد وكملى ١٠ دقائق ادهن الثاني ... هيكمل
عشان كده بقوله قد لحصة من ده ولحصة من ده ولخبطهم على بعض وادهن بيهم

Soothing Agents:

❖ Clamyl Lotion (3 LE)

- أشهر وأرخص حاجة
- عيبه إنه يسبب بوثرة بيضيا بعد ما نعط (صعب الإمتصاص)

❖ Pan - D Lotion (7.5 LE)

❖ O - Z Lotion (5.9 LE)

❖ Bringo Lotion (9.75 LE)

❖ Bepanthen cream (6 LE)

❖ Vano Cream (15 LE)

❖ RASHA Ointment (4.5 LE)



- إزاي أستعمل الـ Lotion (من - سفة) مع الـ Cream ???

- نعط الـ Lotion الأول ... ونستني ١٠ دقائق (على إمام بنشف)


وبعدين نعط الـ cream

Keratolytic:

❖ بانيتها ف الحالات اللي فيها قشور

❖ مفرش keratolytic لوحده (حامي جدا ع الجلد) ... دايما معاه soothing agent

Carbamide cream (3 LE)



111) Napkin Dermatitis البامبرز

(Contact Dermatitis + Fungal Infection)

... Kenacomb مكنبش

لأنه عبارة عن


Antibiotic
↓
skin flora هيموت الـ
fungal ويزود الـ

Antihistaminic

Steroid
↓
نوع الـ steroid التي هنا ما
ينفص في الـ infant & folds
infection

✓ Miconaz – H cream (5.5 LE)
(Antifungal + Hydrocortisone)

✓ Dactacort cream (8 LE)



مشكلة الموضوع ده إنه Recurrent

أصبح الـ Recurrence إزاي ؟؟؟

- بعد ما الطفل يخف يشتعمل الـ Zinc Olive (Lotion – Cream) كوقاية (أشهر حاجة)
- كل مرة تغير فيها الأم الحفاضة تكتف كويس وتدهن الـ Zinc Olive قبل ما تلبسه الحفاضة الجديدة
(Soothing Agent)

✓ Zinc Olive → Lotion (5.5 LE)
→ Cream (8.75 LE)



❖ لاحظ أنه ...

• لو الإحمرار من واصل للتغيرات الصغيرة (من ملامسة للبايبرز)

← يبقى ده Contact Dermatitis

(الجزء الملامس للبايبرز بس هو اللي التهاب)



• لو الإحمرار واخذ التغيرات معاه كمان (حتى الجزء اللي من ملامس للبايبرز التهاب)

← يبقى ده Fungal Infection

(Cadidiasis)



❖ نفس العلاج (Miconaz - H Cream) بيتكتب لعلاج تسليخات الكبار

(Axilla - Under breast - Between the thighs)



IV) Stasis Dermatitis



❖ الناس التي عندها دوالي ... يبقى فيه ...
(Stasis of blood → Toxins → Irritation → Sever Itching)
❖ لو هادي حاجة واحدة ... يبقى الـ Fucidort

V) Asteatotic Dermatitis




❖ يحصل الناس التي بتلوحني ومش بتكشف
❖ يحصل لبعض الناس ف التلنا من غير أي حاجة
❖ يدي نفس علاج الـ Dermatitis بس هنا الـ Soothing Agent مهمة أوي

VI) Dyshydrotic Dermatitis

صبارة عن vesicles كتيرة ف الإيد بيقلد يهرش فيها جامد



❖ Dermatitis in the ear lobule & side of the neck due to otorreah:



- ادي الـ Fucidort

- (لأن الـ fluid التي نازل من الـ ear يبقى

infected وعمل contact dermatitis)

❖ لو حد عنده نزلة برد وحصل التهاب ف الجلد حوالي الأنف ...

- ادي الـ Defucin - H cream

- (لام H ... ماينقص الـ cortisone المعادي ع الـ face)

❖ الناس التي بيحبها خط أسود على خدها من كتر الحياط

(زي خطي سيدنا عمر بن الخطاب)

(Perderm - Dermatop - Elecon)


Seborrheic Dermatitis



- ❖ فترة متجمعة ف منطقة معينة زي الـ nasolabial fold
- ❖ Greasy lesion with increased sebaceous glands activity
- ❖ Red, scaly lesion with predilection to the body folds

❖ يبقى عبارة عن Inflammation + Crusts
 ❖ ويقللي العلاج هالبقى عبارة عن :

Topical Steroid + Keratolytic
 e.g.: Diprosalic Lotion (9 LE)



من مرتين يومياً



- ❖ لو لقيتها منتشرة أوي معناها إن الـ Immunity ضعيفة
- ❖ جدا ... زي ف الـ HIV Infection / AIDS



❖ ممكن أزود شامبو مخصوص ... لكن لا يستعمل إلا ف الحالات الـ sever
 من الـ saeboric dermatitis affecting the scalp
 Polytar Shampoo (11 LE)

Cradle Cap



- ❖ يبقى حاجة زي الزبدة كده على راس الـ infant
- ❖ Topical Antifungal + Topical Steroid
- ❖ ممكن الأم تدقي معطقة زيت زيتون وتحطها على راس الطفل
- ❖ ونسرح ف عكس اتجاه الشعر



Eczema "Dermatitis"

Inflammatory response of the epidermis

Diagnosis:

Acute eczema: redness vesicles oozing itching eg napkin dermatitis

Chronic eczema ... thickening discolouration cracking eg prayer markings

التشخيص سهل بس الاهم من التشخيص انى احاول قبل ما العيان يمشى من عندى أعرفه السبب
لازم اسأل عن الاسباب المشهورة لأن أهم حاجة فى العلاج نبعد عن السبب

إنت أصلا عندك أى نوع من أنواع الحساسية؟؟
إنت كنت لابس صوف أو كنتى لابسة غويشة نيكل أو كنتى بتمسحى بمنظف لأول مره أو التوم؟؟
هى بتزيد فى الشتاء و الجلد ناشف ومشقق؟؟
عندك قشر فى شعرك أو ورا ودنك؟؟

Types & distribution:

1-Atopic dermatitis

هتلاقى العيان غالبا عنده نوع تاني من أنواع الحساسية

Itchy lesion usually in:

- Infant in cheeks
- Child in flexure
- Adult in neck hand and anogenital area

2-Contact dermatitis

- to some allergen as nickel accessories
- to irritant materials acids and detergents
- allergen and irritant cement

Another name of contact dermatitis HOUSE WIVES ECZEMA
In the form of itching thickening cracking.

3-Xerotic eczema

دايما بتيجي فى الشتاء و بتيجي فى الرجلين والإيديين

4-Seborrheic dermatitis

greasy peeling of scalp eyebrow face at nasolabial fold and retroauricular

5-other types

Venous eczema عنده دوالي

age more than 50 years usually in ANKLE itchy dark discolouration it may lead to venous ulcer .

Neuro dermatitis الهرش قبل ظهور ال lesion

thickened pigmented usually single patch results from habitual rubbing of skin in this area

Infection (parasitic or bacterial)

اعمل تحليل براز و وظائف كبد لو العملية متكررة ومش لاقى سبب واضح

Lymphoma

search for enlarged not tender LN examine other LN examine liver spleen

coeliac disease عنده انتفاخ و إسهال مزمن ومشاكل في الغدد

itchy SYMETRICAL eczema at hand, leg or back associated with steatorrhea

Irritable bowel disease precipitated by wheat associated with other autoimmune diseases

Treatment:

➤ 1-Instructions

Avoid the cause وده الاهم

بلاش استخدام الصابون العادي واستخدام الصابون المرطب أو فازلين أو كريمات مرطبة زي Nivea وممنوع الهرش

➤ 2-Local

soothing agent & topical corticosteroid

➤ 3-Sytemic

Systemic anti-histaminic

الروشتات

R/ Calamine lotion

مع 3 مرات يوميا
يمكن مكنى به الـ zincoderm أو panthiol cream
or

R/ hamline lesion في الوجه

R/ Betaderm cream

ولان مرتين يوميا

R/ tavagyl syp /tab

مرة صباحا ومساء

◆ ايه اللي يفرق الـ tinea circinate عن الـ erythema multiform

ما الاتنين مدورين ؟

اللي يفرق اهم حاجة الـ onset

الـ erythema multiform تبدأ فجاء اما التينيا تبدأ صغيرة ونفرش

ونفرق (بالهرش) الـ erythema multiform الهرش معاها جامد

ونعرف بالقشر الـ erythema multiform القشر ميوصلش فيها

للطرف خالص وغالبا هتلاقى مع erythema multiform

herpes simplex or history of drug intake

مع ان معظم الحالات idiopathic

معلومة ع السريع

Urticaria

(wheals)

(Elevated – Edematous – Erythematous – Evinced)



(عالية – وارمة – محمرة –
بتروح لواحدھا)



❖ إيه أسبابها ؟؟؟؟

• حساسية لقرص حشرة معينة (نحل – نمل – دبابير)

• حساسية لأكلة معينة (زى السمك)

• ٥٠% من الحالات مش معروف سببها (أكثرها الـ stress خصوصا فلـ ♀)

❖ متخافش منها إلا لو وصلت لـ Face ← Angioedema

لأنها ممكن توصل لـ larynx حالا وتعمل laryngeal edema ← suffocation



❖ طب أعمل إيه ساعتها ؟؟؟

- سرنجة فيها (Amp. Dexta + Amp. Avil) الاثنين مع بعض

وتعطى IV slowly


- ويمشي ف البيت على :

Systemic Antihistaminic & Soothing Agent

- المفروض بندي حقنة الـ (Avil & Dexta)

حتى لو كانت مش وصلت لـ face قدامي

لأنها ممكن تكون مش وصلت قدامي ويمشي من هنا ويحصل له
laryngeal edema & suffocation ويموت قبل ما يتلقح



❖ Dexta in children: 1 Cm/10 Kg (شرطة لكل كيلو)

Papular Urtecaria

- ❖ Papules في إيد ورجل الطفل يهرش فيها
- ❖ غالبا من قرص التاموس والحشرات
- ❖ التاموس لو قرصت الطفل حتى في مباح رجليه الصغير ممكن تظهر في إيد ورجله (دي حساسية من قرص التاموس ... من مكان ما هي قرصت)
- ❖ لو حصلت في الكبار أو الصغيرين وما كلف فيه تاموس (زي في فصل الشتاء مثلا) يبقى غالبا فيه حشرات في قرص السرير - السجاد - الوير - الديباليب بتاعة الطفل
- ❖ لازم الحاجك دي كلها تقتسم كويس
- ❖ الـ papules بتزيد مع لكل معين (سمك - لين - نين - خوخ - مانجو - فراولة - بيض - شكولاتة)
- ❖ العلاج :

❖ الـ Papules نتيجة عن حساسية مفرطة لقرص التاموس ... بيهرش فيها جامد

Antihistaminic

Steroids

+

Soothing Agent

❖ لازم القرص بتقسم كويس

❖ بعد عن الأكلات اللي بتزود الـ Papules & Itching



Urticaria

Diagnosis (3E) :

تشخيص بوجود ال wheel في أي مكان ويكون:

Elevated

Evanescent

Erythematous

Angioedema

غالباً يكون سببها دواء وبتيجي في العين والشفايف و بتكون خطيرة لبيسيه؟؟؟؟
لأنها بتعمل laryngeal edema ويمكن تعمل suffocation
ونلحقه في الاستقبال بامبول أفيل وديكسا

الأسباب

Drugs: penicillin, calcium channel blockers, ace inhibitors

أي دوا ممكن يعمل حساسية حتى أدوية الحساسية

Diet: وأهم الحاجات اللي بتعمل البيض اللبن الشيكولاتة المانجة الفراولة

Inhalant: برفان لأول مرة تستخدمه وفي فصل الربيع حبوب اللقاح

Infectant: parasitic infestations Insect bites

Contactant: لو لبس حاجة جديد صوف مثلاً أو مع تنظيف السجاجيد

لو السبب مش واضح نعمل:

stool analysis

liver function and virology

CBC... some types of lymphomas associated with

increased eosinophilic count

أهم علاج للحساسية معرفة ال سبب والبعد عنه

الروشتات

R/ Calamine lotion

مس 3 مرات يوميا

or panthiol cream أو zincoderm أو
يمكن نكتب بهاله

R/ hamline lesion في الوش

R/ Betaderm cream

R/ tavagyl syp / tab

مرة صباحا ومساء

ملحوظة:

In recurrent attacks without apparent cause

يمكن نديه لو مفيش سكر او ضغط

mast cell stabilizer او

R/ Amcinol

صفة حصل مرة واحدة ويمكن تتكرر كمان 6 شهور مرة واحدة


or

R/ Ketoti tab

قرص مساء لمدة 6 شهور

New line: Immunodesestization

التعرض لجرعات متزايدة تدريجيا من ال antigen يخلي جهاز المناعة يتعود عليها
و نكرره مع أكثر من antigen.



دوسه جلد او تصويرا عرضيها و عرضيها
عبد الله بن ابي 199

◆ Skin - Body Openings - Upper Respiratory Tract → GON

→ Cavities → $Q = -ve$

- Penicillin + Salbactam → Anti Staph

* Amoxicillin + Clavulanic —————> Anti Staph

1st Generation Cephalosporins..... ٩ كلسر منجدة في الطبقة

14/11 During a little while,

- Can be given orally
- Every 12 h
- Strong Anti Staph
- 50 mg/Kg/day

(4406) vesicles .B. 4-6 µm; top 1 µm. German Violet Part

K. *Parmacranthale* 1/10000. Antiseptic. 1/10000.

... كذا ...

- Counter Irritation → Decrease Pain
- VD → More Blood Supply → Increase Immunity

Pityriasis Alba

Scales

في بعض الحالات تكون البثورات البيضاء الصغيرة على شكل قشور بيضاء صغيرة اللون (ليس لها رائحة) ... شائعة جدا

- ✓ Vitamin Deficiency
- ✓ Parasitic Infection
- ✓ Allergy
- ✓ Sometimes due to sun exposure



- ✓ Halorange syrup (9 LE)
- Hi Potency Cap. (15 LE)
- A-Viton Cap. (2 LE)

- ✓ Periderm + Carbamide
- ✓ Ask for stool analysis & treat parasitic infection



Pityriasis Rosea

في بعض الحالات تكون البثورات البيضاء الصغيرة على شكل قشور بيضاء صغيرة اللون (ليس لها رائحة) ... شائعة جدا



- Skin
- Scales
- Erythema

في بعض الحالات تكون البثورات البيضاء الصغيرة على شكل قشور بيضاء صغيرة اللون (ليس لها رائحة) ... شائعة جدا



في بعض الحالات تكون البثورات البيضاء الصغيرة على شكل قشور بيضاء صغيرة اللون (ليس لها رائحة) ... شائعة جدا




Pityriasis Versicolor



التينيا الملونة
التينيا
يأتي في الصيف كثير بسبب الحر والعرق الكثير
يخرج من الجلد لونها تغير عن باقي الجلد (فاحت "common" أو اغتمت)



• ردي علاجها إيه ؟؟؟
• نفس علاج الـ tinea بس يفضل استخدم الـ
Flucoral cap. (14 LE)



- العلية فيها كبسولتين ...
- مياخد كبسولة النهاردة (السبت مثلا)
- مايسحمش النهاردة ولا بكرة (لأنه بيتكرر في العرق)
- باعد الكبسولة التالية في نفس اليوم من الأسبوع
- اللي بعده (يعني السبت اللي بعده) لمدة ٤ أسابيع
- لو الـ tinea منتشرة أوي يفضل أكتب له شامبو زي الـ Nizapex
- وده بيتزغى ويترك ٥ - ١٠ دقائق لمدة ٥ أيام متتالية
- محش يستعمل فوطه أو منومعه
- الاستحمام باستمرار
- استخدام ملابس قطن

♦ إيه الفرق بينها وبين الـ Pityriasis Alba ؟؟؟

Pityriasis Alba	Pityriasis Versicolor
Central	Periphery
Few	Multiple
Large	Small
Ill defined	Well defined
More in children	More in adult





Alopecia

✓ Topical steroid, e.g.: Elecon cream

✓ شامبو لغسيل الشعر قبل المس زي Panthovit Shampoo

✓ Vitamins. E.g.: Halorange Syp

✓ Topical Minoxidil :

- Minoxidil Lotion (40 LE)

- Hairgain spray (30 LE)



■ العيان بخلي باله ميعطش المس على الشعر السليم

■ أول أسبوع ٦ رشات الصبح وبالليل

■ ثاني أسبوع ... بالليل فقط

■ ثالث أسبوع يوم ويوم

■ رابع أسبوع مرتين في الأسبوع فقط

■ خامس أسبوع مرة واحدة في الأسبوع مدى الحياة

✓ Intra lesional steroid

❖ دورة الشعر ٤-٦ شهور يعني أي دوا استخدمه تأثيره مش هيبقى إلا بعد ٤-٦ شهور ...
فلازم أستمرو في العلاج

❖ ممنوع شد الشعر بعنف

❖ Minoxidil → Hair Dependent

عشان كده

✓ ماينترشش ع الشعر السليم

✓ العيان يفضل يستعمله مدى الحياة وإلا الشعر هيقع ثلثي

❖ الـ Minoxidil قوى جدا ... لو جه حتى على منطقة Non hairy هيطلع فيها شعر ...

عشان كده نبه ع العيان بخلي باله أوي وهو بيستعمله

Hair Falling

➤ SYSTEMIC:

- ✓ pregnancy
- ✓ Lactation
- ✓ stress
- ✓ Fever

➤ LOCAL:

- ✓ Dandruff
- ✓ Pediculosis
- ✓ Impetigo
- ✓ Piedra

➤ Anaemia

➤ Hair tonic, e.g.:

- ✓ Magic Oil (15 LE)
- ✓ Vita Hair lotion (10 LE)

➤ Vitamins, e.g.:

- ✓ Halorange Syp

➤ Shampoo, e.g.:

- ✓ Herbamix (17 LE)

➤ TTT of the cause



إيه أسبله ؟؟؟

ويعالج إزاي ؟؟؟

ماتساش تعرف العيانة إنه طبيعي تقع حوالي
١٠٠ شعرة يوميا ... عشان مش كل ما تشوف
شعر ف المشط تفكر شعرها بيقع

Piedra

فترة ملزوفة على أطراف الشعر بتسبب نقصه ومقطه
وعلاجها إيه ؟؟؟؟

- ✓ Topical Antifungal >>> Cutistad spray

مع قص وكوي أطراف الشعر



Drug

- ❖ Topical steroid
- ❖ Systemic Steroid

من يوميا لمدة أسبوع

Patie

1- A

2- A

3- A

4- A

H

- ❖ Heel Fort oil
- ❖ Foot Smart
- ❖ Salicylic Acid



د/ احمد عبدالله

Drug Eruption

- ♦ Topical steroid + Antihistaminic
- ♦ Systemic Steroid, if severe :

Prednisolone 5mg tab

3 قرص يوميا لمدة اسبوع ... ثم 2 قرص يوميا لمدة اسبوع ... ثم قرص يوميا لمدة اسبوع
(Gradual Withdrawal)



بني ال Patient ورقة إخراج لأي دكتور يوربوتة ... مكتوب فيها

Patient has drug eruption plz don't give :

- 1- All Antibiotic except erythromycin
- 2- All Sulfa containing drugs
- 3- All NSAID except Paracetamol
- 4- Anticonvulsants & Anti Psychotics

Heel Fissure Callosity

- ♦ Heel Fort ointment
- ♦ Foot Smart ointment
- ♦ Salicylic Acid 10% + Urea 20% in Vaseline base



سنتفع الرجل بالليل ف مية داخية ريع ساعة
سنتحك بالحجر ويدهن الدهان
سنتلف بكيس بلاستيك وفوقه شراب الصبيح
سنتحك بالحجر الصبيح عشان نرفع الخلط المينة
لو الحالة severe لوي ... ممكن ازود ال
Carbamide Cream



السمار حول العين



- ✓ 1- تفتيح العين
- ✓ 2- تفتيح العين
- ✓ 3- تفتيح العين
- ✓ 4- تفتيح العين
- ✓ 5- تفتيح العين
- ✓ 6- تفتيح العين
- ✓ 7- تفتيح العين
- ✓ 8- تفتيح العين
- ✓ 9- تفتيح العين
- ✓ 10- تفتيح العين

- Shade out eye contour
- Fixate eye contour
- Isolate eye contour
- Uniform eye contour



Verruca

من المسكة

- ◆ Collomack paint (6.5 LE)
- ◆ Salicylic Acid 100% powder

توضع البودرة ثم تليها بطلاء الكولمك



Viteligo




- ◆ Topical steroid
- ◆ Ultra Meladine paint

من مران يوميا ثم يعرض للشمس في الصباح والمساء

- ◆ Hostacortin tab. (if generalised & active)

3 مرات يوميا



Alopecia

complete baldness

stress

R/ 9
from intr
perm

VH

De

R
و
ن فارلين

Skin p

R
R
R

Miscellaneous

Alopecia areata

بالتشخيص الذاتي؟؟؟

complete balded patch usually scalp or beard area with normal skin

وده اللي يفرقها عن ال tinea capitis

أهم حاجة في العلاج هو الهدوء لأن سببها الأساسي هو ال stress

R/ Betaderm cream

ولكان مرتين يوميا... أو يحقن بـ ١ سم نقطة انسولين intradermal بعد
عشان لو اتحقن subcutaneous كيعمل permanent damage
لل hair follicle

Vitiligo

Depigmented patch of normal skin (normal hair & sensation)

وده اللي يفرقها عن ال leprosy

R/ Ezalinc paint or ultra melanin paint

مع موصى قبل التعرض للشمس بنصف ساعة ثم التعرض لها لمدة
نصف ساعة صباحا مع تجنب شمس الظهيرة مع حماية الشفايف بـ فازلين

لو مجابش نتيجة أو الإصابة واضحة رجع الجسم يبقى العلاج :
Puva جلسات طويلة

Skin pigmentation

R/ Spotless eva soap

صباحا و مساء

R/ fair & lovely cream

صباحا

R/ beauty gel or leuco c cream

مساء

متوط الشعر

R/ for hair and nail capsule

كبسولة بعد الغدا

R/ hair stabil shampoo

مرتين اسبوعيا

R/ herbamix oil or tinoscelbine lotion

بعد الغسيل

تقطف الشعر

R/ for hair and nail capsule

كبسولة بعد الغدا

R/ Porte care shampoo

مرتين اسبوعيا

قشرة الشعر

R/ Dandriner or Nizoral shampoo

مرتين اسبوعيا لمدة شهر ثم مرة اسبوعيا لمدة 6 شهور

Xanthelasma

yellowish plaque usually at inner canthi

المشكاه منس فيها خالص

المشكاه ان العيان لازم يعمل Lipid profile ويقيظ السكر ودهون بالدم

وعلاجهما معا تكشال بالليزر

Kelloid

R/ Dermovate cream

وهان تم يغطي بكريم لأستين 8 ساعات

R/ Nevea or panthenole cream

مرتين يوميا

Sun screen

R/ luna 35 or Nivea sunblock 6 or 12 sunblock

قبل التعرض للشمس بربع ساعة

R/ uve block 80 cream

للبيضة الدهنية

◆ في الالتهابات نستخدم كريمات ولا نستخدم مراهم

◆ استخدام ال local corticosteroids في الصدفية جريئة

◆ لو لقيت pityriasis alba on the face

لازم تطلب stool analysis و cbc عشان غالباً يكون معاه

parasitic infection

ملاحظة ع السريع

Miscellaneous :

To avoid hair loss:

روشتة لتجنب سقوط الشعر

R/ Hair stabil shampoo 1x1

R/ Tonoscalpine lotion 1x1

R/ For hair, nail 1x2




Hair loss :

روشتة لاعادة الشعر المفقود

To regain hair

R/ Rehair forte, hair gain,

R/ rehair back 1x1x120



Remove excess hair:

روشتة لازالة الشعر الزائد

R/ No hair or one cream 1X1



Dandruff:

روشتة لازالة القشرة

R/ Nizapex shampoo 2 times weekly

R/ Rootage cream every 2 day



Bed sores:

روشتة لعلاج قرح الفراش

R/ Septocid solution 1x2

R/ Dermazole spray 1x1

R/ Baneocin powder 1x2



Rosheta

Lice:

روشتة للقمل

R/ (Lice)

one ho

Skin

الجلدية

R/ sp

R/ Lu

R/ fa

Scar

ندبات

R/ b

R/ c

Ato

جلدية

R/

R/

R/

Ec

fu

R/

R/


R/

الله

Lice:

روشته للقميل


R/ (Lacid, quick, no-lice) lotion for one hour then wash



Skin pigmentation:

روشته لعلاج البقع الجلدية

R/ spotlesseva soap 1x2
R/ Lucocidr 1x1 at night
R/ fair& lovely cream 1x1



Scars:

روشته لتقليل الندبات

R/ beauty gel 1x1 at night
R/ contractubex gel 1x2



Atopic eczema

روشته حساسية جلدية

R/ betaderm cream 1X3
R/ Allerfene tab 1X2
R/ Kenacort vial 1X2



Eczema with bacterial or fungal infection

روشته لعلاج الاكزيما

R/ Kenacomb cream 1X3
R/ Ibdroxil 500 cap 1X3
R/ Telfast tab 1X2



Sunscreen prescription

روشتة للوقاية من الشمس

R/ Luna 35 lotion



Prescription for acne

روشتة لعلاج حب الشباب

R/ Sacnel soap 1X2

R/ Erytin gel 1X3

R/ Vibramycin cap 1X3



Scabies:

روشتة لعلاج الجرب

R/ Sulphur soap (rub body with tough loaf then wash) 1X1

R/ Eurax lotion (1x1x3)

R/ Scabine cream 1x2

R/ Iverzine tab 3 tab every 10 days




Psoriasis:

روشتة لعلاج الصدفية

R/ Topical steroids (betnovate) 1x2

R/ Emollient (calamine) lotion 1x2

R/ Vit D, tar, anthraline



Black halo around eye:

روشته لعلاج الهالات السوداء حول العين

R/ Shade out cream 1x2

R/ Focus cream 1x2

**Prescription for tenia**

روشته لعلاج التينيا

R/ Ultragriseofulvin tab 1X2

R/ Nizoral shampoo 1X1

R/ Lamisil cream 1X2

**Prescription for nail fungal infection**

روشته لعلاج العدوى الفطرية بالانفطر

R/ Lamisil tab 1X2

R/ Trosyed nails solution 1X3

**Athletic foot fungal infection between toes**

روشته العدوى الفطرية بين الاصابع

R/ Cansten solution 1X3

R/ Miconaz cream 1X3



Some diseases with pictures and treatment

impetigo contagiosa الحصف

1- treatment of pediculosis, scabies at first

2- local:

- removal of the crusts by gentle wash by soap, water
- K^+ permanganate 1/5000 every 2-3 hs (drying lotion)
- antibiotic cream (gentamycin)

3- systemic antibiotics in sever cases

Ecthyma الاكثيمة

Topical, systemic antibiotics + antiseptic wet compresses to remove crusts

Erysipelas, cellulites الحمرة

- 1- bed rest with symptomatic treatment
- 2- systemic antibiotics : penicillin G (600000 units IM) twice daily till healing then once daily for 5 days (to decrease recurrence). – in allergic patient use other broad spectrum antibiotic like erythromycin

Fruncle(boil) الخراج

- topical, systemic antibiotics
- hot compresses

carbuncle الجمرة

- penicillin G (0,4 million units/ d)
- topical continuous warm compresses



Skin T.B الدرن الجلدي

Ttt of cutaneous T.B : for 1 year with 2 or three combined drugs

1- medical: 1- INH (isoniazide):

(5 mg/kg/d) for child (300 mg/d) for adult

2- Rifampicin: 10 mg/kg/d for child (600 mg/d)

3- ethambutol: 15 mg/kg/d orally

4- pyrazinamide: 30 mg/kg/d

5- streptomycin: 1 gm/ d (30-40 d)

6- P.A.S.A 10-20 gm/d

2- surgical:- excision of small lesions of lupus vulgaris or warty T.B -debridement of scrofuloderma

Leprosy الجذام

Treatment of leprosy (multidrug therapy):

- Dapson (100 mg/d) at home

- Rifampicin: 600 mg once monthly (taken under supervision)

- Clofazimine : 50 mg/d, 300 mg as single dose every month

1- paucibacillary leprosy: Dapson + Rifampicin (for 6 m)

2- multibacillary leprosy: Dapson + Rifampicin+ Clofazimine(at least 2 y or until smear is - ve)

Pityriasis versicolor النخالة المبرقشة

(1)topical:-alcoholic white field's lotion.

-sodium hyposulphite 30%.

-imidazole (esp. Ketoconazol shampoo(scalp&body).

-selenium sulphate 2%.

(2)systemic:-ketoconazole: 200mg/d for 10d.

-itraconazole: 200mg/d for 7d.

-fluconazole: 150mg once weekly for 2-3 weeks.



Fungi, Tinea capitis تنفيا الرأس والجسم والقدم**1) topical:****-white field(ointment)(twice daily for scalp.)**

(3%salicylate+6%benzoate+lanoline 10%& up to 100 by vasline)

-ketoconazole& clotrimazole cream.**(2)systemic:-****-griseofulvin****-triazole, fluconazole.(itraconazole orally 200 mg/twice daily for one week every month for 2 months).****-terbinafine:orally, 250mg/d for 2 w (t.unguim).****Griseofulvin:****-fungistatic&bacteriostatic.****- dose:- 1(tab.) For each 10 kg body weight. (tab= 125mg).****-in divided(2-3)doses after meals.****-duration:-t. Capitis:6-8w****-t.pedis:4-6w.****-t.unguim:6-8 months (nail plate is avascular)****-s.e:- hepatotoxic -exacerbate SLE****Ketoconazole: (200-400mg/d for 10d.(adults)).****Uses: esp.for onychomycosis&pityriasis versicolor.****Cadidiasis (moniliasis): المبيضات****Prophylactic:avoid predisposing f.****Therapeutic: (1)local:(muco – cutaneous form).****1-nystatin: (gel,cream,oint,pessaries,powders).****2- imidazole:clotrimazol(canesten)cream.****3-castellani's paint or gentian violet 1-2%.****(2)systemic cases:****1- amphotrecin B,I.V infusion.****2-oral→fluconazol(150mg one time only).****→itraconazol(200mg twice daily for one day).****→ ketoconazol.**

Herpes simplex: الهربس

Specific:- acyclovir:-200mg 5times/d for 5d.
-cream:5times/day.

General:-

- systemic:-analgesic:NSAID in 1ry infection
- antibiotics:in2ry infection.
- topical:-gentian violet 1%:in vesicular stage.
- antibacterial cream: in crusted stage.

Chicken pox (varicella) الجدري الكاذب

- mainly symptomatic.
- antipruritic:calamine lotion.
- antihistaminics.
- antibiotic(for2ry infection).

H.zoster الهربس زoster

- Acyclovir: 800mg 5times/d for 7-10d
- analgesics
- AL acetate (drying antiseptic lotion)for vesicular lesions.
- tricyclic antidepressant for post- herpetic neuralgia

(5)condylomata acuminata(genital warts) أورام لقمية

- (1) light electrocautry&curettage(scar→↓recurrence).
- (2) cryosurgery:(no scar→↑recurrence)
(CO₂ snow).

(3) chemical:(keratolytic paints) -salicylic acid&lactic acid(5-20%).

(4) laser.

(5)special types:

(a)condyloma accuminata: podophyllin resin 25%(cytotoxic).

(نضع فازلين علي الجلد الطبيعي حتي لا يتأثر - يغسل بعد

6-2 ساعات)

(b)plane warts→topical tretinoin.

(c)planter warts:→salicylic acid 4%

→formalin lotion 3-6% soaks for 20 min.

Daily



General: 1- ttt of all family members
2- disinfection of cloths& bed sheets
(boiling, ironing).

(II) specific: (1) topical:

All ttt must be applied to the whole body from neck down after hot bath é hard brush (or loufa)
و بعد نهاية الاستحمام يأخذ المريض حمام دافئ مرة أخرى



Drug	Concentration	Duration
Permethrin	-adult: 5% -child: 2.5%	One night
Sulphur ppt	-adult: 10% -child: 5%	3 nights
Gamma benzene hexachloride	1%	One night
Benzyl benzoate	25%	2 nights

(2) systemic:- antihistaminics (for itching).
- antibiotics (in 2ry infection).
- intralesional steroid (nodular scabies).

Pediculosis capitis القمل	Pediculosis corporis	Pediculosis cruris
Treatment: - Local hygiene. - Benzyle benzoate emulsion 10%. - Benzyle hexachloride 1% - يوضع لولا يغسل صباحا 1% - Permethrin 1% - يغسل بعد 10 دقائق - Antibiotics for 2ry infection. - Remove nits é fine comb. - Applying a dilute vinegar Solution to the scalp.	Local hygiene bathing → antipruritic cream Clothing: → dusted é 10% D.D.T. in tale powder. → ironing after boiling.	Local hygiene → shaving of pubic hair. Benzyle benzoate emulsion. Gama.B. hexachloride. Permethrin.



molluscum contagiosum المليساء المعدية

- (1) cryotherapy (liquid nitrogen)
- (2) curettage: by a sharp curet
- (3) light electrocautry.
- (4) topical tretinoin.
- (5) expressing the contents with forceps

**Dermatitis** التهاب الجلد

(a) ttt or removal of the cause: e.g irritant, allergens, infection, v.v.

(b) systemic: 1-antihistamincs (for itching).

2- antibiotic (for 2ry bacterial infection).

3-steroids (in sever cases).

4-PUVA therapy in atopic dermatitis

(c) topical: 1-calamine lotion if not oozing (soothing).

2-kpermanganate 1/5000 to 1/10000 (if vesicular & weeping).

3-steroid → cream (in subacute cases).

→ ointment (in chronic cases) (good penetration)

**Urticaria** حساسية الجلدTreatment:

(1) avoidance & ttt of cause (if possible).

(2) antihistaminics.

(3) adrenaline S.C (0.5 ml of 1/1000 solution) in oedema of glottis.

(4) calamine lotion (local soothing).

(5) corticosteroids: systemic in sever cases (short course)

**erythema nodosum** الحمامى العقدية

(1) analgesic (aspirin 600 mg/ 4h) & N.S.A.I.D

(2) bed rest.

(3) treatment of the cause.

(4) ichthiol oint. 5% in calamine lotion (soothing).

**pityriasis rosea** النخالة الوردية

Ttt: (1) reassurance.

(2) antihistaminics (for itching).

(3) calamine lotion (for pruritus)



pityriasis rubra pilaris النخالة الحمراء

Ttt :- topical steroid & salicylic acid (keratolytic).
- methotrexate. - vit. A (high dose)

Psoriasis الصدفية

(a) topical:

(1) corticosteroid : oint or intralesional in localized types.

(2) crude coal tar : (2-5%) keratolytic.

(3) salicylic acid : (3-5%) keratolytic.

(4) anthralin (0.1-1%).

N.B: goekerman's technique: crude coal tar 2% oint + U.V.R (twice weekly).

(b) systemic:

(1) methotrexate: in 1- extensive cases

2- erythrodermic type.

Dose : (5mg /12h , 3 doses) every week

(2) etretinate :in - erythrodermic psoriasis (1mg/kg/ d).

(3) cyclosporine A:- immunosuppressive.
-(2.5-5 mg/ kg/ d)

(4) photo chemotherapy (PUVA) : psoralen (10 mg tab. orally) 2h UVA exposure (2-3 times / w)

Lichen planus الحزاز المسطح

(a) topical :

(1) antipruritic oint.

(2) steroid (tramcinolone acetonide)
in L. Hypertrophicus.

(b) systemic :

(1) antihistaminics.

(2) tranquilizers.

(3) steroids in:

A) acute generalized cases.

C) sever itching.

B) L.P of nails.

D) ulcerative oral lesions.



Rosacea

acne vulgaris

(a) systemic

(1) antibiotic

erythromycin

- minocycline

(2) hormone

→ ↓ sebum

(3) anti-inflammatory

(a) cyclosporine

pregnancy

Dose : 1 mg/kg

days) +

(3 weeks)

(b) spiramycin

(b) topical

(1) sulphur

(2) benzoyl peroxide

(3) retinoids

(4) topical antibiotics

(5) azelaic acid

(c) other

(1) comedone extraction

(2) X-ray therapy

(3) ttt of acne

seborea

Local treatment

A- shampoo

(1) oral antibiotics

(2) shampoo

or ketoconazole

B- topical

(1) oral antibiotics

(2) shampoo

or ketoconazole

Disorders

(1) acne vulgaris

used.

(2) acne vulgaris

(3) steroid

(4) acne vulgaris

(5) acne vulgaris

(6) acne vulgaris

(7) acne vulgaris

(8) acne vulgaris

acne vulgaris: حب الشباب

(a) systemic :

- (1) antibiotics :- tetracycline or erythromycin (1mg/d for 6 mon).
- minocycline 200mg/d.
- (2) hormones : oestrogen (esp. In women)
→ ↓ sebum production).

(3) anti-androgen:

- (a) cyproteron acetate (C.I in males & pregnant females).

Dose : 100mg/d from 5th day of menstruation to 14th day (10 days) + 50mg ethinyle estradiol from 5th to 25th d.
(3 weeks) of each cyle for 3-12 months.

(b) spironolactone.

(b) topical :

- (1) sulphur ppt 2% in calamine lotion.
- (2) benzoyl peroxide 5% : bacteriostatic.
- (3) retinoic acid 0.05% : comedolytic.
- (4) topical antibacterial : erythromycin , tetracyclines.
- (5) azelaic acid 20% .

(c) other lines :

- (1) comedo extraction.
- (2) X-ray therapy.
- (3) ttt of residual scarring by : dermabrasion or co₂ laser.

seborrhea & seborrhoeic dermatitis الزهم

Local ttt :

A- shampooing the scalp with :

- (1) ordinary bland shampoos
- (2) shampoos containing selenium sulphide or ketoconazole.

B- topical stroid.

Discoid lupus erythrematosis الذئبة القرصية

- (1) avoid sun exposure : sun screen should be used.
- (2) antimalarial : chloroquine (250 mg/d.).
- (3) steroids : topical & / or intralesional



Systemic L.E: (S.L.E) الذئبة الحمراء

(1) corticosteroids (high doses) :

Prednisone : 120-200mg/d.

(2) antimalarial : alone or é steroids

Millaria rubra الدخنية الحمراء

(1) avoid predisposing F. (sweating , excessive clothing).

(2) calamine lotion – simple or
- containing 1 or 2% sulphur.

(3) systemic : - antihistaminics (oral).
- antibiotics (2ry infection).

Alopecia الثعلبية

(1) reassurance

(2) ttt of PPT factors.

(3) interalesional (I.D) corticosteroids.

(4) topical sensitizer (diphencyprone).

(5) anthraline (locally).

(6) P.UVA:

في الحالات المستعصية

(7) minoxidil : (direct V.D) 1% solution
(rehaire).

vitiligo البهاق

(spontaneous repigmentation may occur).

(1) P.U.V.A: oral psoralen (0.3 - 0.6 mg/kg)

2h UVA exposure.

(2) topical psoralen : in localized forms.

Bullous Pemphigoid الفقاع الفقاعي

(1) corticosteroids (high doses) :

Prednisone

(2) topical corticosteroids

(3) immunosuppressive drugs



روشتاتولوجي

Roshtatology

Skin allergy, sun burn

روشتة حساسية الجلد

-antihistaminic:

1st generation pass BBB


R/ avil, allergex, allergyl tab, cream
1x3 (cause sleep)



2ND generation: does not pass BBB

-loratidine, cetirizine, desloratidine, fexofenadine (do not cause sleep)

R/ desa, loratidine, zyrtec, histazine, cetrak tab 1x2



-corticosteroids R/ (betaderm or betamethasone cream 1x3)

-calamine lotion, calamyl lotion 1x2

Drug allergy:

روشتة علاج حساسية الادوية



واحد فجأة وقع من ملونه و جلده ظهر فيه حساسية حمراء ويمكن يكون مش قاتر ياخذ نفسه وعنده ضيق تنفس شديد لو كانت هذه الاعراض بعد اخذ دواء فالمرضى ده عنده حساسية للدواء



يعطى المريض هذه الامبولات فى الحال:

-cortisone R/ (solu-cortif, hostacortine, fortacortine) amp

-antihistaminic: R/ avil or fenstil amp

-SC adrenaline R/ in severe cases




Corticosteroids: الكورتيزونات

تستخدم كمضادة للالتهاب والحساسية و الصدمات و مقلدة للمناعة في الأمراض المناعية و تستخدم في تعويض نقص الكورتيزون في الجسم

Mechanism of action:

It inhibit phospholipase A2 enzyme



Uses: استخداماته

- Replacement therapy in addisson disease, crises
- anti inflammatory , anti allergic, anti shock
- immuno-suppressor in transplantation, immune diseases
- suppress scars , keloid formation

Side effects: اعراضه الجانبية

- nervousness, insomnia, hypertension, Hyperglycaemia,
- hypocalcaemia, ↓K, thromboembolic, teratogenic
- osteoporosis, muscle weakness, delay wound healing
- edema, weight gain, moon face
- cataract, GIT bleeding, decrease immunity
- if stopped suddenly → addisson crises

الروشتة:

R/ Soluocortif or dexamethazone
or fortacortin amp

امبول وريد الان

R/ hostacortin or deltacortin tab

قرص 3 مرات في اليوم وتوقف الجرعة

تدريجيا

R/ phenadone syrup

شراب 3 مرات يوميا وتوقف الجرعة تدريجيا



Colored atlas of dermatology



erysipelas



sycosis barbae



Cellulitis



furuncle(boil)



carbuncle



Lupus vulgaris



diascopy test



scrofuloderma



Warty TB



lepromatous leprosy



tuberculoid leprosy



Tinea capitis



favus



kerion



Tinea corporis



tinea cruris



tinea vaginum



Tinea pedis



pityriasis versicolor



Neonatal herpes



Conjunctivitis



Candidiasis (monilia)



Herpes simplex



herpes genitalis



Neonatal herpes



varicella (chicken pox)



herpes zoster



Common warts



plane warts



planter wart



genital warts (condylomata acuminata)



Candidiasis (moniliasis)



Herpes simplex


herpes genitalis



Neonatal herpes

varicella(chicken pox)

herpes zoster



Common warts



Psoriasis



Lichen planus



Pityriasis rosea

pityriasis rubra pilaris



Discoid lupus erythematosus



Written prescriptions

روشتات طبية مكتوبة

في هذا الجزء نستعرض مجموعة من المصطلحات التي يمكنك من قراءة
روشتات الادوية والمختلفة وطريقة عملها واستخداماتها وجرعاتها
ونستعرض ايضا مجموعة من الروشتات المصورة المكتوبة بخط اليد وشرحها
للتدريب على قراءة الروشتات

Treatment of any patient includes: علاج اي مريض

- symptomatic treatment: of symptoms like hypotension, fever, vomiting
- causative treatment : of cause like infection
- psychological treatment : like in chronic diseases
- preventive treatment : to prevent diseases and infection of others

General review of pharmacology terms :

تفيد في قراءة روشتات الادوية المختلفة

1-pharmacokinetics:

absorption, distribution, metabolism, biotransformation, excretion of drug

2-pharmacodynamics:

mechanism of action, effect of drug

3-pharmacotherapeutics:

Uses of drugs

4- Pharmaceutical process:

presenting the active ingredient in a form to be well absorbed and reach blood

5- Pharmacogenetics:

The study of the inheritance of certain interactions from drugs on the human body.

6- Forms of drugs:

drugs may be given to patient in a lot of forms like syrup, tablet, suppository or ampoule

7- receptor:

the place where drugs act

8- Affinity:

the ability of drug to attach to receptor

9- efficacy:

the ability of drug to give effect

10- Agonist:

the drug which has good affinity and efficacy to receptor so give the action of receptor

11- antagonist:

the drug which has good affinity and bad efficacy to receptor so doesnot give the action of receptor

12- enzyme inducer:

drug increase the effect of liver enzymes like cytochrome 450 so increase drugs metabolism (e.g. phenobarbitone, rifampicin)

13- enzyme inhibitor:

drug decrease the effect of liver enzymes like cytochrome 450 so decrease drugs metabolism (e.g. estrogen, chloramphenicol)

14- therapeutic dose:

the dose of treatment

15- maximal tolerated dose:

the maximum safe dose

16- initial dose:
dose of starting treatment

17- maintenance dose:
the dose of continue treatment

18- fatal dose:
the dose that lead to death

19- LD 50:
dose that kill 50% of experimental animals

20- ED50:
dose that treat 50% of experimental animals

21- therapeutic index:
 LD_{50}/ED_{50} . the higher the index the more save is the drug

22- plasma half life($T_{1/2}$):
The time it takes for a drug concentration within the body to be reduced by one half of its original amount.

23- supersensitivity:
the drug gives more effect than normal in some patients

24- tolerance:
reduced effectiveness of a drug after repeated administrations (e.g. morphine). So there is need to increase the used dose of drug

25- idiosyncrasy:
An unusual individual reaction to a drug due to defect in some enzymes

26- teratogenic:
drug causes fetus anomalies

27- carcinogenic:
Drug causes cancer

28- cytotoxic:
drug causes cell damage (e.g. streptomycin damage 8th cranial nerve)

29- addition:
adding two drugs together give equal effect of sum of their action

30- synergism:
adding two drugs together give more effect than the sum of their action

31- potentiation:
One drug of no action increase the effect of another drug when they are added together

32- Placebo:
A form of treatment that is meant to have no effect on the user, yet imitates the contrasting drug in every way. This is also known as a dummy

33- Prodrug:
A substance with little action that becomes more active after being in the body.

34- chelating agent:
a ligand that forms chelates with toxic substances to stop its action (e.g. EDTA for Ca, pencillamine for copper)

35- inotropic:
drug increase the force of contraction of the heart

36- chronotropic:
the drug that increase heart rate

37- dormotropic:
drug increase conductivity of the heart

38- diuretics:
Drugs that increase loss of water from body

39- toxicity:
acute: due to high drug dose
chronic : due to gradual accumulation of drug

40- PH of blood:

7.35-7.45

acidosis: decrease PH of blood less 7.35

alkaosis: increase PH more than 7.45

respiratory: means there is problem in respiration

metabolic: the cause is a problem other than respiration

41- arrhythmia:

Abnormal heart rate (irregular heart rate or tachycardia or bradycardia)

42- route of administration :
the way of giving drug to the patient

43- indications:

Uses of drug

44- contraindication:

The cases in which the drug is forbidden to use

45- side effect:

undesired effects of the drug that may occur or not

46- Habituation:

A psychological feeling of need for a certain drug due to its effects on the body.

47- dependence:

A physical need to maintain administration of a specific drug in order to avoid withdrawal symptoms.

48- Addiction:


A situation where use of a drug has changed the behavior and methods of the user, creating a need for it in order to continuing use or to obtain more of it.

49- Anesthetic:

A medication that causes loss of sensation. This is sometimes used to alleviate pain or for loss of consciousness for surgical procedures.

50- Generic Drugs:

Drugs that have exactly the same ingredients and effectiveness as another, named drug or formulary.



Imaxidex
الروشتة الاولى

Izrtec

الروشتة الاولى

الروشتة :


R/ Isoptomaxidex eye drops

قطرة تحتوى على كورتيزون مضاد للالتهابات والحساسية

R/ zyrtec tab

مضاد للحساسية

الروشتة الثانية

الروشتة :R/ Aclasta

يقلل من تكسير العظام وخروج الكالسيوم منها في امراض العظام المختلفة

R/ maxi-cal

يحتوى على كالسيوم يزيد من قوة وتكوين العظام

R/ bone care

يحتوى على كالسيوم وفيتامين د ليزيد من الكالسيوم وقوة العظام

Carbamide 5 tubes
 olive oil 20 ml
 Castor oil 30 ml
 Hair tone 10 Gm
 Vividol hair Cr.

الروشتة :R/ carbamide

يستخدم لقشرة الجلد والجلد الجاف والالتهاب

R/ olive oil

زيت زيتون للحفاظ على الشعر والجلد

R/ castor oil

زيت خروع للحفاظ على الشعر

R/ hair tone

لتقوية الشعر وتغذية

R/ vividol hair cream

لتقوية الشعر ومقاومة تقصفه

الروشتة الرابعة

R/ R/ Amrizele N. v. v.
R/ Fusiderm
R/ Petro
Icc

الروشتة :

R/ amrizele N


قاتل للبروتوزا والبكتريا الا هوائية

R/ Fusiderm

مضاد حيوى موضعى

R/ Petro

لتقلصات ووجع البطن



الروشتة :

R/ Liometacin amp

مضاد للتورم والالتهابات

R/ Sirdalud 2mg tab

بامط للمضلات

R/ Reparil gel

مضاد للتورمات

R/ Bristaflam tab

مسكن خافض للحرارة مضاد للالتهاب

R/ Zantac 150 tab

مضاد للقرحة

R/ Felden flash tab

مسكن ومضاد للالتهاب

الروشتة السادسة

El Sherbiny
Int. Medicine
N. R. C.

المستشفى الشروبيني
مركز الباطنة و القلب - طب عين شمس
استشار الباطنة العامة
والجهاز الهضمي والكبد
بالمركز القومي للبحوث

أحمد عبد الله
12/5

R/ Examid 5/10
مضاد للطفيليات
Megavit zinc
مكمل
Oravit 5/1000 mg
فيتامين

زجاجة من السرموم بيري
درست لـ 12
مركز عين شمس
أحمد عبد الله

الروشتة :

R/ examide

مدر للبول

R/ Megavit zinc

مقوى يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والزنك

R/ oravit B 12 tab

يحتوى على فيتامين بى 12 يقوى الاعصاب ويستخدم مع الانيميا

R/ human albumin

البيومين بشرى لعلاج نقص البروتينات فى الجسم

الروشتة السابعة

R/

R/ Rimactane 300 → Cap

ك حيا حياً ثم 1/2 ك مراراً.
10 مرة خالية

R/ septrin 500 → Tab.

15 / 15
15 / 15

R/ Newclav 642 → SP

الروشتة:

R/ Rimactane 300 cap

مضاد حيوى يستخدم خاصة مع الدرن

R/ septrin 500 tab

مضاد حيوى يحتوى على السلفا

R/ newclav 642 susp

مضاد حيوى يحتوى على الاموكسيسيلن والكلافولونك اسيد

13-7-14
R/ urivin eff sachet
فوار ضد الاملاح والنقرس

R/ No uric tab 100mg
مضاد للنقرس وتكوين اليوريك اسيد


الروشتة:

R/ urivin eff sachet

فوار ضد الاملاح والنقرس

R/ No uric tab 100mg

مضاد للنقرس وتكوين اليوريك اسيد



الروشتة :

R/ Hibiotic 1g

مضاد حيوي


R/ Cetal tab

مسكن وخافض للحرارة

R/ Otal drops

قطرة مسكنة

الروشتة العاشرة

الروشتة :R/ SMR tab

باسط للمعضلات ومسكن للآلام

R/ Milga tab

لآلتهاب الأعصاب ونقص فيتامين بى 12

R/ Anticox II amp


مسكن للآلام وخافض للحرارة ومضاد للآلتهاب

R/ Pain free gel

مسكن موضعى للآلام ومضاد للآلتهاب

R/ Thiotex 300 caps

مضاد للاكسدة والتهابات الأعصاب



الروشتة:

R/ tribune

للقولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي

R/ Mentha

لعلاج الغازات والانتفاخات

R/ Napizole

لعلاج الحموضة وقرحة المعدة


R/ Ciproquin

مضاد حيوي

R/ fladazole

مضاد للاميبيا والبروتوزوا

الروشتة الثانية عشر



الروشتة :

R/ Uithirone 500 cap

مضاد حيوى

R/ Amocerebral plus cap

لتقليل الدوار

R/ Cafamol extra tab

لعلاج البرد والانفلونزا وارتفاع الحرارة والالم

R/ Bronchopro syr

لعلاج الكحة بالبلغم

الروشتة الثالثة عشر

R/ Librax TD
 مضاد للتشنج

R/ Lantanon CP
 مضاد للتشنج

R/ donalase S. TD
 مضاد للتشنج

الروشتة :

R/ librax tab

لعلاج القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي

R/ Lantanon

مضاد للتشنج

R/ donalase

لعلاج مغص وتقلصات الجهاز الهضمي

R/R calamyl (O) (only)
 (5) (10) (15) (20) (25) (30) (35) (40) (45) (50) (55) (60) (65) (70) (75) (80) (85) (90) (95) (100)
 R/R phenergan dy
 (5) (10) (15) (20) (25) (30) (35) (40) (45) (50) (55) (60) (65) (70) (75) (80) (85) (90) (95) (100)
 R/R fenistil dy
 (5) (10) (15) (20) (25) (30) (35) (40) (45) (50) (55) (60) (65) (70) (75) (80) (85) (90) (95) (100)
 R/R Lactulose 4

الروشتة :

R/ calamyl lotion

دهان للحساسية والحكة

R/ Phenergan

مضاد للحساسية و الدوار

R/ Fenistil drop

مضاد للحساسية

R/ Lactulose syr

مضاد للاسهال

Flucamox 500ml 7
over 12/05/20

Mucosol 100ml
500 x 2

Rhinostop
500 x 2

Oxymet 0.025%
500 x 2

Dolphin 12.5
500 x 2

الروشتة :

R/ Flucamox 500 vial

مضاد حيوى

R/ Mucosol syr (ped)

مذيب وطارد للبلغم

R/ Rhinostop (drops)

مضاد للحساسية والرشح والاحتقان والالام

R/ Oxymet 0.025 % (drops)

مضاد للرشح والاحتقان

R/ Dolphin 12.5 (supp)

مسكن خافض للحرارة مضاد للالتهاب

الروشتة السادسة عشر

R/ Genuphil caps

علاج خشونة المفاصل والحفاظ على مكونات المفصل

R/ Avosoy caps

علاج خشونة المفاصل والحفاظ على مكونات المفصل

R/ Harpagin caps

علاج زيادة حمض اليوريك بالجسم

R/ Sulphax gel

مضاد حيوى يحتوى على السلفا

R/ Proximol eff.

فوار مطهر لمجرى البول ومذيب للاملاح

الروشتة :

R/ Genuphil caps

للعلاج خشونة المفاصل والحفاظ على مكونات المفصل

R/ Avosoy caps

للعلاج خشونة المفاصل والحفاظ على مكونات المفصل

R/ Harpagin caps

للعلاج زيادة حمض اليوريك بالجسم

R/ Sulphax gel

مضاد حيوى يحتوى على السلفا

R/ Proximol eff.

فوار مطهر لمجرى البول ومذيب للاملاح

روشتاتولوجى

Motilium susp
٩٥ نسلمت الفم قبل الرضاعة أربع ساعة ٣ مرات

Tempria syrup
٩٥ نسلمت الفم كل ٤ ساعات، ٥-٥ مرات يومياً

Sinadry syrup
٥ نسلمت في الفم ٣ مرات يومياً

Sigmazidim Vials
تحل الحقنة في ٥٠ نسلمت ماء حقن ونكص
٥٠ نسلمت في الحصل / ١٢ ساعة لمدة ٦ أيام

الروشتة :

R/ Motilium

للمغص واضطرابات الامعاء

R/ Tempria

مسكن خافض للحرارة مضاد للالتهاب

R/ Sinadry

للكحة الجافة

R/ sigmazidim

مضاد حيوى

الروشتة الثامنة عشر

R/ Dogmatil 250 mg

كوبيليكس

Akineton 250 mg

كوبيليكس

Aspidin 250 mg

كوبيليكس

Seroxat 250 mg

كوبيليكس

الروشتة:

R/ Dogmatil

مهدىء لعلاج الفصام و الهياج العصبى

R/ Akineton

يستخدم لعلاج مرض باركنسون ويستخدم هنا لمنع التشنجات


R/ aspidin children

لمنع الجلطات

R/ seroxat

مضاد للاكتئاب والقلق

الروشتة التاسعة عشر

الروشتة :R/ Septrin

مضاد حيوى يحتوى على السلفا

R/ Vegaskine

مسكن خافض للحرارة مضاد للالتهاب

R/ Abimol

مسكن خافض للحرارة

الروشتة العشرون

R/ - Amaryl 1-2 mg Tab.
 - قهوة / قبل الاكل / والفا / بيلة
 - Biovit B12 - P
 - ريفيت كل ثمانية ايام
 - Ferrocil cap.
 - بيولا / بعد الافطار / يوم
 - Napizole 200 mg cap x
 (or) Magzilon Symp. ✓
 - ترجع المريض بعد 7 ايام من العلاج / قبل كل وجبة
 - بيلة / حادة / عقول النوع
 Zyloric 300 mg wk

الروشتة :

R/ Amaryl

لعلاج مرض السكر النوع الثاني

R/ Biovit B12 amp

فيتامين بى 12 لعلاج مشاكل الاعصاب والاتيما

R/ Ferrocil

فيتامينات وحديد تعمل كمقويات وعلاج للاتيما

R/ Napizole

لعلاج الحموضة وارتجاع المريء وقرحة المعدة

R/ Zyloric

لعلاج النقرس وتقليل نسبة حمض اليوريك بالدم

It is more blessed to give than to receive.

mistakes

PERFECTION

always
starts with
MISTAKES

Common mistakes of
prescriptions

اخطاء الروشقات المشهورة

١/

Nasal drops contain decongestants

زي مثلا

Afrin-Balkis-Nasostop-Nasotal-Rhinex

لا بد أن تكون فترة الاستخدام القصوى للمرة الواحدة لا تتعدى من 4 أيام إلى ٧ أيام

لأنك كذا تتدخل العيان في **Rebound Congestion**

"احتقان عكسي"

السبب:

إنك بتعمل بال **Local decongestant****Low bl. supply to nasal epithelium**

علاوة على ،

Chemical Rhinitisطبيب لو كنت لسه محتاج تكمل كام يوم ب **Decongestants**

كمل .. بس:

Oral decongestant

٢/

المسهلات في الحوامل

مش أي مسهل تكتبه للحوامل خاصة اللي فيه مادة ال

anthraquinonهيفل عصلات الرحم تنقبض ويمكن الأمور توصل ل إجهاض .. ولذلك ممنوع طبعا ،
ولو الحكاية ضروري قوي قولها تشرب لبن كثير ، ولو لسه تاتي يبقى أي حاجة تحتويعلى مادة ال **bisadocodyl**

زي بيساديل أو مينالاكس

وعموما أفضل مسهل للحامل هو ال

Lactulose

٣/

اوع تدياوع تدي أي مركب به زنك لمريض عنده **psychosis**

اوع تدي أي نواء به حديد لمريض كبد/

اوع تدي حديد مع **vit E**

اوع تدي أي مسكن لمريض كبد باستثناء الباراسيتامول ، مثلا : الهيپامول/

اوع تدي أي مسكن لمريض الربو

"مسموح الباراسيتامول في بعض حالات الربو/ "

اوع تدي أي مسكن لمريض عنده مقص " لم يشخص مصدره " إلا لما تعرف مكان
المقص بالضبطلأعراض الزائدة والعيان ممكن يدخل مثلا في **masking** وتتأكد إنه مش زائدة حتى
لاتفجر الزائدة و يحدث **Peritonitis**

4/ مضادات الفطريات في الحمل

من أخطر وأبشع الأدوية التي ممكن تسبب تشوهات عند الجنين ،
وخاصة **Griseofulvin**
التي هوا في الصيدليات
Griseovin syrup
بيتكتب دائما في روصتة التينيا أساسي..
اوع تدي حامل دوا بيعالج الفطريات ..

5/

يا تحفظ اسم الدواء التجاري كويس وتكتبه كويس ف روصتتك يا متكتبوش من الأصل:
عندك 4 من أشهر الحاجات التي بتغلط فيها ك مثال:

furamebe والصيدلي يصرفها **furamipe**
genuofil وانت تقصد **genuphil**
duspataline والصيدلي يصرفها **duphaston**
Paxeladine وانت تقصد **piascledine**
وهكذا ...

6/

Diclofenac Na المسكنات التي تحتوي على
مثل ال:

Olfen-Declophen-Dolphen-Rheumafen-
Rhumaren-Voltaren
ممنوع وصفهم لهؤلاء:

1/

Hypertensive Patients

Fluid Retention لأن المسكنات المذكورة بتعمل

أفضل حاجة " **Paracetamol** " خليك ف السليم ، عندك ال

2/

Gastric Impairment أو أي **Peptic Ulcer** واحد عنده
والحل؟؟ هقولك عندك:

Declophenac K

زي

Dolphin-K -Oflam-Cataflam-Rapiflam

Gastric Side Effect Of Declo.Na عشان تتقلب على

3/

History of asthma with aspirin intake -

Lactating Women -Hepatic Impair -Acute rhinitis

أي أمبول

Hydroxycobalamine

بعض فيتامين بي 12

زي أمبولات ال

Neurovit-Neuroton-Neurobion-Tri-B

ممنوع تخطط معاهم أمبول يحتوي على

Declophenac Na

منعا من حدوث ترسيب

والمعطي الوحيد من القاعدة هو ،

Depovit-B12

أي معاه ديكلو فنيئات صوديوم زي أمبول الأولفين علاوي

18

وصف السلفا مع الهيكسامين:

خطأ رهيب ، بمعنى:

ممكنها إيه هوا الهيكسامين ؟ ، دا بيزازين سترات ، ودا مطهر معتق جدا لل الجهاز البولي الكلى

والمثاق والمسالك البولية في حالات الحصوات.

الهيكسامين ، بيتأكسد إلى الذهب ثم إلى حمض .. ونظرا لأن طبيعة السلفا ، حامضية .. فبقها

تترسب وتكون حصوات بسيطة ..

إن هنا يتوجب تغيير نوع ال anti-microbial

أو تغيير الفوار المذيب للحصوات ، خليك مثلا في ال Mg Citrate

وعموما ، يجب نصيحة أي مريض هياخذ سلفا ، إنه يكثر من الخضروات وشرب من ٢ ل ٣ لتر مياه يوميا .. لمنع ترسيب السلفا وتسهيل إخراجها ..

19

" Sine up & no flu & congestal " Under 1 Y

وبقوت المجموعة دي المفروض أنها ممنوعة قبل سنة ونص على الأقل لأنها تحتوى على

chlorphenramine maleate

وباختصار ، ممنوع ، استعمال مضادات الهيستامين بصيغها المختلفة في ال

Premature, Neonates

ولو استخدمتها ، هيجصل إيه يعني ؟

Severe CNS Excitation and high risk of Seizures

في حالة النقرس الحادة : *Allopurinol* ال : *Gout*

في نفس عندها .. قاعدة ثابتة ومتوارثة " قاعدة غلط طبعا " يقولك أي حالة نقرس

أدبها *Allopurinol*

اللي هو *Zyloric*

هذا كلام صحيح ، لكن .. دا في حالة ال *Stable gout patient*

وليس *Acute Gout Case*

إوع ثم إوع .. تدي أبداً *Acute* في *Zyloric*

هيزود الحالة أكثر من ال *Allopurinol* لازم

إيه ؟؟ طيب والحل في ال *Acute*

COLCHICINE

ممكنة .. من قرص ل 3 يوميا .. بالإضافة إلى أقراص ال *dose* تدي منه أكبر

Indomethacin

لغاية ما تظهر لك ال

Toxic Signs Of Colchicines' Toxicity

على هيئة

Emesis and Abdominal Pain

هنا توقف بسرعة ..

هوا الاسم التجاري له إيه ؟؟

Colmediten tab.

أو

Colchicine tab.

وأكد انت عارف الكولشيسين ممنوع للحوامل ومرضى الكبد والكلى.

Licorice " بالعرقسوس " مادة ال *Digoxin* ال

تم تسجيل عدة حالات تسمم بسيطة " *mild toxicity* "

في شهر رمضان !! لمرضى القلب الذين يتناولون عقارات بها ال *Digoxin*

وقلت القضية مجهولة .. لما في رمضان تحديدا ؟!

وبعد متابعة النشاط اليومي لهذه الحالات .. وجد أن جميعهم يتناولون شراب "

العرقسوس " على الإفطار .. وبإسراف !!

، والطبيب الباحث .. يعلم أن العرقسوس ، هو مادة ال *Licorice*

وأن لها تأثير مشابه لل *aldosterone*

وبدرجة أعلى أيضا .. وتتمسب في *Hypokalemia*

وبذلك ، أصبح البوتاسيوم مفقودا .. ويترتب على ذلك ،

ارتفاع تركيز وفعالية الديجوكسن .. وتعرض المريض لحالة مقاربة لل *Toxicity*

المسألة : استنتاجية التجريبية ... كالتالي :

*Bactiflox-Ciprocin-Ciprofar-Ciprofloxacin-
Rancif-Levanic-Unibiotic-Ofloxin-Peslox*

لا يوجد أبلى حد من الأمان في استخدامها مع من هم تحت سن ال ١٨ سنة..
(ابعد عنهم مطلقاً)

CNS تشنجات .. او عنده مشكلة Subjected اوع تستخدم الكينولونز ، مع واحد
ابعد عن الشر وحقني له ..

۲/
مرضی کبد ، کلی ، حوامل ، مرضعات .. بلااااش

مطلوبة جديدة شوييا .. متخليش اي حد هندي له كينولونز ، يتعرض للشمس كثير .. لأن الأبحاث

الجديدة كلها ، يقول إن اكتشفوا إن الكينولونز لها *Photo-Sensitivity* رهبة

لا يستخلم مع الناس التي ^{٥/} غدهم حساسية من الدواء

ای شخص غده ال

Creatinine Clearance

أقل من 29 ملي في الثانية..

معرض لتسمم بالكينولونز ومشاكل كلوية متعددة..

ما هو الكينولونز الذي آمن في الحمل؟ $\frac{V}{/}$

Nalidram 500 tab.

طبيب وانا مستخدمه ليه في الحمل؟؟

ومثلاً نتيجة المزرعة Urinary tract infection .. أقولك ، لو واحد عنده
إن الميكروب علاجه الأول والأخير كينولونز وانت مش عاوز تلف ع المضادات وتجرب
فيها .. يبقى مش قدامك إلا الناليدرام.

Antacid تحتاج لعملها إلى وسط حمضي في المعدة لذلك لا يجب كتابة Quinlones ال
 قبل مضاد الحموضة بساعة أو Quinlones معها وإذا اضطررنا إلى ذلك فيجب وصف ال
 ساعتين أو بعده بأربع ساعات على الأقل.

بكل اختصار .. هناك قاعدة عامة تقول " جميع المضادات الحيوية تؤخذ قبل الأكل بساعة أو بعد

الأكل بساعتين ، وهناك استثناء وحيد ، سأذكره .. "

وأنا أفضل شخصيا .. يكن بعد الأكل .. تجنبنا للحموضة والارتجاع ومشاكل غشاء المعدة .. من أشهر المضادات التي تؤخذ قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين - لتحقيق أكبر قدر من الامتصاص وتجنب أكبر قدر من تداخلات المضاد مع مكونات الأطعمة

مثل *Quinolones* مجموعة -

Ciprofloxacin ،

وال *Azithromycin* مثل ال *Macrolides* وأيضا مجموعة ال

Rifampicin وال *Penicillin* ومجموعة ال *Erythromycin*

أيضا .

وبخصوص التداخلات مع الطعام *Macrolides* : وال *Quinolones*

، فهناك معلومة هامة أن لها *Interaction* مع الكالسيوم والحديد

تلاقيك طبيب كاتب، *Ciprofloxacin* وف نفس الروشنة ، علاج مثلا لهشاشة العظام

فيها الاثنين *Vitamins* .. أو كاتب فيه *Ca* ، أو علاج للأنيميا فيه *Fe* ،

Interaction . غير مقصود . ويحصل

ولذلك ، لزما تحذر مريضك :

قبل جرعة المضاد لا جنبه ولا زيادي ولا آيس كريم ولا لبن ولا أي حاجة فيها

ولا أي حاجة فيها *Ca* ولا برنو *Fe* ..

وأخيرا هناك ، ، بعض المضادات التي لا تتأثر بوقت الأكل .. وهم الجيل الأول من مجموعة

السيفالوسبورينات .. مثل ال *Cephalexine*

Hypotensives In Pregnancy :

واحد حامل جايلاك وبتقولك يا دكتور انا حاسه اني دايله ففمت قايسلها الضغط واوع تقيسه وهي

مراقبة عشان ال *supine hypotensive syndrome*

فقسته فطلع منخفض ودا طبعا حاجه متوقعة عشان المثبتات اللي بياخذوها الحوامل ،

أقراص ، *cortilon* نقط او *effortil* اوع ثم اوع تدلها أي أدوية بترفع الضغط زي

أو أي حاجة من الحاجات دي حتى لو بجرعة بسيطة وخصوصا ف أول ثلث شهر لأن

الأدوية دي ممكن تؤدي إلى *maternal hypoperfusion*

، بتعمل *abortion* ،

قولها تشرب فنجان قهوة يوميا أو تضيف قليل من الملح لطعامها ، ويمكن في الشهر

الحمل الأخيرة نستعمل

الإيفورتيل لو محتاجة أوي .

/15

Lipid Regulating agent , Cholestyramine :

اطباء كثير .. تحب لو منتظبط نسبة الدهون تستعمل الكوليستيرامين ،
اللى هوا موجود فى السوق على هيئة :

Questran sachets Or Cholestran packets

المشكلة الأولى :

إن معظم الناس اللي منتظبط لهم موضوع الدهون ، بيبقوا مرضى قلب أو تصلب شرايين أو
أزمات قلبية أو ما شابه
فبنسى حاجة مهمة جدا

بيكونوا بيتعالجوا بال Digoxin

وفى قاعدة خطيرة بتقول ، إن الكوليستيرامين يقلل من فعالية الديجوكسن ، ومن
امتصاصه ..

إن سعادتك قدامك خيار من اثنين ، هنا :

يا ما تكتبش دا مع دا ..

يا إما تقول للمريض بتاعك .. يفصل ساعتين بين دا ودا ..

مشكلتنا الثانية مع الكوليستيرامين :

إن له

Mild blood thinning effect

ويردو معظم اللي منتظبط لهم الدهون .. بيكونوا بياخدوا Warfarin or heparin

وطبعا معروف إن الوارفارين والهيبارين

Powerful Blood Thinners

يبقى بديهى كدا .. مينفعش ازود الموضوع وادي له حاجة - الكوليستيرامين - تعمل له

!! Thinning كمان

إن يفضل ألا يوصف الكوليستيرامين مع الهيبارين والوارفارين

/16

استخدام مضادات الحساسية مع مرضى الكبد :

هو موضوع معقد إلى حد ما ، ولا يوجد رأي قاطع فيه ..

لو ضربنا على سبيل المثال ، ال Systemic Corticosteroids

هناك أطباء يستعملون ال Short-acting

Predinsolone or predinsone

ولا يجدون ضرر فى ذلك ، سوى ارتفاع مؤقت فى الإنزيمات ..

أما بخصوص مضادات الهيستامين المختلفة :

اللى موجود فى الصيدليات هتلاقى أقلهم تأثير ع الكبد هو Acrivastine

Semprex capsules

أما ال Loratidine وال Astemizole

يملكون تأثير سىء على الكبد وممنوعين منعاً باتاً ..

/17

استعمال فور مع الحامل Urosolvin

ممنوع

ليه ؟؟

has Teratogenic effect on fetus

/18

من أشهر الأخطاء ، خلط أمبولة البسكوبان مع أمبولة الفولتارين :

لأنه ، هيترسب في خلايا العضلة ، المحقون فيها الأمبولة ، ومش هيتحرك من مكانه ..
و انت ليه تعمل كذا أصلا !!لما عندك أمبول ال Spasmofen
فيه هيوسين + كيتوبروفين ، يقوم بالمطلوب

/19

مع من هم تحت ال Ciprofloxacin حالتين ، فيهما ، أنت معك رخصة لمحاولة استخدام
ال ١٨ عامأن تكن عدوى الطفل ، لا تستجيب لأي من المضادات الحيوية أو أظهرت نتيجة مزرعة
البكتريا أن لا

علاج له إلا السيبروفلوكساسين .. وهذا نادرا ما يحدث

والحالة الثانية ، عدوى ال Anthrax

هنا .. أنت معاك رخصة محاولة .. لكن ، بتحاول وانت متوقع حدوث مشكلة ،
عارف إيه المشكلة ؟؟

Joint Damage and ,

Severe musculo-skeletal disorders

في ناس حاولت تدي أطفال تحت السن دا ، السيبروفلوكساسين ، دخلوا في

Arthritis و Arthralgia

ومهما كانت الأبحاث والمحاولات الآن .. في إيجاد رخصة لاستعماله في هذا السن " تحت
ال ١٨

إلا أنه لن نستخدم السيبروفلوكساسين تحت هذا السن

/20

"المضادات الحيوية ومريض الكبد :"

من المعلوم أن أفضل المضادات لمريض الكبد هو الأموكسيسلين والكلافوليبيك أو
الكومبينشين منهم :الهاي بيوتك أو الأوجمنتين ، لكن ما هي المضادات الحيوية الممنوعة على مريض الكبد
؟؟

"ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدامها " ؟؟

مركبات السلفا - الريماكتان - الإرترومايسين - اللوراميفنيكول - التتراسيكلين ،

د/ احمد عفيف

Dospa Ampoule

لو جالك طفل طده ١٠ سنوات أو أقل و طده مخص عادي أو مخص كلوي أو لأي سبب
احتجت انك تديله **buscopan amp**
الفضلك انك تستخدم **dospa amp**
لأن البوسكوبان من مشتقات الأتروبين و ح يلوه ضربات قلبه جدا وايضا في الكبار لا
تعطى ابرة ال **buscopan**
البوسكوبان وريدي مياثرة يفضل ان تعطى في محول أو عضل.

Chicken pox : مع الحوامل خاصة في حالات ال Acyclovir استخدام ال

مع الحوامل **Acyclovir** لم يتوفر الكم الكافي من الأبحاث والدراسات التي تبيح استخدامه
معهن .. لم يتعرضن لأي مشكلات **Acyclovir** .. ورغم ذلك ،، اللواتي ، تم استخدام ال
Chicken pox ، إذا كانت المرأة تعاني من الأعراض البسيطة لل
تستخدم معها ال **Oral Acyclovir " Zovirax "**
لكن لو الحالة

Complicated Pneumonia

تستخدم معها ال

I.V Acyclovir and Hospitalization

وتعالج ال **Pneumonia**

لأنها قد تتسبب **Maternal death**

.. أقصى ما يمكن أن تتعرض له المرأة الحامل من ال **Acyclovir**

هي بالمناسبة **Seizures**

والضرر على الجنين .. غير ملحوظ ولم يسجل حالات منه ..

Orphenadrine والعمل

، طبعا دا **Muscle relaxant** لي النورجيسك والنورفليكس في الصيدليات

لا يفضل وصفه للحوامل وللأطفال تحت ال ١٢ عام ،

لأنه ممكن يتسبب في **Fetal problem**

ومشاكل في **Reproduction**

Orphenadrine طيب أنا إيه يقيني بال

ما اختار أي مسكن أو باسط عضلات أمن ف الحمل ..

لأن الدراسات عليه مش كافية ولا توجد معلومة قاطعة بخصوص أمته من عدمه !!
وقد قرنت أن أحدث الأبحاث تحبذ عدم إعطاء أي باسط عضلات للحوامل .. تجنبنا لمشاكل
عديدة .

/24

الانتينال ليس له تأثير تشبيطي على حركة الأمعاء وإنما اللي يتخاف منه هو الإيموديوم واليوموتيل:

ودا اللي يتخاف من جرعة العالية اللي ممكن تدخل العيان في

Severe Constipation

ومنه إلى ال

GIT Atony

/25

Salbutamol under 2 years :

لا داعي لاستخدامه في من هم تحت السنتين ، ومتبقاش مقلد وخلص ،

Less Effective لأنه

لأن مستقبلات البيتا لم تكن تكونت بالقدر الكافي ،

علاوة على أنه ، لا يوفر ال **Protection**

الكافية لهذا الطفل في تجنب تطور الأعراض

/26

1 : جرعة ال Gentamycin تحت العشر سنوات عموم

جرعتك في اليوم الواحد هي

3 mg / kg

وتتقسم على 3 مرات في اليوم

بس حطها في ٥٠ ل ١٠٠ ملي محلول ملح أو جلوكوز 5 %

و ضبط وقت المحلول على ٣٠ دقيقة

"وأهو انت عندك في السوق أمبولات جنتاميسين ٢٠ و ٤٠ و ٨٠ .. اطلب ال ٢٠

وشوف جرعتك واللي انت محتاجة."

لو هتدي الجنتاميسين عضل .. غير المكان اللي هتدي فيه كل مرة

لو هتدي وريد .. يبقى ببطء شديد جدا

ولو هتدي محلول .. ما تخلطش مع الجنتاميسين ، أي حاجة تانية زي البنسلينات مثلا ..

الجنتاميسين

لا شريك له في المحلول ..

ومدة العلاج:

المعظم مش بيعدي عليه يوم أو يومين إلا إما يتحسن جدا

Severe infection ..

في الحالة دي ممكن تضاعف الجرعة كمان يومين .. يعني تخش في 4 إلى 5 أيام.

كل الكلام اللي فوق شريطة أن يكن هذا الطفل **Not renal impaired**

وإلا لو هوا مش نورمال رينال .. متضطر تتابع له وظائف الكلي كل يوم

وتراقب له كمان ال **plasma gentamicin level**

اللي المفروض ميعديش بعد تاني أو تالت جرعة ١٢ ميكروجرام لكل ١ ملي بلازما ..

/27

Severe Vomiting In Child :

وانت مش علوز تدي البرمبران او مش حبيب او مش عارف تطبط جرعة لطفل ، او مش جاب

معاك نتيجة ،

خلاص كدا مش قدامك إلا

Zantac i.v or i.v.i

والأهم جرعة:

Slow intravenous 2 mg /kg over 2 minutes

يا لو علوز ف محلول

slow i.v.i over 10 minutes on 20ml normal saline

ويفضل إنك تدي زانتاك مع الكورتجين ب ٦ ، والكورتجين لوحده ممتل برنو.

/28

post-menopausal osteoporosis علاج ال

هي متعددة ومتنوعة ..

عندك ناس مثلاً:

Oestrogen Replacement تعالج بال

وناس تعالج بال Raloxifene اللي في الصيدليات Evista

وناس تعالج بال Calcitonin

وناس تعالج بالكاسيوم و فيتامين D

وأنا من محبذ ومفضلي ال Alendronate أو ال Fosamax

كبسولة قبل الأكل بساعة أو بعده بساعة

بالإضافة للكالسيوم وفيتامين D

هوا حاجة غالية بس محترمة فوق الوصف .. وبثقل من نسبة تعرض المريضة لل

Fractures وال other comp.

أما بخصوص ال في اللواتي يعانين من post menoposal - pain management. العلاج مسكنات ليس أكثر ،

بداية بال وال NSAIDS , Nerve blockers وحتى ال narcotics

29/

عند الأطفال من ٦ أشهر ل ١٢ سنة ، anxiety في ال diazepam جرعة ال كالتالي:

0.12-0.8 mg/kg/day PO

مقسمة على ٣ أو ٤ جرعات

أو

0.04-0.2 mg/kg IM/IV

كل ساعتين أو ٤ ساعات

/30

ال: Steven Jenson Syndrome

Life Threatening and Emergency Condition

والحساسية لمركبات السلفا

من الوارد جدا حدوث الحساسية مع مركبات السلفا:
بداية بالطفح الجلدي مروراً بالأزمة الصدرية والجرح الكبدي وجرح الكلى .. وهكذا ..
لكنها تتفاوت من شخص لآخر " هوا ونصيبه " ،
الحساسية دي تصيب ٣ من كل ١٠٠ شخص ،
ولا يستطيع طبيب مهما بلغ من العلم أن يتنبأ وقوع الحساسية للسلفا .. إلا بعد أن تحدث ..
ولكن ، بنظرة أكثر احتكاكا بالمرضى ، هناك ٤ ، ابعد عنهم ، فهم الأكثر عرضة:

Hepatic Impaired

Immune-compromised

Malnourished

Penicillin allergic

وربما شخص طبيعي جدا ..

إنن بكل اختصار:

انت هتشتغل عادي بمركبات السلفا ،

وهتقول لأهل المريض لو جد عليه أي أعراض حساسية تعرفوني ،

ولو حصلت الحساسية فعلا ، وقف مركب السلفا اللي انت شغال بيه ،

وعالج الحساسية اللي جدت سواء بالكريمات أو بشراب مضاد حساسية أو حتى الحقن

/31

ما يلزمك بخصوص المضاد الحيوي ، التتراسيكلين:

بما إن التتراسيكلين متعدد الفعالية ويحارب مجموعة لا حصر لها من البكتريا موجبة

وسالبة الجرام ، إنن ممكن تستخدميه في أي التهاب أو عدوى .. زي:

إسهال أو دوسنتاريا ناتجة عن بكتريا وأميبا أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهابات الجهاز
التنفسي العلوي أو السفلي أو التهابات الجهاز البولي والجهاز التناسلي أو التهاب المرارة
ملحوظة : مش هيجيب نتيجة في حالات البرد .. ولا هيجيب نتيجة لو اسعمل مع مضاد
غيره . باختصار ، لا يقبل شريك كي يقم بعمله ..

الأخطاء والاحتياطات مع التتراسيكلين .. كلمتين وبس ، مفيش غيرهم:

ممنوع مع الحوامل والمرضعات والأطفال أصغر من ٨ سنوات/

ممنوع لبن ولا حليب ولا أي مضادات حموضة ساعتين قبل وبعد المضاد .. كي تحقق أكبر
كم من الاستفادة ..

الجرعة كالتالي " : و اوع تنسي إنه يكمل يومين بعد زوال الالتهاب يعني كدا هيلخله في

٧ أيام"

لو طفل فوق ال ٨ سنوات : نص كبسولة ٢٥٠ أو شراب ١٢٥ ملعقة صغيرة كل ٦

ساعات

لو بالغ : كبسولة ٢٥٠ كل ٦ ساعات

د/ احمد عبد

/32/

Ergotamine **أوية الصداع النصفي المستعصي والعلاج بالبر**

الأبرجوتامين هو حاجة محترمة في علاج لوبات الصداع النصفي الحادة والتي لا تستجيب لأي من

الأسبرينات والباراسيتامول والتروبانيلات ..

شريطة الجرعة المناسبة وغياب الموانع ..

بموانع استعمال الأبرجوتامين :

١ / الضغط المرتفع

Marked vasoconstrictor

٢ / الضغط المنخفض جدا وليس الضغط المنخفض فقط

٣ / أي مشكلة في القلب ، باختصار

٤ / الحوامل والمرضعات " ولا التي عدها حتى لرسعة حامل في الفترة دي "

٥ / الحيز ممنوع مع مريض بياخذ الأنوية دي :

Antifungal

أو antidepressant

أو Macrolides

/33/

إما توصف **لعين**

antidematous drugs **أو الalphintern**

لحساسية دي لازم تتلخد قبل الأكل بنصف ساعة على الأقل عشان تقوم بوقايتها كويس

34/

لو بتدي عين ابرثروميسين أو ريماتان ومعاها أمينوفيلين

، لزما هنا نلقل جرعة الأمينوفيلين ، لأن

المضادان السابقان بيعملوا **Enzyme inhibition in the liver** وبالتالي لازم نلقل جرعة الأمينوفيلين عشان مش يحصل تسمم

/35/

عنى بالك

لازم ليلي عارف الجرعة كويس جدا **primpran amp** وأنت بتكتب

لأنه ممكن يعمل **extra pyramidal manifestations** والواد بتسلج طبعا الجرعة هي شريطة لكل كيلو يعطى لو طفل ١٠ مجم يعطى بالحد ١٠ شريط يعطى ١ سم ٣

بالصحة أنك أبعد عن الأسيتيل ساليسليك اسيد (الأسبرين) خاص في الأطفال أقل من خمس سنين عشان ال **Rey's Syndrome** التي بتعمل فشل في القلب ومشاكل في المع



Drug interaction

التفاعلات الدوائية

★ AMERICA'S TOP 10 ★

PARTICULARLY DANGEROUS DRUG INTERACTIONS IN LONG TERM CARE

Warfarin	Warfarin
NSAIDs	Sulfa Drugs
Warfarin	Warfarin
Macrolides	Quinolones
Warfarin	Ace Inhibitors
Phenytoin	Potassium Supplements
Ace Inhibitors	Digoxin
Spironolactone	Amiodarone
Digoxin	Theophylline
Verapamil	Quinolones

اشكال التداخلات (التفاعلات) الدوائية :

1 - التأثير التعزيزي (Enhanced effect) :

وفي هذا النوع من التفاعلات الدوائية يكون الأثر (نتيجة التداخل و التفاعل) هو زيادة أثر الدواء العلاجي بشكل أكبر مما لو تم أخذ نفس الجرعة من الدواء بشكل منفرد وبدون تداخل مع دواء آخر ..
مثال : قد يزيد تأثير واحد من أدوية السكر بتناوله مع دواء آخر ، فتكون النتيجة حدوث نقص شديد في نسبة السكر بالدم (Hypoglycemia) .

وفي هذه الحالة يمكننا أن نقول أنه قد حدث Synergism .

2 - التأثير التناقصي (Diminished effect) :

وفي هذا النوع من التداخلات الدوائية تكون النتيجة (محصلة التداخل) هي حدوث نقص في الأثر العلاجي للدواء بحيث يكون أثره العلاجي في حالة التداخل الدوائي أقل من الأثر العلاجي لنفس الجرعة في حال أخذها بشكل منفرد وبدون تداخل أو إعاقة ..

مثال : أيضاً قد يقل التأثير العلاجي لأحد أدوية السكر في حال تعاطيه مع شيء يتداخل معه بشكل سلبي أو تناقصي ، وقد يتسبب ذلك في حدوث ارتفاع في نسبة السكر بالدم (Hyperglycemia) .

وفي هذه الحالة نقول أنه قد حدث Antagonism .

3 - التأثير غير المتوقع (Unexpected response) :

وذلك عندما تكون نتيجة التداخل الدوائي غير متوقعة أو معروفة ، رغم معرفة تأثير كل دواء منهم على حدة .
وفي هذه الحالة نقول أن ما حدث هو Idiosyncratic response .

أنواع التداخلات الدوائية وفقاً لأنواع المواد المتداخلة :

قد يحدث التفاعل (التداخل) الدوائي بين الدواء و أحد الأشياء التالية :

- 1 - دواء أو أدوية أخرى .
- 2 - طعام .
- 3 - عشب أو نبات مؤثر .
- 4 - الظروف البيئية المحيطة مثل : التدخين - الملوثات الفيزيائية والكيميائية - درجة حرارة المحيط الخارجي - الضغط الجوي .. وغيرها .
- 5 - تناول الكحول (الخمر) .
- 6 - وجود مرض ما .
- 7 - نتائج بعض الفحوصات المعملية (تحاليل الدم أو البول)



First aid

الاسعافات الاولية

مشاكل التنفس

التأكد من النبض والتنفس

في حالة وقوع حادث لشخص ماء، تأكد مما إذا كان يعاني من كسور أم لا، وفي حال تأكدك من وقوع الكسر اطلب المساعدة.

في حالة عدم وجود كسور، يوضع المريض في وضعة الاسترداد (هذه وضعة فاقد الوعي، فهو فيها يستطيع أن يتنفس بسهولة، عن طريق: لف الوجه إلى جانب وثنى الذراع والرجل بالاتجاه نفسه، أما الذراع الثانية والرجل الثانية فتبقى في وضع مستقيم)، ثم جس النبض والتأكد من التنفس في كل دقيقة.

الشخص الواعي يفريق من شعور الإغماء بإحضاره على ظهره ويرفع ساقيه على شيء ما كصندوق مثلاً. شجعه على الكلام حتى يستيقظ وعيه.

يجب التأكد من أن المصاب يتنفس، وأن مسلك الهواء خال.

يجب التأكد من النبض، وإذا كان النبض متوقفاً، فيجب اللجوء إلى الإسعاف عن طريق التنفس الاصطناعي والتدليك القلبي، واستمر إلى أن يستأنف القلب خفقه ويعود التنفس الطبيعي.

الشریان السباتي في العنق يعطي صورة واضحة عن خفقة القلب واستمرارها، ولكن تحسس النبض يكاد يكون متعذراً في رسع شخص مصاب، أما لون وملمس جلد المصاب، فهما إشارة ثانية عن توقف القلب، حيث يميل لون الجلد إلى الرمادي وتنتابه برودة، أما الشفتان فيبهت لونهما، وإذا توقف القلب فيحتاج إلى تدليك قوري.

ارشادات:

تأكد من التنفس: بوضع يدك على صدر المصاب وأمام الفم والأنف. يجب أن تطلب العون الطبي.

تحقق من وجود النبض: أقوى نبض تجده في الرقبة بين القصبة الهوائية وزوايا الحنك، أما نبض الرسغ فمن العسير الاهتداء إليه.

إزالة ما في مجرى الهواء

في حالة انسداد مجرى التنفس للشخص المصاب، فيجب إزالة الشيء الذي يعوق التنفس من الفم بإمالة الرأس إلى ناحية وإبقاء الفم مفتوحاً بالإبهام، استعن باليد الأخرى لإزالة ما يمكن أن يوجد بالفم من أسنان صناعية، أو لعبة من لعب الأطفال الصغيرة وما إلى ذلك مما يمكن أن يسد منفذ البلعوم.

ارشادات:

1. نظف مجرى الهواء: مما قد يعرقل مساره، ثم ضع المصاب على ظهره.
 2. أضجع المصاب على ظهره على الأرض: لإجراء التدليك القلبي وإعادة التنفس إليه من الفم للفم، أرخ كل ما هو مشدود من ثيابه حول العنق "ربطة العنق أو الزر الأعلى من القميص".
 3. القلب يوجد تحت عظمة الصدر وإلى يمين صدر المصاب.
- إذا كان الفم مصاباً بضرر نظف الألف، للتمكن من إجراء التنفس الاصطناعي من الفم إلى الفم، وإن استحال هذا فلتبع أسلوب سلفستر أو هولغرنيلسن.

يجب أن ينكفي المصاب على وجهه. اركع بمحاذاة الرأس وانحن واضعاً يديك على عظم الكتفين .

1. اضغط بقوة ليخرج الهواء من رئتيه .
2. هزه إلى الوراء وامسك بمرفقيه، ارفعهما عن الأرض .
3. ارفع مرفقي المصاب كي يتسع الصدر فيمتص الهواء .
4. اخفض المرفقين، وكرر العملية باستمرار بعد كل خمس ثواني .

أسلوب سلقستر :

هذا الأسلوب يستخدم والمصاب منبطح على ظهره . وهو يعطي التنفس ويعطي التبدليك في الوقت نفسه، اضغط بقوة على القلب مرة كل ثاني، مع رفع الذراعين للأعلى، ويمكن أن يقوم شخص واحد بتدليك القلب والتنفس الصناعي في ذات الوقت .

1. اركع قرب رأس المصاب ، أمسك بالمعصمين واضغط القفص الصدري .
 2. ارفع اليدين إلى أعلى، وابسطهما نزولاً إلى جنبيه .
 3. هذا يوسع الصدر ويمتص الهواء إلى الداخل، كرر العملية كل خمس ثواني .
- إذا توقف القلب فإن ثلاث ضغطات قوية على الصدر فوق عظمة الصدر قد يعيد إليه النبض .
وإلا فيجب أن يتكرر الضغط ، إلى أن يسترد القلب خفقانه، أو ريثما تصل المساعدة الطبية .
اركع عند كتف المصاب اليسرى واضغط الصدر فوق المنطقة المحيطة بالقلب .

تدليك القلب

1- تدليك القلب : اركع قرب كتف المصاب اليسرى، ضع يداً فوق يد لتلمس أصابعك أسفل عظمة الصدر اضغط بالتساوي وبقوة كل يدك فوق منطقة القلب . 2 - اضغط بانتظام على القلب ضغطة مرة في الثانية إلى أن يستعيد خفقته . 3 - اثن يدك قليلاً وأنت تتحنى بذلك الوضع ينضغط الصدر حوالي بوصتين، أما للصغار فخفف من الضغط . 4 - لقلب الطفل يكفي أن تضغط بإصبعين بمعدل مئة ضربة في الدقيقة . 5 - استعد بالتنفس الاصطناعي من الفم للفم، وذلك برفع رقبة المصاب والميل برأسه إلى الوراء وقرص الأنف .

رد الحياة بالتنفس في الفم

1- استنشق نفساً عميقاً : أحط فم المصاب أو أنفه بفمك، انفخ بانتظام في رئتيه . 2 - ركب الصدر وهو يهبط عندما تستنشق نفساً عميقاً آخر، إن لم تنجح المحاولة تأكد من غلق قصبة الهوائية من أي شيء . 3 - النوبة القلبية الرئوية : إن توقف القلب فإن التنفس يتوقف أيضاً . في هذه الحالة ادمج التدليك القلبي بالتنفس الاصطناعي من الفم إلى الفم . حيث تجرؤ بكتف المصاب اليسرى للقيام بالتدليك بمعدل ضغطة كل ثانية . ويجرؤ شخص آخر قرب كتف اليمنى ليتنفس في فمه، يجب أن تملأ الصدر بالهواء مرة كل خمس ثواني . 4 - للصغار وللطفل : أحط الفم والأنف بفمك، لا تنفخ بقوة .

نوبات الربو

• إذا انتابت النوبة شخصاً داخل المنزل، فيجب أن يجلس المصاب على كرسي ومن مشتبكتين على مائدة، لأن هذا الوضع يحرك عضلات الصدر والمساعدتين ويسهل التنفس .

• حاول أن تبقى الظهر في شكل مستقيم، وإذا وقع الحادث خارج المنزل يمكنك المصاب أن يستعمل السياج أو الباب أو كتفي صديق على أن يستند رأسه إلى الأمام .

- قد يوجد في جيب المصطب أقرص أو دواء للاستنشاق، يعرف هو طريقة استخدامها، وإن لم تتحسن الأعراض في خلال خمس دقائق اطلب الطبيب أو انقل المريض إلى المستشفى.

مشاكل التنفس

- علاج ضيق التنفس كتوبة من ثوبك الربو بالجلوس في وضع مريح، الأم التي يكتف من التوبة، إذا كانت لها أسباب عصبية عاطفية.
- غير أنه متى كانت التوبة شديدة مستمرة ساعات فاطلب الطبيب أو انقل المريض إلى المستشفى.

الانعاش القلبي الرئوي

مختصر الانعاش القلبي الرئوي لشخص بالغ

فحص المكان... فحص درجة الوعي... طلب المساعدة

فحص التنفس

إذا كان
طبيعياً وضع
المصاب في
وضع الإنعاش

إذا لم يوجد
تنفس أو لم
يكن طبيعياً
ابدأ الإنعاش
القلبي الرئوي

دورات متتالية (٣٠ ضغطاً ٢ زفيراً) لمدة دقيقتين

فالج مصري المراء

إمطاء ٢ زفير

إعادة التنفس

في حالة
التحسن وضع
المصاب في
وضع الإنعاش

في حالة
عدم التحسن
استمر في
الإنعاش
القلبي الرئوي

مختصر الانعاش القلبي الرئوي للرضيع

فحص المكان .. فحص درجة الوعي .. طلب المساعدة

فحص التنفس

إذا لم يوجد تنفس أو لم يكن طبيعياً ابداً الانعاش القلبي الرئوي

إذا كان طبيعياً ضع المصاب في وضع الإنفاة

دورات متتالية (٣٠ ضغطات : ٢ زفير) لمدة دقيقتين

فتح مجرى الهواء

إعطاء ٢ زفير

إعادة التفيم

في حالة عدم التحسن استمر في الانعاش القلبي الرئوي

في حالة التحسن ضع المصاب في وضع الإنفاة

C
A
B

الإغماء وفقدان الوعي

- يحدث هذا نتيجة إصابة في الرأس، فإذا فقد الإنسان وعيه تأكد أولاً من عدم وجود كسر في العنق أو الرأس، وفي حالة إذا كان هناك ما يشير إلى وجود كسر وبشكل خاص في الرقبة أو الرأس، فلا تحرك المصاب، فتحريكه يضاعف من خطورة الإصابة.
- اتصل بطبيب أو بسيارة إسعاف بأقصى سرعة ممكنة، وإذا كان الغيب عن الوعي يعاني من صعوبة في التنفس، فضعه في وضعة الاسترداد، وافحص نبضه وتنفسه في كل دقيقة، ووضعة الاسترداد هي أيضاً أفضل وضع للذي يتنفس بشكل طبيعي.
- أما إذا انتفى وجود الكسر فتأكد من خفقة القلب وبأن الشخص يتنفس تنفساً طبيعياً.
- وإذا كان الشخص يتنفس والقلب يخفق حاول أن تعرف سبب الغيبوبة إن تسمى لك ذلك وعالجه على ضوء هذه المعلومات.

وفيما يلي توضيح بمساعدتك بشكل أفضل :

إذا استعاد الشخص وعيه طبيعياً :

1. اسأله عن الأسباب المحتملة لهذه الغيبوبة.
2. دعه يحرك أطرافه للتأكد من سلامته من الكسر أو الشلل.

إذا كان ناعساً ويستطيع أن يجيب :

1. حاول إبقائه مستيقظاً.

2. تلكد مما إذا كان تحت تأثير العقار أو الكحول أو التسمم أو الإصابة في الرأس.
3. ابحث عن أوراق تبين حالته الصحية، فقد يكون مصاباً بالسكر أو الصرع.

إذا لم يستعد الشخص وعيه:

1. ضعه في وضعة الاسترداد وغطه ببطانية.
2. اطلب سيارة الإسعاف أو الطبيب.
3. راقب النبض والتنفس ريثما تصل المساعدة.

الصدمة والاختناق

الصدمة:

أعراض الصدمة تتراوح بين صفرة تعلو الجلد، وقلق، واضطراب، وتسارع النبض، وتنفس سريع. وهذه الأعراض سببها رد فعل الجسم لحادث ما، أو لنوبة قلبية، أو لتزف، أو لحرق، أو لتعرض طويل للبرد، أو قد يكون سببها الفزع. ورد الفعل يحدث بسبب تضاول كمية الدم الوارد للجلد والأطراف، وتحوله إلى الأعضاء الحيوية (الدماغ، والقلب، والرتتان).

- المصاب بالصدمة يجب أن يضطجع لأن الدم وهو في هذا الوضع يتدفق إلى الدماغ.
- ويجب أن يوضع عليه دثار أو أكثر ليسترده ما فقد جسمه من حرارة. ولكن لا تعطه أي شراب حار حتى لا تتسع الأوردة السطحية بما تأخذه من دم الأعضاء الحيوية.
- قد يغيب الشخص عن الوعي من وقت لوقت، لهذا يجدر بك أن تستمر في مراقبته ومراقبة نبضه بالجس وتنفسه بالوسائل المعروفة. أبقه مضطجعا بهنوء وسكون، واتصل بطبيب أو بسيارة إسعاف. لا تفارقه قبل أن يتخلص نهائياً من الصدمة. لأن كل مصاب بصدمة يجب أن يوضع تحت المراقبة الواجبة لمدة ساعة على الأقل.

الاختناق:

عملية هيمليش:

متى أصيب شخص ما باختناق فعلى المسعف أن يزيل ما يعترض مجرى الهواء من أنواء بكل سرعة، فإذا كان المختنق بالغاً أمسكه من الخلف بيديك الاثنتين مشبكتهن، ثم أرفعه إلى أعلى بعنف لكي تتضغط الرتتان فيخرج ما فيهما من هواء. هذه هي عملية هيمليش والمراد منها إزاحة وطرد الشيء الذي منع خروج الهواء ودخوله. وقد تضطر إلى إسعافه أيضاً بالتنفس الاصطناعي.

إرشادات مصورة:

- عملية هيمليش: اشبك بدأ بيد وارف المصاب إلى أعلى بقوة.



- للصغير: ضعه على ركبتيك برأس متخفص واضرب بين عظم الكتفين.

الحروق

1. تسببها النار أو الماء الحار أو المواد الكيميائية، فإذا كانت الملابس مشتعلة فأطفئها بالماء البارد، ثم لف المصاب ببساط أو بطانية أو معطف، ولكن لا تستخدم أي شيء مصنوع من مواد قابلة للاشتعال، كالنايلون وسواه، كذلك لا تحاول انتزاع الملابس المحترقة، فبأنها بالنار أصبحت معقمة.
2. الماء البارد يوقف الاحتراق بالماء الحار ويخفف من آثار المواد الكيميائية الأكلية، على أن تخلع عن المصاب الثياب الملوثة بتلك المواد وتغسل الجلد، استمر في وضع الماء البارد على الموقع المتضرر مدة لا تقل عن عشر دقائق، ولكن لا تفرك الجلد، فهذا يزيد من الضرر وكذلك من الألم.
3. غطي الجلد بضمادة معقمة جافة، ولا تستعمل الغسول أو المراهم.
4. الحروق العميقة والحروق الناتجة عن الكهرباء أو التي تزيد رقعتها عن نصف بوصة مربعة يجب أن يراها الطبيب، فقد يكون الخطر الواقع أخطر مما يبدو.
5. للحروق الكبيرة فأطلب سيارة الإسعاف حالاً لأنها تنذر بأخطار جسيمة.
6. يصاب المرء بصدمة، وعليه يجب أن يوضع في وضعة الاسترداد ريثما تصل المساعدة الطبية.

حرق الشمس

1. للحرق الخفيف الذي يحمر الجلد على أثره ولكن بلا بثور أو حبوب ابق المكان المتأثر مغطى.
2. ضع قبعة واستعمل مراهم أو زيوت حروق الشمس منعاً لإصابة الجلد بالجفاف.
3. أما الحروق الشديدة التي تعقبها آلام وبثور فعالجها كالحروق ولا تعرض الجلد للشمس قبل أن يتم شفاؤه.

النزيف

يجب أن يتم وقف النزيف بأسرع ما يمكن، وهذا يتحقق بالضغط على الجرح، اضغط بأصبعك مدة عشرين دقيقة بكل قوة، واستمر في الضغط إن لم يتوقف النزيف.



للجرح الصغير: اضغط بأصابعك لوقف التدفق. الضغط
بأصابع اليد.



للجرح الكبير: استعمل قوطة نظيفة واضغط بقوة كي يتوقف النزيف. استخدم قوطة لوقف النزيف -



قد تنزف بغزارة واضغط موضع

للدوالي (الأوردة المتوسعة): والتي إن قطعت، ارفع ساق المصاب النزيف إلى أن تصل المساعدة الطبية


رفع ساق المصاب بنزيف الدوالي إذا استطعت سد الأوعية

- المنفتحة بهذا الضغط، وتوقف النزيف، يكون التجلط الطبيعي فعالاً في هذه الحالة.
- بعد توقف النزيف، نظف الجرح بعناية، وانقل المصاب إلى المستشفى أينما يحتاج إليه من أمصال ضد مرض الكزاز.
- للجرح الصغير يكفي ضغط قوى بالأصابع، أما الجرح الغائر فقد يحتاج إلى قطعة قماش نظيفة توضع على منطقة الجرح لتغطية جميع الأوعية المقطوعة، وتعمل قطعة القماش الكبيرة للجرح الغائر لكي يتسع نطاق الضغط، وليس لامتصاص الدم.
- سواء كان الجرح صغيراً أو كبيراً فاضغط عليه بكل قوتك مدة عشرين دقيقة، ثم خفف الضغط كي لا يصيب الدورة الدموية أي تلف، وإذا استمر النزيف فاعد الكرة عشرين دقيقة أخرى.
- النزف المستمر من الفم أو الأذن أو المثانة أو الشرج، يدل على حدوث نزيف داخلي، وبذلك لابد من علاج طبي فوراً.
- ضع المصاب في وضعية الاسترداد واطلب سيارة الإسعاف، وإن تعذر ذلك فأنقله بوسيلة ثانية إلى المستشفى، والنزف الثانوي في هذه الأعضاء يحتاج أيضاً إشراف الطبيب.

الصدمة المتسببة عن النزيف والحروق:

أي إنسان يتعرض لإصابة خطيرة يعاني من صدمة، وتكون الصدمة شديدة الخطر إذا عانى المصاب من نزيف حاد، وفي جميع هذه الحالات يجدر بك إبقاء المصاب في وضعية الاسترداد إذا كان غائباً عن الوعي، أو مضطجعاً على ظهره بقدمين مرفوعتين إن كان في حالة وعي، غطه بدثار، واستدرجه إلى الكلام. أما إذا كان فاقد الوعي فراقب نبضه وتنفسه.

نزيف الأنف



- إذا نازف الأنف اجلس برأسك منحنيًا إلى الأمام على وعاء حتى ينزل الدم فيه، وتنفس من فمك.
- اضغط بقوة على كلا جانبي الأنف من أسفله لمدة لا تقل عن عشر دقائق. فإن لم يتوقف النزيف اضغط على ظهرك، ويستحسن وضع كيس من الثلج على جسر الأنف.
- قد يشعر كبير السن متى نازف أنفه بأنه سيغشى عليه، وقد يكون أفضل لكبير السن أن يستلقي مسنداً رأسه بالوسائد، وهذا أفضل من القعود برأس منحني على وعاء، ومتى توقف النزف استرح نصف ساعة أخرى وتجنب العطس أو التمخيط طوال يومين.
- إذا تكرر النزف أو إذا استمر أكثر من نصف ساعة فلا غنى عن طبيب يقوم بالعلاج اللازم.

التسمم وعضة الأفعى

التسمم:

- في جميع حالات التسمم، تعرف على نوع السم وأطلب الطبيب فوراً، وإذا كان المصاب قد ابتلع السم يمكن إعطاؤه كميات كبيرة من الماء أو الحليب.
- إذا كان الشخص فاقد الوعي، تأكد من أنه يتنفس.
- إذا كان المصاب مالكاً وعيه فاسأله عن اسم السم، واستحثه على التقيؤ في جميع الحالات إلا إن كنت على يقين من أن السم أكال (الحمض أو المادة القلوي أو الجازولين أو الفويل أويل)، فالفقئ يزيد من تدهور الحالة ويسئ إلى الفم والحنك أكثر إساءة.
- لاحظ أن محلولاً من الملح والصوديوم بيكربونات المذابين في الماء يجعل المصاب يتقيأ، أو عن طريق وضع إصبعك في فمه، ضعه في وضعة الاسترداد وراقب نبضه وتنفسه ريثما تصل المساعدة المطلوبة.
- تحقق من وجود الحروق الأسيدية (الحمضية) حول الفم، وإذا كان الفم مصاباً إصابة شديدة، فالتنفس الاصطناعي مطلوباً، يمكنك الاستعانة بأسلوب (هولغر نيلسن) لا تغفل عن مراقبة النبض والتنفس إلى أن تصل المساعدة.
- لو كان التسمم سببه تسرب الغاز لا تدخل الغرفة دون قناع واق وأشخص لهم طرّاً ومعرفة.
- اجمع القى لإجراء التحليل اللازم، أو خذ عينة من السم إلى المستشفى، وأرسل أيضاً أي قارورة أو زجاجة تجدها ملقاةً قربه وكل ما نقياه.
- لا تتأخر مهما كان الأمر عن أخذ المصاب إلى المستشفى ولا تفارقه أبداً قبل وصول المساعدة.

المستشفى تطلب المعلومات التالية :

1. اسم السم
2. وقت ابتلاع السم
3. وقت العثور على المصاب
4. حالته، هل كان في وعيه أو لا
- 5.

عضة الأفعى:

- الأفاعي السامة منتشرة في كل مكان وتؤثر السم يتفاوت باختلاف الحية ونوعها، لذا فتعرف على نوع الأفعى، لإعطاء المصاب الترياق المضاد لهذا السم، واقلها إن تمكنت، ثم خذها مع المصاب إلى المستشفى.
- أول علاج للمعضوض هو تجميد الجزء المصاب خذه إلى أقرب مستشفى بأقصى سرعة لكي يسعفه بالعقار المضاد للسم.
- هدي من روع المصاب لأنه يعانى من الصدمة أكثر.
- اغسل مكان العضة وجمد الجزء المحيط بها، (يمكنك معالجة المصاب بعضة العنكبوت كمعالجتك لعضة الأفعى).
- لا تعبت بالجرح ولا تسمح للمصاب بالمشي، وإذا كانت العضة في الرجل طمنن الضحية وعالجه لتلافي الصدمة.
- سم الحية الخفيف قد يقتل في بعض الحالات إن تجلوب معه الجسم بطريقة غير طبيعية، في حالات كهذه تكون الصدمة أو التوبة القلبية هما سبب الوفاة لا السم نفسه.

عضات الحشرات ولدغاتها:


- عضات الحيوان والإنسان (مثلاً إذا عض طفل طفلاً) يجب معالجتها كما تعالج الجراح
- في البدء يجب أن ينقطع النزيف، ثم ينظف الجرح تنظيفاً كاملاً.
- متى كانت العضة عضه حيوان، يجب التأكد من أن الحيوان غير مصاب بداء الكلب، وشأنه شأن جميع الجراح الملوثة يجب أن يحصن المصاب ضد مرض الكزاز.
- علاج العضة بمضاد الهيستامين أو المرهم أو الماء البارد أو مكعبات الثلج إن لم يتوفر شئ آخر.
- النحل والنمل تحمل في ذاتها سمّاً أسيدياً (حمضياً)، لهذا ضع على العضة أو اللدغة مادة قلوية كالصوديوم والبيكربونات، أما لدغات الدبور فهي تنفث المادة القلوية، إن الحمض الخفيف كالليمون أو الخل يخفف من الألم.
- الحشرات السامة كالعناكب والعقارب وأم أربع وأربعين موجودة في كل مكان، فإن تعرض أحدهم لللدغة من قبل واحدة منها، فأقلها وخذها مع المصاب بأسرع ما يمكن إلى أقرب مستشفى. ولما يموت الإنسان من سم الحشرات، بدء العلاج الفوري ضروري دائماً.
- القرادة يجب انتزاعها من الجلد. لا تترك رأسها وشذقيها عندما تنتزع جسدها، لأن هذا قد يسبب التهاباً في موضع العضة. وتستطيع أن ترغمها على إرخاء حنكها المتمسكين بموضع جلي البترول أو دهون الأظفار أو الزيت أو الكحل أو زيت الكاز عليها.

- لدغات النباتات أو مخلوقات البحر مؤلمة تسبب التهاباً واسعاً في الجلد.
- النباتات يلهب الجلد بما يحقنه فيه من سم، أو بما يفرغه من سائل زيتي في العادة يمتصه الجلد.
- الأعراض تشمل حكة يتبعها طفح منتشر وبثور أحياناً.
- اغسل الموضع المتأثر جيداً بالماء والصابون لإزالة السم الذي لم يتم امتصاصه بعد.
- لا تمس أي جزء آخر من الجسم وبنوع خاص الوجه والعين. أما إذا زاد التهاب الجلد عن الحد المعقول فاطلب الطبيب واستشره.
- إن لدغات قنديل البحر مؤلمة بل وذات خطر إذا كانت الصدمة تمنع السباح من السباحة الحسنة، ولا غنى عن العلاج الطبي إذا ظهرت بوادر الحساسية، إذا كان المصاب يعاني من حالة صحية أو قلب ضعيف.
- اغسل الموضع الملتهب بالكحول المضاف إليه الخل ولكن إياك والماء.

الكسور والكدمات والالتواء

الكسور والتضميد:

- كمبدأ أساسي، لا تحرك المصاب إن كان هناك أدنى شك بحدوث كسر في عظام جسمه. فتحريك المصاب يسبب له عطياً داخلياً جسيماً، فإذا كانت الرقبة مصابة، فقد يقتله تحريكها. أما إذا كان نقل المصاب أمراً ضرورياً فعليك أن تجمد حركة الطرف أو الجزء المكسور تجميداً تاماً قبل ذلك.
- أي ضرر يشمل انكسار عظمة أو مفصلاً منخلعاً يجب معالجته كحالة كسر، والإشارات المعينة تتضمن الألم الذي يتضاعف شراسة من جراء الحركة عندما يتعرض موقع الإصابة للضغط الخفيف والتورم وتغير شكل المفصل أو الطرف.
- كل كسر يجب أن ينظف ويغطى، وإذا حدث نزف يجب دعم المكان بشريحة، مع رفعه إلى أعلى إن كان ذلك متاحاً




تجميد الساق

بالشريحة

- يجب العمل على تفادي الصدمة، والتضميد هو أول بند في الإسعاف الأولى لأنواع كثيرة من الكسور.
- تجميد الطرف بالشريحة: بوضع لوحة رقيقة من خشب أو معدن تحت الطرف (الذراع أو الساق) وارتبطها بها جيداً، ولكن تجنب المساس بموضع الكسر.

الشريحة يجب أن تكون صلبة وعريضة لمنع أي حركة حتى



ثلاث أشخاص ينقلون

المصاب ربط الموقع المصاب بها. ويجب وضع اللباد على الشريحة كي يخلف من صلابة الشريحة ولا يحدث المزيد من الضرر للطرف المصاب. يستطيع اثنان نقل المصاب بأمان ولكن على حملة فقط، وإلا فإن العملية تتطلب ثلاثة على الأقل، أحدهم يسند الكتفين والرأس، والثاني يسند الفخذين، والثالث يسند الرجلين.

إذا صدعت الترقوة:

- من المهم أن تشد الكتفين إلى الوراء، ومن أجل هذا ضع ضمادة تحت كل إبط واربط الاثنين وراء الكتفين.
- استعن بضمادة تربط الضمادتين بقوة معاً كي يشد المنكبان إلى الوراء، وبذلك تمنع الترقوة المكسورة من الطرفين من إنزال الضرر بالرئتين، اسند الذراع بحمالة مدلاة.

إذا كسر ضلع:

اسند الذراع على الجانب المصاب بحمالة وخذه إلى المستشفى.

الصدر المحطم:

- إصابة خطيرة إن رافقتها بقبقة أو جرح مفتوح على السطح.
- غطي الجرح بضمادة نظيفة محكمة الشد منعاً للهواء من دخول الصدر.
- ضع المصاب في وضعة الاسترداد على أن يكون الجانب المصاب من الصدر على الأرض تمكيناً للرئة السليمة من التنفس بحرية، أطلب سيارة الإسعاف وانقل المصاب على حمالة.

كسور تؤثر على الجمجمة أو الوجه أو الفك:

تحتاج كلها إلى علاج مختص. تأكد من أن ممر الهواء ليس مسدوداً بسبب الضرر الواقع، اطلب سيارة الإسعاف أو خذ المصاب إلى المستشفى بكل سرعة.

كسر في العمود الفقري:

- إشارته ألم حاد في العمود كله وضعف وفقدان الشعور، أو شلل يصيب أحد الأطراف أو أي جزء آخر من الجسم.
- يجب أن لا يتحرك المصاب أو ينقل مخافة أن تتلف الأعصاب أو الحبل الشوكي.


- اطلب سيارة الإسعاف إن أمكن واستعن بثلاثة أشخاص على الأقل والحمالة في هذه الحالة لازمة. قطعة كبيرة من الخشب المنبسط كهاب مثلاً يفي بالغاية.
- اربط قدمي المصاب معاً من فخذه وركبتيه و كاحليه، ارفع المصاب إلى الحمالة بحذر حتى لا يتحرك شئ فيه ، من المفترض أن يمسك شخص بالرأس وآخر بالساقين، واثنان يدعمان الصدر والحوض، اربطه بالحمالة حتى تصل إلى المستشفى .

التضميد:

- يعتمد على التضميد في الأساس في معالجة الكسور. الضمادة السائدة يمكن صنعها من حزام أو رباط أو قماش. معظم هذه الضمادات من النوع القابل لللف وهي تشترى جاهزة، أو تصنع من قطعة قماش مثلثة الشكل .

الرشادات مصورة:

- الضمادة المثلثة الأطراف : يمكن تحويلها إلى قطعة طويلة بلف الزاوية من أطول جزء فيها ثم لفها بحجم نصفي ثم إلى نصف آخر .




كيفية لف الضمادة




- ضع الضمادة من داخل العضو وثبتها بدورتين .

ضمادة الذراع 1



- لف الضمادة ولتكن اللقافة ظاهرة من الخارج .

ضمادة الذراع 2




لف

• ارفع الضمادة بجمع القطعة المرخية في يدك

ضمادة الذراع 3

• أنه الضمادة على ظاهر الطرف على أن تغطيها خارج الجسم .



لف ضمادة الذراع 4

• ضمادات القدم والكاحل: تركز تحت القدم وتنتهي على شكل 8 حول الكاحل. بهذا تغطي القدم والكاحل وتسدان جيداً. لتضميد الكاحل انته من الخارج كما هو مبين. ولتضميد القدم استمر حتى قاعدة أصابع القدم وانته فوق مشط القدم .



لف ضمادة القدم


• تضميد الساق: يبدأ من الكاحل ويستمر حتى أعلى الساق إلى الركبة لتضميد الساق.



ثانية إن كانت الأولى قصيرة. لف ضمادة الساق

• الدوالي: يجب أن تضمد بطريقة لولبية دعماً للساق.

• ضمادة الركبة: تثبت ضمادة الركبة تحت الركبة وتربط على شكل الرقم 8 وتر وراء المفصل عابرة الرضفة (العظم المتحرك في رأس الركبة) ومنتهية في



لف ضمادة

الخارج .
الركبة


• الإصابة في الرأس تحتاج إلى التضميد إذا وجد جرح ينبغي إبقاؤه نظيفاً أو إذا وضعت إضمامة على العين أو الأذن، يجب دائماً استعمال الإضمامة مع ضمادة الرأس.

• ضمادة الرأس: يلف بها الجزء الأكبر من الرأس كل لفة تنزل قليلاً عن سابقتها، وإذا كان المطلوب إبقاء الإضمامة مكانها فإن لفات أخرى تضمن ثبات الإضمامة وتشد بإحكام على الفودين (جانب الرأس).




لف ضمادة الرأس

• ضمادة الرسغ: تلف حول الرسغ ثم تمرر على الراحة أمام الإبهام ووراء ظهر اليد. ويستمر هذا إلى أن يسند الرسغ بإحكام.



لف ضمادة الرسغ


• يجب أن تقيد الضمادة بقوة لمنع الرسغ من الحركة. على أن لا يؤثر ذلك في الدورة



النموية للأصابع


ضمادة الرسغ

• ضمادة الذراع: تبدأ من الرسغ وتنحني في شكل الرقم 8 إلى ما تحت المرفق.
• ضمادة اليد: تبدأ بالرسغ ثم تمرر على ظهر اليد عبر الكف وعودة إلى الرسغ، وكل لفة تالية تغطي جزءاً من الأصابع وتنتهي على الرسغ.



لف ضمادة اليد

• بضمد المرفق كالركبة: وتتركز الضمادة حول الساعد ثم تلف حول المرفق بالشكل 8 أمام المفصل، وانتهاء بأعلى الساعد.



لف ضمادة المرفق



• الحمالة اليدوية: تصنع بضمادة مثلثة:

الطرف الأطول يمرر على الكتف السليم تحت الذراع المصابة، ويربط على الكتف المصابة. وترفع الذراع المصابة وتدبس الحمالة. الحمالة اليدوية

• تستعمل الحمالة لدعم الذراع إذا لحق بالرسغ أو الساعد ضرر أو إذا احتاجت الذراع إلى دعم نتيجة كسر في ضلع أو في الترقوة.

الانخلاع:

- علاج الانخلاع كأنه كسر، وضع العضو المتأثر في عصابة أو على وسادة.
- اطلب سيارة الإسعاف أو خذ المصاب إلى المستشفى، والمصاب بالانخلاع يتعرض دائماً لصدمة.

الرضوض والكدمات:

- السبب هو نزيف في الأنسجة، ينتج عنه ورم وتغير في لون الجلد، وعادة يلجم هذا عن ضرر من صدمة في الجسم، لهذا تأكد من سلامة العظام، وإذا رافق الورم ألم شديد، انقل المريض إلى المستشفى لتجرى له الفحوص اللازمة.
- إذا لم يكن هناك كسر فارفع العضو المصاب إلى أعلى إن أمكن، أو علقه في حبل، وضع عليه كمادة باردة لتقليصاً للورم. والورم القليل المسطح سببه أحياناً عضات ولدغات الحشرات أو حقنة يكون قد تعاطاها.

اللي أو الالتواء:



التواء الكاحل

- أي ضرر يلحق بأربطة وأنسجة المفصل يكون غالباً في الكاحل أو الرسغ.
- أفضل علاج مبدئي هو وضع إمامة تلج تخفيفاً للورم ثم ضمده، وضع المفصل في وضع مريح، أما إن ساورك الشك فعالج اللي كأنه كسر.

أضرار الظهر:

- ليضطجع المصاب على شيء مسطح صلب، كالبلاط مثلاً، فإن كان الضرر ناتجاً عن سقوطه فلا تحركه، أبقيه دافئاً وغطه ببطانية أو معطف.
- اطلب سيارة الإسعاف إن أمكنك هذا. ولا يجوز نقله إلا إذا تعذرت كل وسيلة أخرى لمساعدته ولكن بعد تجميد حركة الظهر بلوح طويل يمتد من فوق الرأس إلى ما دون العمود الفقري.

أضرار الأذن:

- إذا دخل الأذن شيء أو حشرة لا تحاول إخراجها أو إخراجها لأن محاولة كنهدها من الضرر خذ الشخص إلى المستشفى حالاً.

أضرار العين:

- العين السوداء سببها نزيف حول تجويف العين، وقد يكون سببها ضرر حاد من ضرر أصاب جزءاً آخر من الرأس.

- لمعالجتها: غطي العين بقطعة مبللة بالماء البارد لفترة لا تقل عن عشر دقائق بعد الإصابة.
- إذا تسربت مادة كيميائية إلى العين لابد من غسلها دون أي إبطاء، امسك بالراس من الجانب المقابل للعين المصابة، أي أن تكون العين المصابة أسفل.
- اغسل العين بماء جاري، ثم غطها بقماش نظيف، وخذ الشخص إلى المستشفى.
- الجسم الغريب في العين يجب إزالته بأسرع ما يمكن دون أن تضيق إلى الضرر ضرراً، اقلب الجفن إلى أعلى بشد الرموش، وأخرج الجسم الغريب بالماء أو ارفعه بزاوية قطعة من قماش نظيف كالمنديل، وإذا استمر الألم فخذ المصاب إلى المستشفى.

أضرار الفم:

- الإصابة التي تحدث وربما قد تسد الحلق وتؤدي إلى الاختناق.
- اللدغات والحروق الكيميائية قد تسبب الورم أيضاً، ولمعالجة هذه الإصابة يجب أن يضطجع المصاب في وضعية الاسترداد ويغسل الفم باستمرار بالماء البارد، وامتصاص مكعب ثلجي يفيد المصاب كذلك.
- خذه إلى المستشفى بأسرع ما يمكن، أما لجروح الفم فاضغط بقوة على جانبي اللسان أو الذقن.

أضرار القدم:

- هذه أضرار لها صلة وثيقة بالكسور، ففي مثل هذه الحالات وما لم ينزف دم اترك الحذاء في مكانه ليكون بمثابة سائدة.
- إذا كان هناك نزف ولكن بدون كسر أخلع الحذاء والجورب برفق وعالج النزف.

ضرر شص السمك:

- لأن شص السمك (السنارة) متصل بسلك فلا يمكن سحبه من الجلد الذي انغرس فيه بل يجب أن يدار حول نفسه حتى يخرج الطرف المتصل بسلك ثم يقطع.
- إذا كان الشص بلا سلك يمكن إخراجة بسهولة، استشر الطبيب فقد يعطى المصاب المصل الواقى من الكزاز.

الغرق:

- اقذف بحزام النجاة أو أي شئ قابل للطفو إلى الشخص المشرف على الغرق، فمن قلة الحكمة أن تثب إلى الماء في محاولة لإنقاذه إلا إن كنت سباحاً قوياً ماهراً. وإن وثبت لإنقاذه فخذ معك الشئ الطافي لتساعده به.
- لإنعاش الشخص الغارق، أسعفه بالتنفس الاصطناعي من الفم للفم، استمر في محاولتك إلى أن يستعيد تنفسه، أرسل أحداً ليأتي بالنجدة.

الصدمة الكهربائية:

- لا تلمس المصاب، أقطع التيار عن الأداة التي سببت الصدمة أو انزع شمعة الاشتعال.
- استعن بقضيب خشبي أو بكرسي لإبعاد مصدر التيار الكهربائي عن المصاب.
- أنعش المصاب بالتدليك القلبي والتنفس الاصطناعي، ومتى كان المصاب يتنفس طبيعياً عالجه لتلاقي الصدمة.
- اذهب بالمصاب إلى المستشفى للمعالجة من الحروق الكهربائية التي قد لا تظهر على سطح الجلد، ولكنها قد تكون شديدة وخطيرة أسفله.

- قسمة الصقوع ضرر بسببه البرد القارس معطلاً الدورة الدموية، وهي في العادة تؤثر في الأطراف كأصابع القدم، وأصابع اليد والأنف.
- لا تفرك الجزء المتأثر، ولا تدفنه بوضعه في ماء حار. دفي اليد المصابة بالقسمة وتلك بوضعها تحت الإبط، أو أدخل في كيس النوم. أرخ الثياب المشدودة، واشرب شرباً ساخناً، ثم اقصد الطبيب أو المستشفى بكل سرعة.

سوء البحر من القيظ

- الأعراض تشمل إرهاقاً متناهياً ودواراً وإغماء وتعرقاً وعقلاً. والسبب فقدان كمية كبيرة من الملح والماء في العرق المتفصد، وقد يكون هذا بعد العمل المضني في حالة جوية رطبة حارة.
- أعط المصاب السوائل بكميات منتظمة و معتدلة، كأساً كل مدة. أضف إلى ثمن الجالون ملعقة صغيرة من الملح.
- راجع الطبيب إن اقتضى الأمر المزيد من العلاج.

ضربة الحر أو الشمس

- الأعراض: انهيار وحرارة مرتفعة وجلد ساخن جاف واضطراب شديد مرفق بغيوبة.
- عالج معالجتك لمنهار من القيظ، وانقل المصاب إلى المستشفى بأسرع ما يمكن.

هبوط الحرارة

- حالة تهبط فيها حرارة الجسم هبوطاً خطيراً، وهي تحدث على الأكثر مع الأطفال والشيوخ في الجو الشديد البرودة.
- لف المصاب ببطانية أو أكثر أو ضع فوقه معاطف وأعطه شرباً حاراً حلو ليشربه، لا تعطه الكحول أو تستعمل قربه الماء الساخن أو البطانية الكهربائية فهذا ينجم عنه تنقق الدم إلى الأطراف الباردة فتسبب البرد للجسم مما يعرض المريض للموت، استشر الطبيب بسرعة.

الحوادث الطارئة والأطفال

الحروق

الحروق البسيطة دون فقاعات

اغسل مكان الحرق بماء بارد ثم قم بتغطية الحرق بقطعة قماش طرية ومبللة بماء بارد حتى يزول الألم وتكفي عادة مدة خمسة عشر دقيقة ويجب عدم وضع الجليد على الحرق

الحروق المترافقة بالفقاعات

اغسل مكان الحرق بماء بارد ولا تخرب الفقاعات ثم اتصل بالطبيب ولا تغطي الحرق ولا حرق في الوجه أو اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية يجب أن يتم مشاهدته من قبل الطبيب في أقرب وقت

الحروق الكبيرة أو العميقة

روشتاتولوجي

التوصل بالإسعاف مباشرة أو قم بإسعاف الطفل المحروق بنفسك وربما يحضر الإسعاف قم بإزالة كافة الأشياء من على جسم الطفل ولا تقم بوضع أية أدوية أو مواد منزلية على الحروق و يمكن تغطية الطفل ببطانية حتى يتم إسعافه

الحروق الكهربائية والكيميائية

التوصل بمصدر الكهرباء أولاً و لا تحاول لمس الطفل بيدك المجردة ولكن حاول إبعاد الطفل عن مصدر الكهرباء بقطعة خشب جافة أو بقطعة قماش سميكة وجافة و بالنسبة للحروق الناتجة عن المواد الكيميائية تسعف بشكل أولي بسكب الماء التنظيف عليها و جميع الحروق الكهربائية و ال كيميائية يجب أن تشاهد لاحقاً من قبل الطبيب

إسعاف الاختناق

أبعد الطفل المصاب بالاختلاج عن كل ما يؤذي و اجعله مستلقياً على أحد جانبيه و اجري له تنفساً اصطناعياً إذا كان لا يتنفس أو كان مزرقاً و لا تضع أي شيء في فم الطفل و قم بإخراج أي بقايا طعامية من فم الطفل و اتصل بالطبيب إذا استمر الاختلاج

إسعاف العيون

إذا تعرضت العين لأي مادة كيميائية قم بغسل العين بماء نظيف وبشكل متكرر ولمدة خمسة عشر دقيقة ثم اتصل بالطبيب أو بمركز السموم و يجب أن تشاهد أدبيات العين من قبل الطبيب في كل الحالات و لا تحاول لمس أو تلميح العين المتأذية و لا تضع أية قطرة عينية أما إذا لاحظت وجود جسم أجنبي في العين فتركه و لا تحاول نزعها فقط قم بتغطية العين و إحضار الطفل للمشفى

إسعاف الطفل في حالة الاختناق

قم بوضع الطفل الرضيع على ظهره و وجهه متجهاً نحو الجانب ثم ارفع ساقي الطفل لمستوى أعلى من مستوى الرأس و لا تعطي الطفل أي شيء عن طريق الفم ثم اتصل بالطبيب إذا لم يستعد الطفل وعيه خلال دقائق



و للأطفال الكبار قم بوضع الطفل في وضع الأمان إذا لم يستعد وعيه بسرعة ربما تصلك المساعدة كما توضيح الصورة التالية

إسعاف الطفل المصاب بارتفاع في درجة الحرارة

تعتبر درجة حرارة الطفل مرتفعة إذا كانت أكثر من 37.5 درجة مئوية و يكون ملمس جلد الطفل حاراً أو يكون الطفل مصاباً بالقيء أو التعرق و يفضل دائماً قياس درجة حرارة الطفل و كإجراء أولي قم بإعطاء الطفل أحد الأدوية الخافضة للحرارة التي يصفها طبيب الأطفال عادة و أفضلها تحاميل السيتامول أو شراب البروفين و لا تعط الطفل

الأسبوريين خاصة في حالات الكريب وجذري الماء و لا تضع كمادات الماء البارد أو الثلج أو الكحول على جسم الطفل أما إذا كانت حرارة جسم الطفل مرتفعة بسبب تعرضه لأشعة الشمس لفترة طويلة فقم بنقل الطفل إلى مكان أكثر برودة و أعطه الكثير من السوائل و إذا تذكر دوما أن الحرارة ليست مرضا بحد ذاتها و إنما هي أحد أعراض المرض و لا بد من مراجعة الطبيب لمعرفة سبب الحرارة خاصة إذا كان عمر الطفل أقل من ثلاثة أشهر

إسعاف الكسور و الرضوض:

لا تقم بتحريك الطفل الذي يشتبه بإصابته بكسر في العنق أو في العمود الفقري لأن تحريكه قد يسبب له أذية خطيرة ودائمة و يجب أن تشتبه بوجود كسر عندما يتعرض طفل ما لحادث سقوط أو رض و عند وجود ألم و تورم أو تشوه في ناحية الرض كذلك عندما يشتبه بكسر الطرف الألم للطفل وهنا يجب عدم تحريك الطرف قبل تثبيته و اطلب الإسعاف بعد تثبيت الطرف المكسور و يمكنك وضع كمادات من الماء البارد ريثما يحضر الإسعاف

إسعاف الطفل بعد تعرضه لضربة على الرأس:

لا تقم بتحريك الطفل الذي يشتبه بإصابته بأذية في الرأس أو العنق أو العمود الفقري لأن أي حركة للطفل هنا قد تؤذيه وتسبب أذية خطيرة و يجب عليك فقط طلب الطبيب أو الإسعاف خاصة إذا كان لدى الطفل أي مما يلي:

- فقد وعي أو ميل شديد للنوم
- صداع مستمر أو اقياءات
- عدم القدرة على تحريك أحد الأطراف
- سيلان الدم أو سيلان سائل أصفر من الأنف أو من الأذن
- عند وجود الاختلاجات
- عند وجود اضطراب في الوعي أو السلوك أو الكلام

إسعاف الرعاف:

ضع الطفل بوضعية الجلوس و الرأس للأسفل قليلا ثم قم بضغط الأنف بين أصبعيك لعشرة دقائق و يفضل أن تقوم بمعايرة الوقت بالساعة و إذا استمر الرعاف بعد ذلك لعشرة دقائق يجب مراجعة الطبيب

إسعاف الطفل المصاب بحالة تسمم:

قم بإسعاف الطفل إلى الطبيب أو إلى أقرب مشفى إذا كان لدى الطفل التسمم أو يعاني

1. فقد للوعي
2. ميل للنوم
3. إختلاجات
4. صعوبة في التنفس

إسعاف الطفل الذي تناول المادة السامة عن طريق الفم:

كل مادة يتلعمها الطفل غير الأغذية تعتبر حالة تسمم خطيرة و عليك عند الاتصال بمركز التسممات و لا تجبر الطفل على الإقياء لا بعد استشارة الطبيب لأن الإقياء قد يُلحق أذى

إسعاف الطفل المتعرض للغازات والأبخرة السامة:

أخرج الطفل إلى مكان بعيد عن الدخان حيث يوجد هواء نقي ثم اتصل بالطبيب و إذا كان يتنفس الطفل ابداً بالتنفس الاصطناعي حتى يصل الإسعاف

التسممات عبر الجلد:

إذا تعرض جلد الطفل لمادة سامة مثل الاسيد أو المبيدات الحشرية قم عندها بإزالة هذه المادة من على جلد الطفل و انزع الملابس الملوثة ثم اغسل الجلد المصاب بكميات كبيرة من الماء و الصابون ثم اتصل بالطبيب , اضغط هنا لقراءة المزيد حول تسممات الأطفال.

إسعاف الجروح:

تأكد دوما من تلقي الطفل للجرات الكاملة من لقاح الكزاز:

إسعاف الكدمات:

الكدمة هي رض على النسيج الرخوة تتظاهر على شكل احمرار أو ازرقاق في الجلد مع تورم ولكن دون وجود جرح صريح ويتم إسعاف الكدمة بوضع كمادات الماء البارد فوق الكدمة لمدة نصف ساعة أما إذا كانت الكدمة كبيرة أو هناك تهتك في النسيج فيجب الاتصال بالطبيب

إسعاف الجروح القاطعة:

قم بتطبيق الضغط على الجرح النازف بقطعة قماش نظيفة و ذلك لإيقاف النزف أولا أما إذا كان الجرح كبيرا وعميقا فاتصل بالطبيب مع الاستمرار بالضغط والجروح الصغيرة يمكن غسلها بالماء والصابون ثم تغطي بشاش معقم , أما الجروح الكبيرة فتخاط من قبل الطبيب



- الخدوش والكشوط تغسل بالماء والصابون ثم تغطي بشاش معقم غير لاصق كالذي تغطي به الحروق
- الجروح الناجمة عن الشظايا تغسل بالماء والصابون ولا تقم بنزع الشظايا الكبيرة أما الشظايا الصغيرة فيمكن إزالتها بملقط نظيف
- الجروح الواخزة كالجروح الناجمة عن السكين وهنا لا تقم بنزع الجسم الغريب الذي انغرز في الجسم إذا كان هذا الجسم كبيرا كالسكين وإنما اتركه مكانه في جسم الطفل حتى يتم إسعافه و الجروح الواخزة الصغيرة تغسل بالماء والصابون و يجب إعطاء الطفل المصل المضاد للكزاز إذا كان عمره أكثر من خمسة سنوات

إسعاف لدغات الحشرات:

قم بإزالة ذيل الحشرة من مكان اللدغ ثم ضع كمادة ماء بارد لتخفيف الألم ويجب عليك إسعاف الطفل الملدوغ إلى الطبيب في حال ظهور أي مما يلي:

- الشرى
- أو طفح جلدي
- اقياء
- ضيق نفس
- حالة إغماء

لدغة العقرب:

تأكد أولا من عدم وجود العقرب في مكان قريب ثم طبق كمادات الماء البارد مكان اللدغة ثم اسعف الطفل إلى اقرب طبيب

لدغة الأفعى:

هذا يجب عدم وضع الماء البارد مكان اللدغة فقط اجعل الطفل بوضعية يكون فيها مكان اللدغة أخفض من القلب وقم بإسعاف الطفل إلى أقرب مستشفى

إسعاف إصابات الأسنان عند الأطفال:الأسنان اللبنية:

في حال حدوث كسر أو خلع لأحد الأسنان اللبنية عند الطفل قم بضغط مكان الترف بقطعة شاش نظيفة وراجع طبيب الأسنان

الأسنان الدائمة:

في حال انخلاع أحد الأسنان الدائمة للطفل يجب عليك إيجاد هذا السن و مسكه بلطف من مكان بعيد عن جذر السن و قم بوضع السن في مكانه الطبيعي حيث كان في قم الطفل مع تطبيق ضغط خفيف و إذا لم تستطع وضع السن في مكانه في قم الطفل ضعه في كأس من حليب البقر و اذهب به مباشرة إلى طبيب الأسنان ليعيد السن إلى مكانه في أسرع وقت ممكن أما إذا كان السن مكسوراً فاجمع قطع السن و اضغط مكان السن بقطعة شاش حتى يتوقف النزف وراجع طبيب الأسنان

العصابات:

• بالإضافة إلى إتباع نفس الأسلوب السابق ذكره، أكد للصغير أنه سالم وفي حالة حسنة. أغسل الجرح جيداً، وإن استمر النزف اضغط على الجرح بقوة حتى ينقطع. خذ الطفل إلى المستشفى أو إلى الطبيب بأسرع ما يمكن، لأنه قد يحتاج إلى العقار القاتل للجراثيم، أو الحقنة المانعة للكراز، أو الحقنة المانعة لداء الكلب.

الحروق:

• بالإضافة إلى إتباع نفس الأسلوب السابق ذكره، إذا اشتعلت ثياب الصغير لقه ببطانية، أو أي شيء آخر يمكن إطفاء النار به، (لا تستعمل نسيجاً مصنوعاً كالتاليون مثلاً)، ثم برد الموضع المصاب بالماء اطلب سيارة الإسعاف، أو خذ نفسك إلى المستشفى دون إبطاء، عالجه إذا ألمت به الصدمة.

عقدان الماء (الجفاف):

• هذا يصيب الصغار بسرعة وخصوصاً الأطفال منهم، وأعراضه هي السبات أو النعاس، وجفاف الجلد وجفاف الفم، وقد يكون السبب إسهالاً أو قيئاً أو تصيب العرق متى ارتفعت حرارة الطفل، أو الحر الشديد والقيظ.

• عالجه بالماء، دعه يشرب باستمرار، وليكن الماء حلواً إن أمكن، ضع في كل ثمن جالون من الماء ملعقة صغيرة من الملح. وهذا إن فعلته يعود للجسم ماء، أما إذا كان الطفل يتقيأ فعليك بالطبيب.

الحرارة والتشنج:

• الأطفال والأحداث الصغار يصابون بالتشنج متى ارتفعت حرارة أجسامهم ارتفاعاً كبيراً، فإذا حدث التشنج، حول رأس الجسم إلى جانب وابق مسلك الهواء مفتوحاً كي يتمكن من التنفس. ومتى توقف التشنج، اخفض من حرارة الطفل وذلك بتمرير اسفنجة مبتلة على جسده، ثم اتصل بطبيب أو خذ الطفل دون إبطاء إلى المستشفى.

روشتاتولوجي

الأساور والرضوض والكدمات

- بالإضافة إلى اتباع نفس الأسلوب السابق ذكره، إذا أصيب الطفل بكسر ظاهر على المسعف أن يجمد الموضع المكسور بلوحة خشبية أو معشوية قبل الخذه إلى المستشفى. والرضوض أو الألم أو العجز عن تحريك طرف من الأطراف، أو التورم الفجائي في مفصل ما يعنى على الأرجح حدوث كسر، ويترتب عليه استشارة الطبيب.

الطفح الطفولي:

- متى ظهر الطفح على جسم طفل صغير أو كبير فهو إشارة إلى إضراف في التنفئة، أو حساسية سببها نوع من أنواع من الثياب، أو المادة المنظفة المستعملة في غسلات غسل الثياب، أو بعض أنواع الطعام، أو دواء أعطى له وقد يكون جثري الماء، أو الحصبة الألمانية، أو الحصبة، أو الحمى القرمزية. تأكد من السبب وعالجه إن أمكن.
- غير أنه من المستحسن استشارة الطبيب إذا ساورتك الشكوك، ضيع غطاءة على منطقة الطفح حتى لا يحكه الطفل.
- ولا بأس من طلاء الموضع بغسل مهدئ كالكالامين، فهو يلطف من حدة الطفح، ويقلل من الاحتكاك.

الإنقاذ من مرتفع:

- حب الاستطلاع و المعرفة قد يدفع الطفل إلى ارتقاء مكان مرتفع يصعب عليه الهبوط منه، مثلاً إذا تسلق شجرة أو صعد مضبة خضرة.
- متى حاولت إنقاذ الطفل لا تفعل ما من شأنه أن يؤثر فزعاً، عالج الوضع بكل ثقة وهدوء، لا تظهر الهلع فهذا يقلق الطفل ويجعله يقوم بمحاولة قد يناله منها الأذى.
- طمئنه وأقنعه بالبقاء في مكانه، استخدم السلم لتصل إليه إن كان هذا متاحاً، وإلا فاستنجد بخبراء الإنقاذ (المطافي أو الشرطة)، واصل الكلام معه بكل ثقة إلى أن تصل المساعدة.

الغثيان السفري:

- هذا شائع بين الأطفال الذين تجاوزوا الثانية من عمرهم، ويؤول بعد أن يتقنوا في السن، وينبغي لك إن تكرر أن تستشير الطبيب.
- وثمة أقرص تزيل هذا الغثيان أو تخفف منه إلى درجة كبيرة، ومتى كان طفلك معرضاً لهذا العارض فاصطحب معك دائماً عدد من أكواب البلاستيك محكمة الغلق، واسفنجة رطبة.

شعرة حول الأصبع:



- هذا يصيب الأطفال والصغار الذين يعبثون بشعرهم، والشعرة الملتفة بقوة قد تعوق تدفق الدم مما يسبب للإصبع انتفاخاً.
- يجب في هذه الحالة استعمال مرهم خاص لإذابة الشعرة قبل أن يتعرض الإصبع للتسمم والغرغرينا.
- يجب الإسراع بالطفل إلى الطبيب فوراً.









Colored drug index

اطلس الادوية الملونة

Analgesic, Anti-inflammatory and Anti-pyretic drugs


Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
NSAID (Selective COX ₂ Inhibitor)	Celecoxib	Celebrex [®] 	celoxib [®]
	Meloxicam	Mobic [®] 	Anticox II [®]
	Piroxicam	Feldene [®] 	Brexin [®] 
NSAID (Nonselective COX inhibitor)	Lomoxicam	Xefo [®] 	
	Ibuprofen	Brufen [®] 	Marcofen [®] 
	Ketoprofen	Ketofan [®] 	Profenid [®]  Bi-Profenid [®] (150mg) 
Combination	Ibuprofen + Paracetamol	Megafen [®]	

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
NSAID (Nonselective COX inhibitor)	Diclofenac Sodium	Voltaren [®] 	Ofen [®]  Anura [®]
	Diclofenac sodium	Dolphin [®] (suppository) 	Voltaren [®] (suppository) 
	Diclofenac Potassium	Catafast [®] (sachets) 	Catafly [®]
	Diclofenac Potassium	Cataflam [®] 	Oflam [®] 
	Aceclofenac	Bristafam 	Amoflam 
	Indomethacin	Indocid [®] 	Indomethacin [®] 

Analgesic and Antipyretics

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Analgesic and Antipyretic drugs	Paracetamol	Panadol[®] 	Abimol[®] / Cetal[®] 
	ASA + Caffeine + Paracetamol	Excedrin[®] 	Markadel[®] 
	Caffeine + Paracetamol	Panadol Extra[®] 	Abimol Extra[®] 
	Paracetamol + Vit. C	Cevamol[®] (eff.) 	

Opioid analgesics


Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
μ -opioid Receptor agonist & NE, 5-HT-modulator	Tramadol HCl	Tramadol[®] Tamol[®] 	Trama SR[®]  Ultradol[®] 
	Sumatriptan succinate	Imigran[®] 	Sumagra[®] n

Antibiotics

Cell wall Synthesis Inhibitors


β -Lactams



Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Benzyll penicillin	Retarpen [®] 	Penicillin G Sodium [®] 
Phenoxyethyl penicillin	Ospen [®]	
Ampicillin + Cloxacillin	Ampidax [®] 	
Sulbactam + Ampicillin	Unasyn [®] 	Uniclam [®] 

Pharmacology	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names	Active Constituents
Penicillins combination	Augmentin [®] 	Hibiotic [®] 	Amoxicillin + Clavulanic acid
	Flumox [®] 	Flucamox [®] 	Amoxicillin + flucloxacillin
Cephalosporins 1 st Generation	Ceporex [®] 	Kellex [®] 	Cephalexin
	Duricef [®] 	Curisafe [®] 	Cefadroxil







د/ احمد عبد

Roshetatology







Pharmacology		Active constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Cephalexins	2 nd Generation	Cefaclor		Bactidol
		Cefuroxime		
		Cefoperazone	Cefobid [®] (b.i.d twice daily) 	Cefrone [®]
Cephalexins	3 rd Generation	Cefotaxime		Cefotax [®]
		Ceftriaxone	Oframox [®] 	Rocephem [®] (Roche Company) 

Pharmacology		Most Frequently Dispensed		Similar Product Names
Cephalexins	1 st Generation	Cefprozil		
		Cefazidime	Fortum [®] 	Cefrim [®] 
		Cefpodoxim	Orelox [®] 	

Protein Synthesis Inhibitors

Pharmacology	Active constituent	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Tetracycline group	Tetracycline	Hostacycline [®] 	Tetracid [®] (Old Company) 
	Doxycycline	Doxymin [®] 	Farcodoxin [®] (Pharco company) 
	Gentamicin	Garamycin [®]	Gentamicin [®]
Aminoglycosides	Tobramycin	Tobracin [®]	Tobcin [®]
	Erythromycin	Erythromycin [®]	Erythrocin [®]
	Azithromycin	Zithromax [®] 	Azolid [®] 
			Zithrocan [®] 
Macrolides	Clarithromycin	Klacid [®] 	
	Spiramycin	Rovac [®] 	Rovamycin [®] 




◆ DNA Replication Inhibitor




Pharmacology	Active constituents	Most frequently Dispensed	Similar Product Names
Quinolones *	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin
			
	Clarithromycin	Clarithromycin, generic	Tegran
			
Quinolones *	Levofloxacin	Tavanic *	Tavanic *
			
Quinolones *	Ofloxacin	Noracin *	Kinol *
			
			Tarvid *
			

◆ Anti-metabolites

Pharmacology	Active constituents	Most frequently Dispensed	Similar Product Names
Folic acid synthesis inhibitors	Methotrexate + pyrimethamine (MTX + PMZ)	Sectrin-DS *	Sectrin forte *
			

Rochetstology **Peptic Ulcer drugs**

Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Ranitidine	Zantac [®] 	Aciloc [®] 
Famotidine	Antodine/ Famotak [®] 	Servipep/ Peptec [®] 
Omeprazole	Omeprax [®] 	Pepzol [®] , Risek [®] 
Esomeprazole	Nexium [®] 	
Lansoprazole	Lanzor [®] 	Peptazol [®] 
Omeprazole + Famotidine + Gastric Antacids	Tid [®] 	

Rachetatin Peptic Ulcer drugs		Most Frequently Dispensed		Similar Product Name	
Active Constituents					
H ₂ Receptors blockers	Ranitidine		Zantac [®] 		
	Famotidine	Antodine/ Famotak [®] 		Samirad/ Famot [®] 	
	Omeprazole		Omeprazole [®] 		 
Proton-pump inhibitors	Esomeprazole		Nexium [®] 		
	Lansoprazole		Lanzor [®] 		
Triple therapy	Omeprazole + Tinidazole + Doxycycline				

Roshetatology






Antispasmodics		Most Frequently Dispensed		Similar Product Names	
Pharmacology	Active Constituents				
Anticholinergic agent, Goutpamine Derivatives	Hyosine-N-Butylbromide	Buscopan [®]		Spasmodin [®]	
	Hyosine-N-Butylbromide + Dipyrone	Buscopan Compositum [®]		Spascolon [®]	
Anticholinergic agent	Dicyclomine HCl	Spasmorest [®]			
Antimuscarinic agent	tiemonium methyl sulphate	Visceralgine [®]		Viscera [®]	
	Camylotin + Analgin	Spasmo Pyralgin M [®]			
5-HT ₂ Receptor antagonist	Trimebutine maleate	Gast-Reg [®]		Debridat [®]	

د/ احمد عبدالله


Prokinetics

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Antispasmodic agent	Mebeverine HCl + Sulpiride	Colona [®] 	
Prokinetic	Mosapride	Fluxopride [®] 	
Anticholinergic + Benzodiazepine	Citidinium bromide + Chlordiazepoxide	Librax [®] 	


Anti-emetics

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Dopamine antagonist	Metoclopramide HCl	Primperan [®] 	
	Domperidone	Motilium [®] 	Motilnom [®] 
Selective 5-HT ₃ Receptor antagonist	Ondansetron HCl	Zofran [®] 	Emereal [®]
	Adrenocortical Hormone + vit b6 - (pyridoxine)	Cortiqen b6 [®] (amp) 	Cortiplex [®] (amp) 



Rosmetology◆ Hepatic & Biliary Drugs

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Flavonoids (hepatoprotective)	Silymarin		Hepacum [®]
Galactone Dissolution Agent	Ursodeoxycholic acid		Ursotalk [®]
Hepatoprotect vs	DDG		Hepacare [®]

◆ Laxatives





Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Stimulant Laxative	(A) Bisacodyl (B) Bisacodyl + Dioctyl Sodium Sulphosuccinate	(A) Abilaxine [®] 	(B) Minalax [®] 
	Sodium Picosulphate	Picolax [®] 	Laxeol-PI [®] 

♦ Anti-dyspepsia drugs:

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Digestive enzymes	Papain + Sanzyme	Digestin [®] 	
	Papain + Sanzyme + Pepsin	Neo-Digestin [®]	
Parasympatholytic	cellulose + methylene HCl + Pancreatin + pepsin + Simethicone + Na dehydrocholate.	Spasmo canulage [®] 	
Proteolytic enzyme	Pancreatin + Ox-bile + Bromelin	Nutrizym [®] 	
Digestive, Spasmolytic and Anti-flatulent	Papain + Na dehydrocholate + Dicyclomine + Simethicone + Sanzyme	Spasmodigestin [®] 	




Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Anti-flatulent	Dimethicone + Silicon dioxide	Deflatyl [®] 	
Activated Charcoal	Activated Charcoal + Senna + Carbon + Rhubarb + peppermint oil + sulphur + fennel oil	Eucarbon [®] 	

♦ Vitamins


Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Vitamin B Supplement	Vit B ₁ (Thiamine) Hydrochloride + Vit B ₁₂ (Cyanocobalamin) + Vit B ₆ (Pyridoxine HCl)	Neurovit [®]  	Neuroblon [®] 
Vitamin B ₁₂	Hydroxycobalamin	Depovit B ₁₂ [®] 	B ₁₂ Depot [®] 
Vitamin B ₁₂ & Folic acid & Erythropoietin preparations	Cyanocobalamin	Betoliver [®] 	Cobalver [®] , Cidoxer [®] 
Vitamin B Supplements	Sulbutamine	Arcallon [®] 	Activate [®] 
Vitamin B Supplement with ATP	ATP + Vitamin B ₁₂ + Cocarboxylase + Nicotinamide	Adenoplex Forte [®] 	Epinosine-B Forte [®] 

Drugs for Urologic Disorder

Benign Prostate Hyperplasia drugs

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
α -blocker	Doxazosin	Cardura 	Dosin 
	Terazosin	Itrin 	
	Tamsulosin	Tamsulin 	Tamic 
5 α -reductase Inhibitors	Finasteride	Proscar 	Prostat 





Erectile dysfunction drugs

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Phosphodiesterase-5-Inhibitor	Sildenafil Citrate	Viagra 	Virecta 
	Tadalafil	Cialis 	Snafi 



Insulin analogs

Drugs for Endocrine Disorders


1st Generation Insulin

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Sulfonylurea (1st Generation)	Gliclazide	Diabcor [®] 	
Sulfonylurea (2nd Generation)	Glibenclamide	Glibenclamide 5mg 	Diaber [®] 
Sulfonylurea (3rd Generation)	Glimipride	Amaryl [®] 	Dolcyl [®] 


Insulin analogs Insulin Secretagogues

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Negligible	Repaglinide	Nordorm [®] 	Repaglide [®] 



Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Insulin	Insulin Repaglinide	Glucophage [®] 	Glucophage [®] 

Glucosylase Inhibitors		Most Frequently Dispensed		Similar Product Names
Pharmacology	Active Constituents			
Glucosylase Inhibitors	Acarbose	Glucobay [®]		
				





Pharmacology	Active Constituent	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Glucosylase Inhibitors	Sitagliptin	Januvia	
			

Pharmacology		Most Frequently Dispensed		Similar Product Names
Active Constituents				
Glucosylase Inhibitors	Glibenclamide + Metformin	Glucovance [®]		Glimet [®]
				
Glucosylase Inhibitors	Glyburide + Metformin	Diavance [®]		
				


Roshetatology♦ **Insulin**

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Rapid Acting Insulin	Insulin Rapid acting	Lispro [®]	Aspart [®]
Short Acting Insulin	Crystalline (Regular Insulin)	Humulin-R [®] 	Actrapid [®] 
Intermediate-Acting Insulin	Insulin isophan (NPH Insulin)	Insulatard [®] 	Humulin N [®] 
Long acting (Glargine)	Insulin glargine	Lantus [®] 	
Combination	Insulin isophan 70% + regular 30%	Insulin Mixtard [®] 	humulin 70/30 [®] 

♦ Anti-convulsants

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Phenytoin	Phenytoin		
Valproic acid	Valproate sodium		
Na ⁺ channel blocker	Lamotrigine		
Anticonvulsant, Miscellaneous	Carbamazepine		

♦ Anti-parkinson's Drugs

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Dopamine Precursor	Levodopa + Carbidopa		
Anticholinergic/ Antimuscarinic	Biperiden HCL		



Drugs for Psychiatric Disorders

❖ Sedatives & Anxiolytics drugs


Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed		Similar Product Names
Intermediate acting BDZ	Alprazolam	Xanax [®]	Zolam [®]	Restolam [®]
Long acting BDZ	Diazepam	Neuril [®] valini [®]	Valpam [®]	
Intermediate-short acting BDZ	Bromazepam	Calmeepam [®]	Lexotanil [®]	
Long acting BDZ	Clonazepam	Apotryl [®]	Amotri [®]	
Short acting BDZ	midazolam	Dormicum [®]		

Roshetatology

❖ Alzheimer's disease Drugs

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Acetylcholine esterase inhibitor (AChEI)	Donepezil	Aricept® 	Donhimer® 





❖ Anti-depressants

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
TCA	Clomipramine HCl	Anafronil® 	
	Nortriptyline 10.0 mg + Fluphenazine	Motival® 	
	Sertraline HCl	Lustral® 	
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)	Fluoxetine	Prozac®  Durazac® (once weekly) 	Philozac® 


Roshetatology

Drugs for Cardiovascular Disorders


❖ Anticoagulants

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Heparins	heparin Calcium	Calheparine [®] 	
Low Molecular Weight Heparin	Enoxaparin calcium		Clexane [®]
	Tinzaparin Nadroparin	Fraxiparine [®] 	Fraxiparine [®]
Fibrinolytic Enzymes	Streptokinase	Angikinese [®] 	Selkinese [®] 
Inhibits VIT K-dependent clotting factors	Warfarin Sodium	Marevan [®] 	



Antiplatelets

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
NSAID (COX inhibitor)	Acetyl Salicylate	Aspidol Infant [®] 	Aspirin [®] 
ADP receptor blocker	Clopidogrel	Plavix [®] 	Stroka [®] 

❖ Capillary stabilizing drugs



Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Vasoconstrictor (NE)	Diosmin	Dioven [®] 	
Oral phlebotropic drug	Diosmin + Hesperidin	Daflon [®] 	Dafrex [®] 
Peripheral venous and capillary stabilizer	Amorphous Aescin + diethylamine salicylate	Reparil [®] 	
Venous and capillary disorder Stabilizer	Almitrine bismesylate + Raubasine	Duxil [®] 	

❖ Anti-arrhythmic drugs

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Positive inotropic effect (Na ⁺ /K ⁺ ATPase pump inhibitor)	Digoxin	Lanoxin [®] 	
Na ⁺ channel blocker (Class 1C)	Propafenone HCl	Rytmonorm [®] 	

Roshetatology








❖ Anti-angina drugs

Pharmacology	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names	Active Constituents
Vasodilator (Organic nitrates)	Nitromack [®] 	Nitroderm [®] (patches) 	Nitroglycerin
	Dinitra [®] 	Cardikel [®]	Isosorbide dinitrate
	Effox [®] 	Monomack [®] 	Isosorbide mononitrate







❖ Anti-Hypertensives






Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Vasconstrictor Alpha/Beta Agonist	Etilefrine	Effonil [®] 	Vascon [®] 
The mechanism of heptaminol's therapeutic actions is not well understood although it has been suggested to affect catecholamine release or calcium metabolism. Source: V. J. Dale, Pharmacology, 1991, 24, 1-10.	Heptaminol	Corasore [®] 	


♦ Anti-Hypertensives


	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Selective β_1 -Blockers	Atenolol	Tenormin [®] 	Blokium [®] 
	Bisoprolol	Concor [®] , Concor Cor [®] 	Bisocard [®] 
	Metoprolol	Betaloc [®] 	
Non-selective (Combined with β -blockers)	Propranolol HCl	Inderal [®] 	Indolol [®] 
	Carvedilol	Dilatrol [®] 	Cardiolol [®] , Dilatrend [®] 
Combination	Bisoprolol + Hydrochlorothiazide	Concor Plus [®] 	Bisocard Plus [®] , Lodoz [®] 

Roshtatology





		Most Frequently Dispensed		Similar Product Names	
Category	Active Constituents				
Loop diuretics	Furosemide	Lasix 		Lafurex 	
Non-thiazide diuretic	Indapamide	Natrilix SR 		Diurix 	
Potassium-sparing diuretics (Aldosterone antagonists)	Spironolactone	Aldactone 		Spironolactone 	
Diuretic Combination	Spironolactone + Hydrochlorothiazide	Aldactazide 			
	Spironolactone + Furosemide	Lasilactone 			
	Amiloride + Hydrochlorothiazide	Moduretic 		Yostiretic 	

Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Captopril	Captopril[®] 	Lotensine[®], hypopress[®] 
Captopril + Hydrochlorothiazide	Capozide[®] 	
Famipril	Tritace[®] 	
Lisopril	Zestril[®] 	Lisopril[®] 
Enalapril maleate	Ezapril[®] 	
Enalapril + hydrochlorothiazide	Ezapril-Co[®] 	
Folic + Lisinopril	Hyzaar[®] 	Modazar[®] Fortazax[®] (double concentration) 

Active Constituents		Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
ARB	Losartan Potassium		Loartan
	Candesartan Cilexetil		
	Valsartan		Disartan
Angiotensin II Receptor Blocker	telmisartan	Micardis	
ARB + Diuretic	Valsartan + Hydrochlorothiazide	Co-Tareq / Co-Diovan	
Non-DHP Calcium Channel blocker	Diltiazem HCl	Aftiazem	Delay-Tiazem
	Verapamil	Isoprin	
Channel blocker	Amlodipine besylate	Norvasc	Aktapress, Modura

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Diuretics	Furosemide		
Antihypertensives	Praxolol HCl		
Antihypertensives	Methyldopa		

Lipid regulatory agents

Pharmacology	Active Constituents	Most Frequently Dispensed	Similar Product Names
Statins	Fenofibrate		
	Atorvastatin		
	Simvastatin		

للاتصال بالمؤلف وطلب كميات من الكتاب اتصل على : 01277668706

اماكن توزيع الكتاب :

طنطا

مكتبة الأطباء

شارع الرفاعي 01000498945

- مكتبة وحيد بجوار كلية الطب

- مكتبة سماح بجوار كلية الطب

الإسماعيلية

مكتبة الصفا والمروة بجوار كلية الطب

داخل كلية الطب 01111333094

- مكتبة كريم بجوار كلية الطب

شبين الكوم

مكتبة الصفا

شارع مكسين - بجوار كلية الطب الباب

الخلفي 01008875800

بنى سويف

دار الكتب الطبية

داخل وأمام كلية الطب 01005705498

المنيا

مكتبة والنل

داخل وأمام كلية الطب 01201308908

أسيوط

مكتبة الشرق الأوسط

داخل كلية الطب - بجوار مخرج 3 ..

01003149041

سوهاج

مكتبة الشرق الأوسط

مكتبة ميد أبيهيت

اليمن

مكتبة القاهرة للكتب الطبية .. صنعاء .. تلغراف

777690219

ليبيا

المصطفى عبدالقصور .. طرابلس .. الخمس

.. تلغراف 00218927476034

مصر

القاهرة

مكتبات دار الكتاب الجامعي

بجوار كلية طب القصر العيني (منطقة

المكتبات) 01222793976

بجوار كلية طب عين شمس

01008560617

بجوار كلية طب الأزهر بنين

01008688791

بجوار كلية طب الأزهر بنات

01117010043

- مكتبة الشرق الأوسط داخل القصر العيني

- مكتبة المروة داخل القصر العيني

- مكتبة المروة امام نقابة الاطباء

- المكتبة العالمية للنشر والتوزيع

المساح من أكتوبر - الحى المساح

01114138971

الاسكندرية

مكتبة الهداية

23 شارع شامبليون - الأزاريطة

01222801944

مكتبة الشروق

2 شارع شامبليون - الأزاريطة

01117477293

- مكتبة الشرق الأوسط

المنصورة

المركز العلمي للكتاب

داخل وأمام كلية الطب 01224077740

الزقازيق

- دار الكتاب الجامعي

امام كلية طب الزقازيق 01123959683

- المعرض الطبي (ا صلاح موسى)

بجوار كلية الطب ت: 01281444531

- مكتبة الشروق بجوار كلية الطب